



99,99% MỘT  
NGUYÊN TỬ  
HYDRO LÀ  
KHÔNG GIAN TRỐNG

MỘT MUỖNG  
CÀ PHÊ VẬT LIỆU  
SAO NEUTRON  
NẶNG 5 TỶ TẤN



CAESI PHẢN ỨNG  
CỰC NHAY, NÓ BỐC  
CHÁY KHI TIẾP XÚC  
VỚI KHÔNG KHÍ



# HOW SCIENCE WORKS



HIỂU HẾT VỀ KHOA HỌC

KHỐI LƯỢNG RIÊNG  
CỦA SAO THỎ  
THẤP ĐẾN MỨC  
HÀNH TINH NÀY  
SẼ TRÔI LƠ Lửng  
TRONG NƯỚC



MỘT SỐ LOẠI  
BỘT BIẾN CÓ THỂ  
SỐNG ĐẾN  
HƠN 2.000 NĂM



CÓ KHOẢNG  
30 NGHÌN TỶ  
TẾ BÀO TRONG  
CƠ THỂ BẠN



# **HOW SCIENCE WORKS**









# HOW SCIENCE WORKS

HIỂU HẾT VỀ KHOA HỌC

Nguyễn Kim Phụng dịch



nhà nam



THẾ GIỚI

NHÀ XUẤT BẢN  
THẾ GIỚI





Penguin  
Random  
House

**How Science Works**  
**Copyright © Dorling Kindersley Limited, 2018**

**A Penguin Random House Company**

Bản quyền bản tiếng Việt © Công ty Văn hóa & Truyền thông Nhã Nam, 2021.

Bản quyền tác phẩm đã được bảo hộ. Mọi hình thức xuất bản, sao chép, phân phối dưới dạng in ấn hoặc văn bản điện tử, đặc biệt là việc phát tán trên mạng Internet mà không có sự cho phép bằng văn bản của Nhà xuất bản là vi phạm pháp luật và làm tổn hại đến quyền lợi của nhà xuất bản và tác giả. Không ủng hộ, khuyến khích những hành vi vi phạm bản quyền. Chỉ mua bán bản in hợp pháp.

A WORLD OF IDEAS:  
SEE ALL THERE IS TO KNOW  
[www.dk.com](http://www.dk.com)

### **HOW SCIENCE WORKS- HIỂU HẾT VỀ KHOA HỌC**

Chịu trách nhiệm xuất bản: TS. TRẦN ĐOÀN LÂM | Biên tập: Phạm Bích Ngọc  
Biên tập viên Nhà Nam: Thanh Huệ.  
Thiết kế bìa, trình bày: Kim Oanh | Sửa bản in: Phạm Thủy.

### **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ XUẤT BẢN THẾ GIỚI**

46 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội | Điện thoại: 024. 38253841 | Fax: 024. 38269578  
Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh: Số 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận I, TP Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 028. 38220102  
Email: [marketing@thegioipublishers.vn](mailto:marketing@thegioipublishers.vn) | Website: [www.thegioipublishers.vn](http://www.thegioipublishers.vn)

### **CÔNG TY VĂN HÓA VÀ TRUYỀN THÔNG NHÃ NAM:**

59 Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | Điện thoại: 024 35146875 | Fax: 024 35146965  
Website: [www.nhanam.vn](http://www.nhanam.vn)  
Email: [info@nhanam.vn](mailto:info@nhanam.vn) | <http://www.facebook.com/nhanampublishing>.  
Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh: Nhà 015 Lô B chung cư 43 Hồ Văn Huệ  
Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 028 38479853 | Fax: 028 38443034 | Email: [kinhdoanhsg@nhanam.vn](mailto:kinhdoanhsg@nhanam.vn).

In 2.000 cuốn, khổ 19,5x23cm tại Công ty CP In Viên Đông (km19+400, Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên). Căn cứ trên số đăng ký xuất bản: 1175-2021/CXBIPH/03-77/ThG, và quyết định xuất bản số 527/QĐ-ThG của Nhà xuất bản Thế Giới ngày 10.05.2021. Mã ISBN: 978-604-77-9478-2. In xong và nộp lưu chiểu năm 2021.

CUỘC ĐUA NHỎ



Điều gì khiến cho khoa học trở nên đặc biệt?	8
----------------------------------------------	---

## VẬT CHẤT

Vật chất là gì?	12	Phản ứng và năng lượng	44
Chất rắn	14	Kim loại	46
Chất lỏng	16	Hydro	48
Chất khí	18	Carbon	50
Các trạng thái lạ	20	Không khí	52
Chuyển đổi vật chất	22	Cháy và nổ	54
Bên trong một nguyên tử	24	Nước	56
Thế giới hạ nguyên tử	26	Acid và base	58
Sóng và hạt	28	Tinh thể	60
Thế giới lượng tử	30	Dung dịch và dung môi	62
Máy gia tốc hạt	32	Chất xúc tác	64
Các nguyên tố	34	Chế tạo hóa chất	66
Phóng xạ	36	Nhựa	68
Hỗn hợp và hợp chất	38	Thủy tinh và gốm sứ	70
Phân tử và ion	40	Vật liệu kỳ diệu	72
Tạo ra phản ứng	42		



## NĂNG LƯỢNG VÀ LỰC

Năng lượng là gì?	76	Ứng dụng quang học	112
Tĩnh điện	78	Âm thanh	114
Dòng điện	80	Nhiệt	116
Lực từ	82	Truyền nhiệt	118
Sản xuất điện	84	Lực	120
Năng lượng thay thế	86	Vận tốc và gia tốc	122
Điện tử hoạt động ra sao?	88	Máy cơ	124
Vi mạch	90	Ma sát	126
Máy tính hoạt động như thế nào?	92	Lò xo và con lắc	128
Thực tế ảo	94	Áp suất	130
Công nghệ nano	96	Bay lượn	132
Robot và tự động hóa	98	Lực nổi	134
Trí tuệ nhân tạo	100	Chân không	136
Sóng	102	Trọng lực	138
Từ sóng vô tuyến đến tia gamma	104	Thuyết tương đối hẹp	140
Màu sắc	106	Thuyết tương đối rộng	142
Gương và thấu kính	108	Sóng hấp dẫn	144
Laser hoạt động ra sao?	110	Lý thuyết dây	146

## SỰ SỐNG

Sự sống là gì?	150
Phân loại sinh vật sống	152
Virus	154
Tế bào	156
Cách thức hoạt động của gen	158
Sinh sản	160
Truyền gen	162
Sự sống bắt đầu như thế nào?	164
Vạn vật tiến hóa ra sao?	166
Cách thức vật cung cấp nhiên liệu cho thế giới	168
Thực vật phát triển như thế nào?	170
Hô hấp	172
Chu trình carbon	174
Sự lão hóa	176
Bộ gen	178
Kỹ thuật di truyền	180
Liệu pháp gen	182
Tế bào gốc	184
Nhân bản	186



## VŨ TRỤ

Sao	190	Vật chất tối	
Mặt Trời	192	và năng lượng tối	206
Hệ Mặt Trời	194	Vũ trụ kết thúc	
Vật chất trôi nổi		như thế nào?	208
trong không gian	196	Quan sát Vũ trụ	210
Lỗ đen	198	Phải chăng chúng ta	
Thiên hà	200	đơn độc?	212
Vụ Nổ Lớn	202	Chuyến bay không gian	214
Vũ trụ rộng lớn		Sống trong không gian	216
đến mức nào?	204	Du hành không gian	218

## TRÁI ĐẤT

Bên trong Trái Đất	222
Kiến tạo mảng	224
Động đất	226
Núi lửa	228
Chu kỳ đá	230
Đại dương	232
Khí quyển của Trái Đất	234
Thời tiết	236
Thời tiết cực đoan	238
Khí hậu và các mùa	240
Vòng tuần hoàn nước	242
Hiệu ứng nhà kính	244
Biến đổi khí hậu	246

CHỈ MỤC 248

LỜI CẢM ƠN 256



# Điều gì khiến cho khoa học trở nên đặc biệt?


Khoa học không đơn thuần chỉ là một tập hợp các sự kiện – mà là một cách để ta suy nghĩ có hệ thống, dựa trên logic và bằng chứng. Dù có thể chưa hoàn hảo, nhưng đây là cách tốt nhất chúng ta có để hiểu về Vũ trụ của mình.

## Khoa học là gì?


Khoa học là cách thức tìm tòi và hiểu rõ về thế giới tự nhiên và xã hội, và áp dụng các thông tin thu được. Nó liên tục cập nhật thông tin và làm thay đổi hiểu biết của chúng ta về thế giới. Khoa học dựa trên bằng chứng có thể đo lường được, đồng thời phải tuân theo các bước với logic hợp lý trong việc khái quát hóa bằng chứng đó, và sử dụng nó để đưa ra những dự đoán xa hơn. Từ “khoa học” cũng được sử dụng để mô tả kiến thức chúng ta tích lũy được nhờ quá trình này.

## Phương pháp khoa học


Phương pháp khoa học của từng ngành nghiên cứu là khác nhau, nhưng nhìn chung, nó thường bao gồm: đặt ra và kiểm chứng một giả thuyết; sử dụng dữ liệu thu thập được qua các thí nghiệm để cập nhật và hoàn thiện giả thuyết; và hy vọng đạt đến một lý thuyết tổng quát để giải thích tại sao giả thuyết ban đầu là đúng. Để dữ liệu đạt độ chính xác cao, điều quan trọng là các thí nghiệm phải được lặp đi lặp lại, tốt nhất là trong các phòng thí nghiệm khác nhau. Nếu lần thử thứ hai mang lại kết quả khác, thì có lẽ kết quả không đáng tin cậy hoặc mang tính khái quát như chúng ta suy nghĩ ban đầu.













# VẬT CHẤT




# Vật chất là gì?

Nhìn chung, vật chất là bất cứ thứ gì chiếm không gian và có khối lượng. Điều này có nghĩa là nó khác biệt với năng lượng, ánh sáng hoặc âm thanh, vốn không có hai thuộc tính này.


## Cấu trúc của vật chất

Ở cấp độ cơ bản nhất, vật chất cấu thành từ các hạt cơ bản, chẳng hạn như quark và electron. Sự kết hợp của các hạt cơ bản tạo thành nguyên tử, các nguyên tử đôi khi có thể liên kết với nhau thành phân tử. Các loại nguyên tử tạo nên vật chất sẽ xác định tính chất của nó. Các nguyên tử hoặc phân tử hình thành liên kết mạnh với nhau sẽ tạo nên chất rắn ở nhiệt độ phòng. Liên kết yếu hơn sẽ tạo nên chất lỏng hoặc chất khí.




### Các hạt cơ bản

Các hạt cơ bản được gọi là quark tạo thành proton và neutron trong nguyên tử. Các gluon giúp liên kết các quark lại với nhau trong nhân. Cùng với các electron, quark và gluon tạo nên tất cả vật chất mà con người biết.



### Nguyên tử

Các nguyên tử chứa proton và neutron trong hạt nhân, và các electron quay xung quanh. Nguyên tử của nguyên tố khác nhau có số lượng proton khác nhau trong hạt nhân của chúng.




### Phân tử

Các phân tử có thể được tạo thành từ các nguyên tử khác nhau, như nước bao gồm hai nguyên tử hydro và một nguyên tử oxy, hoặc các nguyên tử giống hệt nhau, giống như một phân tử oxy bao gồm hai nguyên tử oxy.

## Các trạng thái của vật chất

Các trạng thái chính của vật chất trong cuộc sống hàng ngày bao gồm rắn, lỏng và khí. Đôi khi, các trạng thái khác thường cũng xuất hiện, chẳng hạn như khi vật chất trở nên cực kỳ lạnh hoặc cực kỳ nóng. Vật chất có thể chuyển đổi giữa các trạng thái, tùy thuộc vào mức độ năng lượng của nó và độ mạnh của liên kết giữa các nguyên tử hoặc phân tử cấu thành. Ví dụ, nhôm có điểm nóng chảy thấp hơn đồng vì liên kết giữa các nguyên tử nhôm yếu hơn giữa các nguyên tử đồng.



Liên kết mạnh của chất rắn giữ các hạt tại chỗ

### Chất rắn

Các nguyên tử hoặc phân tử trong chất rắn kết hợp với nhau theo một cấu trúc vững chắc với các liên kết mạnh. Các hạt không thể di chuyển, vì vậy chất rắn cứng và có hình dạng nhất định.



Liên kết yếu trong chất lỏng cho phép các hạt di chuyển

### Chất lỏng


Giữa các nguyên tử hoặc phân tử trong chất lỏng chỉ có liên kết yếu, vì vậy các hạt vẫn có thể di chuyển quanh. Điều này có nghĩa là chất lỏng có thể chảy dễ dàng, nhưng sự sắp xếp các hạt dày đặc ngăn ta không thể nén chúng lại.





## Hỗn hợp và hợp chất

Các nguyên tử có thể kết hợp theo nhiều cách khác nhau để tạo ra các loại vật chất khác nhau. Khi giữa các nguyên tử có liên kết về mặt hóa học, hợp chất được hình thành. Ví dụ đơn giản là nước, một hợp chất được hình thành từ oxy và hydro. Tuy nhiên, nhiều nguyên tử và phân tử lại không dễ dàng hình thành liên kết với nguyên tử hoặc phân tử khác, vì vậy hành động kết hợp không làm thay đổi chúng về mặt hóa học – ta sẽ gọi kết quả là hỗn hợp. Ví dụ về hỗn hợp bao gồm cát và muối, hoặc không khí, vốn là hỗn hợp của nhiều khí.




### Hỗn hợp

Trong hỗn hợp, các chất ban đầu không bị thay đổi, do đó chúng có thể được tách ra một lần nữa theo cách vật lý, chẳng hạn như sàng, lọc hoặc chưng cất.

### Hợp chất


Khi các nguyên tử hoặc phân tử phản ứng với nhau, chúng tạo thành một hợp chất mới. Vì thế chúng sẽ không thể trở lại trạng thái ban đầu của mình theo cách vật lý; việc phân tách chúng đòi hỏi phải phá vỡ liên kết hóa học.



## KHOẢNG 99% VẬT CHẤT TRONG VŨ TRỤ LÀ Ở THỂ PLASMA

### ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG

Trong hầu hết các phản ứng hóa học hoặc biến đổi vật lý thông thường (như khi nến cháy), tổng khối lượng các sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng. Vật chất không sinh thêm cũng chẳng mất đi. Tuy nhiên, định luật này có thể bị phá vỡ trong một số điều kiện cực đoan nhất định, chẳng hạn như phản ứng tổng hợp hạt nhân (xem trang 37), trong đó khối lượng được chuyển hóa thành năng lượng.




## TRẠNG THÁI Ở NHIỆT ĐỘ CAO VÀ THẤP

Ở nhiệt độ cực cao, các nguyên tử khí phân tách thành các ion (xem trang 40) và các electron, vật chất chuyển sang thể plasma, có thể dẫn điện. Ở nhiệt độ cực thấp, ngưng tụ Bose-Einstein có thể hình thành (xem trang 22), làm thay đổi đáng kể thuộc tính của vật chất. Ở trạng thái này, các nguyên tử bắt đầu hành động kỳ lạ, chúng hoạt động giống như một nguyên tử duy nhất.

NGƯNG TỤ BOSE-EINSTEIN

THỂ PLASMA



### Chất khí

Không có liên kết nào giữa các nguyên tử hoặc phân tử trong chất khí, vì vậy chúng có thể lan rộng và lấp đầy vật chứa. Các hạt cũng cách nhau rất xa, do đó một chất khí có thể được nén lại, mặc dù làm như vậy sẽ làm tăng áp suất.





# Chất rắn

Chất rắn là trạng thái có trật tự nhất của vật chất. Tất cả các nguyên tử hoặc phân tử trong chất rắn liên kết với nhau để tạo thành một vật thể có hình dạng cố định và thể tích cố định (mặc dù hình dạng có thể bị thay đổi bằng cách tác dụng lực). Tuy nhiên, chất rắn bao hàm một nhóm vật liệu vô cùng đa dạng với thuộc tính có thể khác nhau rất nhiều, tùy thuộc vào loại chất rắn được đề cập.

## Chất rắn là gì?

Chất rắn khi chạm vào đều cứng và có hình dạng xác định, thay vì mang hình dạng của vật chứa nó như chất lỏng hoặc chất khí. Các nguyên tử trong chất rắn liên kết chặt chẽ với nhau, vì vậy không thể nén chất rắn lại trong một thể tích nhỏ hơn. Một số chất rắn, như bột biển, có thể được ép lại nhưng đó là do không khí bị đẩy ra khỏi khối chất, còn bản thân chất rắn không thay đổi kích thước.



MUỐI



ĐƯỜNG




CÁT

Trật tự cố định của các nguyên tử hoặc phân tử


Liên kết mạnh giữa các nguyên tử hoặc phân tử

### Chất rắn kết tinh

Các nguyên tử hoặc phân tử trong chất rắn kết tinh được sắp xếp theo một trật tự cố định. Một số chất, chẳng hạn như kim cương (một dạng kết tinh của carbon), tạo thành một tinh thể lớn. Tuy nhiên, hầu hết chất rắn kết tinh được tạo thành từ rất nhiều tinh thể nhỏ hơn.



THỦY TINH



CAO SU



BƠ

Liên kết ngẫu nhiên giữa các nguyên tử hoặc phân tử

### Chất rắn vô định hình

Không giống như chất rắn kết tinh, các nguyên tử hoặc phân tử tạo nên chất rắn vô định hình không được sắp xếp trong một trật tự cố định. Thay vào đó, chúng được sắp xếp giống như phân tử chất lỏng, mặc dù chúng không thể di chuyển quanh.





## Thuộc tính của chất rắn

Chất rắn có nhiều thuộc tính khác nhau; chẳng hạn, chúng có thể mạnh hoặc yếu, cứng hoặc tương đối mềm, và có thể trở lại hình dạng ban đầu sau khi bị lực tác động, hoặc có thể bị biến dạng vĩnh viễn. Thuộc tính của một chất rắn phụ thuộc vào các nguyên tử hoặc phân tử cấu thành nên nó, loại chất rắn là kết tinh hay vô định hình, và liệu có các biến chất trong vật liệu hay không.


**LONSDALEITE, MỘT DẠNG KIM CƯƠNG CỰC HIẾM, HIỆN LÀ CHẤT RẮN CỨNG NHẤT ĐƯỢC BIẾT ĐẾN, CỨNG HƠN 60% SO VỚI KIM CƯƠNG BÌNH THƯỜNG**



### Tính cứng giòn

Khi bị tác động bởi lực, các chất rắn có tính giòn như gốm sẽ vỡ tan, nhưng không thay đổi hình dạng. Vết nứt dễ dàng xuyên qua các vật liệu này, bởi vì các nguyên tử không thể di chuyển để hấp thụ lực. Nếu vật liệu có khả năng biến dạng, nó sẽ kém giòn hơn, nhưng cũng kém cứng hơn.

Hướng tác dụng của lực



BỊ GỠ NÚT

Các nguyên tử không thể di chuyển để hấp thụ lực


Các vết nứt di chuyển qua vật liệu, khiến nó bị vỡ

Hướng tác dụng của lực

### Tính dẻo

Chất rắn có tính dẻo dễ thay đổi hình dạng khi bị kéo dãn, do đó chúng có thể được kéo thành những dây dài. Loại biến dạng này, trong đó một vật liệu thay đổi hình dạng vĩnh viễn, được gọi là biến dạng dẻo. Nhiều kim loại có tính dẻo bởi liên kết giữa các nguyên tử của kim loại đó cho phép các nguyên tử trượt lên nhau.

Hướng tác dụng của lực



BỊ KÉO DẪN

Các nguyên tử có thể tự sắp xếp lại khi có tác dụng của lực kéo


Các nguyên tử trượt lên nhau, cho phép vật liệu co dãn

Hướng tác dụng của lực

### Tính dễ uốn

Chất rắn dễ uốn có thể biến dạng dẻo khi bị nén. Kết quả là, chúng có thể được dẹt thành tấm bằng cách cán mỏng hoặc dập. Nhiều vật liệu dễ uốn cũng có tính dẻo, mặc dù hai tính chất này không phải lúc nào cũng xuất hiện cùng nhau; ví dụ, chì rất dễ uốn nhưng có độ dẻo thấp.

Hướng tác dụng của lực



CÁN MỎNG


Nguyên tử có thể di chuyển khi chịu lực nén

Vật liệu đã bị dẹt phẳng vì các nguyên tử của nó tự sắp xếp lại



## Làm ướt

Một chất lỏng duy trì tiếp xúc với bề mặt rắn ở mức độ làm ướt. Việc chất lỏng có làm ướt bề mặt hay không phụ thuộc vào cường độ của lực hấp dẫn giữa các hạt trong chất lỏng so với lực hấp dẫn giữa chất lỏng và bề mặt rắn.




### Không làm ướt

Trên các bề mặt chống thấm, nước tụ thành các giọt vì lực hút giữa các phân tử nước mạnh hơn so với lực hút giữa chúng với các phân tử bề mặt.

## ĐÂY LÀ LOẠI CHẤT LỎNG NHÓT NHẤT?

Nhựa đường, thường được sử dụng để rải trên bề mặt các con đường, là chất lỏng nhớt nhất được biết đến. Nó có độ nhớt gấp khoảng 20 tỷ lần so với nước ở cùng nhiệt độ.



### Làm ướt

Nước làm ướt một bề mặt - tức là tạo thành một lớp trên đó - khi lực hút giữa các phân tử nước với các phân tử bề mặt mạnh hơn so với giữa các phân tử nước.

# Chất lỏng

Trong chất lỏng, các nguyên tử hoặc phân tử được xếp lại chặt chẽ với nhau. Liên kết giữa chúng mạnh hơn trong chất khí nhưng yếu hơn trong chất rắn, nhờ đó cho phép các hạt di chuyển tự do.

## Dòng chảy tự do


Chất lỏng chảy và mang hình dạng của vật chứa. Các nguyên tử hoặc phân tử vẫn xếp gần nhau, có nghĩa là chất lỏng không thể bị nén. Mật độ phân tử của chất lỏng cao hơn chất khí, và thường tương đương, hoặc thấp hơn một chút so với chất rắn, ngoại trừ trường hợp của nước (xem trang 56-57).

Các hạt nằm gần nhau nhưng tự do di chuyển

### Phân tử trong chất lỏng


Khác với trong chất rắn, các nguyên tử hoặc phân tử trong chất lỏng được sắp xếp ngẫu nhiên. Giữa các hạt vẫn có liên kết, nhưng chúng khá yếu và liên tục bị phá vỡ và hình thành lại khi các hạt di chuyển ngang qua nhau.





NƯỚC

Độ nhớt được đo bằng đơn vị gọi là centipoise. Nước có độ nhớt là 1 centipoise ở 21°C.






DẦU OLIVE

Dầu olive có độ nhớt khoảng 85 centipoise ở 21°C.



MẬT ONG

Mật ong có độ nhớt khoảng 10.000 centipoise ở 21°C.



### Dòng chảy chất lỏng


Chất lỏng với độ nhớt thấp, chẳng hạn như nước, có thể chảy dễ dàng, vì liên kết giữa các phân tử của nó yếu. Ngược lại, ở cùng nhiệt độ với nước, mật ong khó chảy hơn nhiều do các liên kết liên phân tử của nó mạnh hơn.

### Độ nhớt

Độ nhớt là thước đo độ dễ chảy của một chất lỏng. Một chất lỏng có độ nhớt thấp chảy dễ dàng và thường được gọi là "lỏng", trong khi chất lỏng "đặc", có độ nhớt cao sẽ khó chảy hơn. Độ nhớt được quyết định bởi các liên kết giữa các phân tử của chất lỏng - liên kết càng mạnh, chất lỏng càng nhớt. Tăng nhiệt độ của chất lỏng làm giảm độ nhớt của nó, bởi vì khi đó các phân tử có nhiều năng lượng hơn để phá vỡ các liên kết liên phân tử.

### CHẤT LỎNG PHI NEWTON

Không giống như chất lỏng Newton, chẳng hạn như nước, độ nhớt của chất lỏng phi Newton biến đổi liên tục, tùy thuộc vào lực tác dụng lên nó. Ví dụ, hỗn hợp bột ngô và nước trở nên đặc hơn dưới tác dụng lực lớn hơn, do đó nếu một quả bóng rơi xuống hỗn hợp này từ độ cao lớn sẽ nảy ra khỏi nó, trong khi một quả bóng rơi từ độ cao thấp hơn sẽ chìm xuống trong hỗn hợp.



CHẤT LỎNG PHI NEWTON





# Chất khí

Chất khí luôn ở xung quanh chúng ta, nhưng trong phần lớn thời gian, ta chẳng mấy may suy nghĩ về chúng. Tuy nhiên, cùng với chất rắn và chất lỏng, chất khí là một trong những trạng thái chính của vật chất, và cách chúng hoạt động vô cùng quan trọng đối với sự sống trên Trái Đất. Ví dụ, khi chúng ta hít vào, thể tích phổi tăng lên, điều này làm giảm áp lực bên trong phổi và khiến không khí ồa vào.

## Chất khí là gì?

Chất khí có thể được tạo thành từ các nguyên tử riêng lẻ hoặc các phân tử gồm hai hoặc nhiều nguyên tử. Những hạt này rất giàu năng lượng và di chuyển nhanh chóng, lấp đầy vật chứa và mang hình dạng của nó. Có rất nhiều không gian giữa các hạt, vì vậy chất khí có thể bị nén lại.




# 1.700 KM/H

LÀ TỐC ĐỘ CÁC PHÂN TỬ OXY DI CHUYỂN QUANH Ở NHIỆT ĐỘ PHÒNG

## Chất khí hoạt động thế nào?

Cách thức hoạt động của chất khí được mô tả bởi một bộ ba định luật. Chúng liên quan đến thể tích, áp suất và nhiệt độ của chất khí, và cho thấy cách mà một đại lượng thay đổi khi các đại lượng còn lại thay đổi. Định luật giả định rằng tất cả các chất khí đều ở trạng thái "lý tưởng". Trong một loại khí như vậy, không có tương tác giữa các hạt khí riêng lẻ, các hạt di chuyển ngẫu nhiên và không chiếm không gian. Mặc dù không có loại khí nào trong thực tế có các thuộc tính này, các định luật chất khí vẫn minh họa được cách mà hầu hết chất khí hoạt động ở nhiệt độ và áp suất bình thường.











## ĐỊNH LUẬT AVOGADRO

Định luật Avogadro phát biểu rằng, ở cùng nhiệt độ và áp suất, những thể tích bằng nhau của mọi chất khí chứa cùng số lượng phân tử. Chẳng hạn, dù phân tử khí chlor có khối lượng gấp đôi phân tử khí oxy, thì vẫn sẽ có cùng số lượng phân tử của mỗi loại trong các vật chứa có cùng kích thước ở cùng nhiệt độ và áp suất.





## Nhiệt độ và khối lượng

Nếu thể tích của khí không bị hạn chế (chẳng hạn như bằng một vật chứa cứng), khí sẽ nở ra khi được đốt nóng, và các phân tử khí sẽ thu được nhiều năng lượng hơn. Nhiệt độ của khí càng cao thì thể tích của nó càng lớn. Ví dụ, nếu không khí trong một chiếc xuồng hơi bị mặt trời đốt nóng, không khí sẽ giãn nở và làm xuồng phồng lên nhiều hơn.




## Áp suất và thể tích

Nếu nhiệt độ của khí không đổi, tăng áp suất khí sẽ làm giảm thể tích của nó. Ngược lại, giảm áp suất khí sẽ làm tăng thể tích của nó. Đó là lý do tại sao bong bóng khí nổi lên trên bề mặt của chất lỏng.



Ở áp suất thấp, khí có thể nở ra, khiến bong bóng lớn hơn

Ở áp suất cao, các phân tử khí bị nén lại với nhau thành một thể tích nhỏ hơn



## TẠI SAO CHÚNG TA KHÔNG THỂ NHÌN THẤY KHÔNG KHÍ?

Mắt ta chỉ có thể nhìn thấy một vật nếu vật đó có tác động đến ánh sáng, chẳng hạn bằng phản xạ. Không khí có rất ít tác động đến ánh sáng, vì vậy chúng thường là vô hình. Nhưng một lượng lớn không khí sẽ tán xạ ánh sáng xanh ở mức đáng kể, đó là lý do tại sao bầu trời có màu xanh.



# Các trạng thái lạ

Chất rắn, chất lỏng và chất khí là những trạng thái quen thuộc nhất của vật chất nhưng chúng không phải là những trạng thái duy nhất tồn tại. Chất khí ở nhiệt độ cực cao có thể trở thành plasma, gồm các hạt tích điện giàu năng lượng và dẫn điện. Ở nhiệt độ cực thấp, một số chất có thể trở thành chất siêu dẫn hoặc siêu lỏng, sở hữu các đặc tính lạ, chẳng hạn như điện trở bằng không hoặc độ nhớt bằng không.

## Thế plasma

Ở nhiệt độ và áp suất bình thường, các khí tồn tại dưới dạng các nguyên tử (tạo thành từ hạt nhân gồm proton và neutron, có các electron quay quanh) hoặc các phân tử. Các plasma được tạo ra bằng cách phá vỡ các nguyên tử hoặc phân tử thành các electron tích điện âm và các hạt nhân tích điện dương hay các ion (xem trang 40). Trạng thái này có thể đạt được bằng cách đốt nóng khí đến nhiệt độ rất cao, hoặc truyền một dòng điện qua nó.

## Có thể tìm thấy plasma ở đâu?

Plasma cực kỳ phổ biến trong Mặt Trời. Tuy nhiên, plasma tự nhiên rất hiếm thấy trên Trái Đất, mặc dù nó có xuất hiện trong các tia sét và cực quang hay các luồng sáng ở Bắc Cực và Nam Cực. Plasma cũng có thể là nhân tạo nhờ truyền điện qua chất khí, chẳng hạn như hiện tượng xảy ra trong hàn hồ quang và đèn neon.



### Sao

Bên trong các ngôi sao như Mặt Trời nóng đến mức hydro và heli, vốn là các chất khí tạo thành phần lớn khối lượng của sao, bị ion hóa và chuyển sang thể plasma.



### Cực quang

Khi plasma đi từ Mặt Trời đến Trái Đất, nó sẽ tương tác với khí quyển, tạo ra các màn trình diễn ánh sáng tuyệt đẹp ở các vùng cực.



### Sét

Các tia sét là những vệt plasma có thể nhìn thấy do dòng điện truyền từ một đám mây tích điện xuống đất.



### Đèn neon

Điện làm nóng neon bên trong đèn, khiến nó chuyển thành plasma. Khi bị tác động bởi dòng điện, plasma phát ra ánh sáng.



### Hàn hồ quang plasma

Điện được sử dụng để tạo ra một luồng plasma với nhiệt độ lên tới khoảng 28.000°C, đủ cao để làm nóng chảy kim loại.

Hạt nhân mang điện tích dương

Electron quay quanh hạt nhân



Electron mang điện tích âm



Hạt nhân riêng lẻ trở thành ion tích điện dương

Electron không còn liên kết với hạt nhân và tự do di chuyển

PLASMA



1

### Chất khí ở nhiệt độ phòng

Trong một chất khí ở nhiệt độ phòng bình thường, các electron tích điện âm quay quanh hạt nhân của mỗi nguyên tử và cân bằng với điện tích dương của các proton trong mỗi hạt nhân nguyên tử. Kết quả là các nguyên tử trung hòa về điện.

2

### Plasma tích điện

Ở thể plasma, electron bị tách ra khỏi nguyên tử, tạo thành các electron tích điện âm và các hạt nhân tích điện dương (các ion). Những electron và ion này có thể di chuyển tự do, do đó plasma có thể dẫn điện.






## Các chất siêu dẫn và siêu lỏng

Ở nhiệt độ dưới 130 K (-143°C), một số vật liệu trở thành chất siêu dẫn – chúng cho phép dòng điện chạy qua mà không hề có điện trở. Ở nhiệt độ thấp hơn nữa, đồng vị (xem trang 34) phổ biến nhất của heli, heli-4, trở thành một chất siêu lỏng. Độ nhớt của nó giảm xuống còn bằng 0 và nó chảy đi mà không có lực cản. Ở nhiệt độ gần bằng độ 0 tuyệt đối (0 K/-273,15°C), một số chất chuyển sang trạng thái lạ gọi là ngưng tụ Bose-Einstein (xem trang 22). Thông thường, mỗi nguyên tử trong một chất hoạt động như một cá thể riêng lẻ, nhưng trong ngưng tụ Bose-Einstein, tất cả các nguyên tử lại hoạt động như một nguyên tử khổng lồ.

Các nguyên tử của heli lỏng hoạt động như nguyên tử trong những chất lỏng thông thường



### 1 Heli lỏng

Ở áp suất khí quyển bình thường, heli-4 hóa lỏng ở khoảng 4 K (-269°C). Ở nhiệt độ này, nó hoạt động giống như bất kỳ chất lỏng nào khác, chảy làm đầy một vật chứa và ở trong vật chứa đó.

VẬT CHỨA BĂNG GÓM

Rò rỉ qua các lỗ siêu nhỏ

Bám dọc trên vách vật chứa

Các nguyên tử hoạt động giống như một nguyên tử khổng lồ



### 2 Heli siêu lỏng

Ở khoảng 2 K (-271°C), heli-4 trở thành siêu lỏng. Ở nhiệt độ này, nó bắt đầu có các biểu hiện kỳ lạ, chẳng hạn như chảy qua những lỗ siêu nhỏ trong các vật thể rắn và bám dọc trên thành của vật chứa.

## Ứng dụng của chất siêu dẫn

Chất siêu dẫn chủ yếu được sử dụng để tạo ra nam châm điện cực mạnh, vốn đóng vai trò rất quan trọng trong các ứng dụng như máy quét cộng hưởng từ (MRI), tàu đệm từ, và máy gia tốc hạt dùng trong nghiên cứu cấu trúc của vật chất.



### Máy quét MRI

Nam châm siêu dẫn được sử dụng trong máy quét MRI giúp tạo ra hình ảnh chi tiết các mô của cơ thể, chẳng hạn như não.



### Máy gia tốc hạt

Một số máy gia tốc hạt dựa vào sức mạnh của nam châm siêu dẫn để dẫn hướng các hạt quay xung quanh bộ gia tốc.



### Bom xung điện từ

Các chất siêu dẫn được sử dụng trong bom xung điện từ để tạo ra xung điện từ cực mạnh nhằm vô hiệu hóa các thiết bị điện tử ở gần đó.





### Tàu đệm từ

Các tàu đệm từ tốc độ cao sử dụng nam châm điện siêu dẫn để nâng các toa tàu lên, và cũng để cung cấp lực đẩy về phía trước.

## HIỆU ỨNG MEISSNER

Các chất siêu dẫn không cho phép từ trường đi qua chúng. Thực ra, chúng còn đẩy từ trường, một hiện tượng được gọi là Hiệu ứng Meissner. Nếu nam châm được đặt phía trên vật liệu siêu dẫn đã được làm mát đến nhiệt độ tới hạn của nó (ở nhiệt độ này vật liệu trở thành siêu dẫn), chất siêu dẫn đó sẽ đẩy nam châm, khiến nó bay lên lơ lửng.



**HELI SIÊU LỎNG SẼ QUAY MÃI MÃI NẾU ĐƯỢC KHUẤY LÊN**



# Chuyển đổi vật chất

Chất rắn, lỏng, khí và plasma là những trạng thái được biết đến nhiều nhất của vật chất, nhưng cũng có một trạng thái kỳ lạ khác được gọi là ngưng tụ Bose-Einstein. Chuyển đổi vật chất từ trạng thái này sang trạng thái khác có liên quan đến việc thêm vào hoặc lấy bớt năng lượng.

## Thu năng lượng

Khi một chất thu năng lượng, các hạt của nó (nguyên tử hoặc phân tử) có thể rung hoặc di chuyển tự do hơn. Nếu bổ sung đủ năng lượng, liên kết giữa các hạt trong chất rắn hoặc chất lỏng có thể bị phá vỡ, làm thay đổi trạng thái của chất. Trong chất khí, năng lượng có thể tách các electron ra khỏi các hạt, tạo thành plasma.

**0,01°C**  
**LÀ ĐIỂM BA TRẠNG THÁI**  
**CỦA NƯỚC, TẠI ĐÓ NÓ**  
**CÓ THỂ LÀ CHẤT RẮN, LỎNG**  
**VÀ KHÍ CÙNG MỘT LÚC**

## NGƯNG TỤ BOSE-EINSTEIN

Một trạng thái kỳ lạ của vật chất trong đó các nguyên tử có rất ít năng lượng, chúng hoạt động như thể tất cả chúng ở khắp mọi nơi cùng một lúc, giống như một nguyên tử duy nhất. Hầu hết các chất không hình thành dạng ngưng tụ Bose-Einstein.

THẤP

## CHẤT RẮN

Trong chất rắn, các nguyên tử hoặc phân tử được liên kết chặt chẽ với nhau thành một hình dạng vững chắc.

## NÓNG CHẢY

Khi năng lượng của một chất rắn tăng lên, liên kết giữ các hạt lại với nhau sẽ rung nhiều hơn. Cuối cùng những liên kết đó bị phá vỡ, và chất rắn chuyển sang thể lỏng. Các hạt của nó vẫn hút lẫn nhau, nhưng chúng có thể di chuyển tự do hơn.

## THĂNG HOA

Một số chất rắn, chẳng hạn như carbon dioxide đông lạnh ("đá khô"), chuyển thăng từ pha rắn sang pha khí. Bất kỳ chất nào cũng có thể thăng hoa trong điều kiện nhiệt độ và áp suất phù hợp, nhưng thăng hoa tương đối hiếm thấy trong điều kiện bình thường.



## CHẤT LỎNG

Trong chất lỏng, các nguyên tử hoặc phân tử liên kết với nhau ít chặt chẽ hơn so với trong chất rắn và tự do chảy.

## MỨC NĂNG LƯỢNG


Khi chất lỏng mất đi năng lượng, các nguyên tử hoặc phân tử của nó di chuyển chậm lại và lực hấp dẫn giữa các hạt kéo chúng lại gần nhau hơn. Các hạt có thể được sắp xếp theo một trật tự nhất định, tạo thành một chất rắn kết tinh, hoặc sắp xếp ngẫu nhiên hơn, tạo thành một chất rắn vô định hình.

## ĐÓNG BĂNG

Làm lạnh các dạng khí của một số chất đến khoảng vài phần triệu trên độ 0 tuyệt đối (0 K/-273,15°C) sẽ làm giảm năng lượng của các nguyên tử đến mức chúng gần như bất động và khiến chúng kết tụ lại với nhau.


## SIÊU LẠNH





## NHIỆT ẪN

Nhiệt ẩn là năng lượng được giải phóng hoặc hấp thụ bởi một chất khi thay đổi pha trạng thái. Mồ hôi khiến chúng ta cảm thấy mát mẻ hơn vì sự bốc hơi của mồ hôi hấp thụ nhiệt từ da.



ĐỔ MỒ HÔI

Nhiệt ẩn được quá trình bay hơi mang đi khỏi cơ thể khi mồ hôi bốc hơi.



# Bên trong một nguyên tử

Suốt một thời gian dài, các nguyên tử được cho là không thể bị phân tách, nhưng giờ đây ta đã biết rằng chúng được tạo thành từ các proton, neutron và electron. Số lượng của mỗi hạt này xác định nguyên tử là gì và có tính chất hóa học và vật lý thế nào.

## Cấu trúc của một nguyên tử

Một nguyên tử bao gồm một hạt nhân nằm ở vị trí trung tâm, bao quanh bởi một hoặc nhiều electron. Hạt nhân chứa các proton tích điện dương và, trừ trường hợp hydro, còn chứa các neutron trung hòa về điện. Hầu hết khối lượng của một nguyên tử tập trung ở hạt nhân. Xung quanh hạt nhân, các electron siêu nhỏ, tích điện âm được giữ tại chỗ do lực hút của các proton tích điện dương. Một nguyên tử luôn có cùng số proton và electron, do đó các điện tích dương và âm sẽ triệt tiêu lẫn nhau, làm cho nguyên tử trung hòa về điện.

## Cấu trúc của một nguyên tử heli

Mỗi nguyên tử heli có hai proton và hai neutron trong hạt nhân nằm ở trung tâm của nó, quay quanh là hai electron.

Vùng nơi electron ít có khả năng được tìm thấy

Lực hút giữa các electron tích điện âm và các proton tích điện dương trong hạt nhân

Proton trong hạt nhân

Neutron trong hạt nhân

## KÍCH THƯỚC NGUYÊN TỬ


Nguyên tố có nguyên tử nhỏ nhất là hydro, chỉ bao gồm một proton và một electron. Đường kính của nó là khoảng 106 picomet (một phần nghìn tỷ mét). Caesi là một trong những nguyên tử lớn nhất. Nó có 55 electron quay quanh hạt nhân và lớn hơn nguyên tử hydro khoảng sáu lần, với đường kính khoảng 596 picomet.

106 picomet



Hydro


596 picomet



Caesi

99%

MỘT NGUYÊN TỬ  
HYDRO LÀ KHÔNG  
GIAN TRỐNG








## Orbital electron

Các electron không quay quanh hạt nhân như cách các hành tinh quay quanh Mặt Trời. Do ảnh hưởng của các hiệu ứng lượng tử (xem trang 30), không thể xác định chính xác vị trí của electron. Thay vào đó, chúng tồn tại trong các khu vực được gọi là orbital. Đó là những vùng không gian xung quanh hạt nhân, nơi các electron có nhiều khả năng được tìm thấy nhất. Có bốn loại orbital chính: orbital s, có dạng hình cầu; orbital p, có hình đồng hồ cát; orbital d và orbital f, với các hình dạng phức tạp hơn. Mỗi orbital có thể chứa tối đa hai electron và các electron được xếp vào orbital theo thứ tự, bắt đầu từ gần hạt nhân nhất.

### Orbital của nguyên tử fluor

Các nguyên tử fluor có chín proton và chín electron quay quanh. Bốn electron đầu tiên dao động trong hai orbital s, với hai electron trong mỗi orbital. Năm electron còn lại được phân chia trong ba orbital p.



Electron

Vùng nơi electron nhiều khả năng được tìm thấy nhất

### KHỐI LƯỢNG CỦA MỘT ELECTRON LÀ BAO NHIÊU?

Một electron cực kỳ nhẹ, chỉ bằng một phần hai nghìn ( $1/2.000$ ) khối lượng của một proton.

## Số hiệu nguyên tử và nguyên tử khối

Các nhà khoa học sử dụng một vài con số và phép đo để định lượng tính chất của các nguyên tử. Chúng bao gồm số hiệu nguyên tử và các phép đo khác nhau để xác định khối lượng nguyên tử.

Khái niệm	Định nghĩa
<b>Số hiệu nguyên tử</b>	Số lượng proton trong một nguyên tử. Một nguyên tố được xác định bởi số hiệu nguyên tử của nó, vì tất cả các nguyên tử của một nguyên tố đều có cùng số proton. Ví dụ, tất cả các nguyên tử có tám proton đều là nguyên tử oxy.
<b>Nguyên tử khối</b>	Tổng khối lượng proton, neutron và electron của một nguyên tử. Số lượng neutron trong các nguyên tử của một nguyên tố cụ thể có thể thay đổi, tạo ra các đồng vị khác nhau của nguyên tố đó (xem trang 34). Điều này có nghĩa là các đồng vị khác nhau có nguyên tử khối khác nhau. Đơn vị được sử dụng để đo nguyên tử khối được gọi là đơn vị khối lượng nguyên tử (u) - một u là một phần mười hai khối lượng của một nguyên tử carbon-12, một đồng vị phổ biến của carbon, do đó nó còn được gọi là đơn vị carbon.
<b>Nguyên tử khối trung bình</b>	Khối lượng trung bình của một đồng vị của một nguyên tố.
<b>Số khối</b>	Tổng số proton và neutron trong một nguyên tử.



# Thế giới hạ nguyên tử

Các nguyên tử được tạo thành từ các đơn vị nhỏ hơn gọi là các hạt hạ nguyên tử. Chúng có hai loại: hạt cấu thành vật chất và hạt mang lực. Hạt hạ nguyên tử kết hợp để tạo thành các hạt và lực khác nhau, bao gồm cả một số có tính chất kỳ lạ.

## Cấu trúc hạ nguyên tử

Các electron trong nguyên tử không thể được phân chia thêm nữa, nhưng proton và neutron thì có thể. Mỗi hạt được tạo thành từ ba hạt quark – các hạt hạ nguyên tử trong một họ gọi là fermion. Fermion là các hạt vật chất, và mọi vật chất được tạo thành từ các quark (kết hợp giữa các “hương”, hay các loại) cùng với lepton (cũng là một loại fermion, bao gồm electron). Mỗi fermion có một phản hạt tương ứng, cùng khối lượng nhưng có điện tích trái dấu – ví dụ, các phản hạt của electron là positron. Sự kết hợp của các phản hạt tạo thành phản vật chất.

## Các hạt sơ cấp

Suốt một thời gian dài, các nhà khoa học tin rằng proton và neutron là các hạt sơ cấp, không thể phân chia được, nhưng bây giờ ta đã biết rằng chúng được tạo nên bởi các hạt quark. Tuy nhiên, các electron và các hạt quark có lẽ chính là các hạt sơ cấp rồi.

**THUẬT NGỮ**  
**“QUARK” ĐƯỢC**  
**LẤY CẢM HỨNG TỪ**  
**TIỂU THUYẾT FINNEGANS**  
**WAKE CỦA JAMES JOYCE**


## LIỆU CÓ TỒN TẠI MỘT HẠT TRỌNG LỰC?

Các nhà khoa học nghĩ rằng có một hạt mang lực hấp dẫn gọi là hạt graviton. Sự tồn tại của graviton vẫn chưa được xác nhận bằng thực nghiệm.

Orbital, nơi có xác suất cao tìm thấy electron



**ELECTRON**







## CÁC HẠT HẠ NGUYÊN TỬ

**FERMION** là các hạt vật chất. Chúng cấu tạo nên thành phần vật chất của các nguyên tử, như proton, neutron và electron.

**BOSON** là các hạt mang lực. Chúng đóng vai trò là cầu nối mang lực giữa các hạt khác.

**FERMION SƠ CẤP** là các hạt vật chất không được tạo thành từ các hạt khác.

**HADRON** là các hạt tổ hợp, được tạo thành từ một số hạt quark.

### BOSON SƠ CẤP

là các hạt mang lực không được tạo thành từ các hạt khác.

#### Quark

- Quark lên
- Quark xuống
- Quark duyên
- Quark lạ
- Quark đỉnh
- Quark đáy

#### Lepton

- Electron
- Electron neutrino
- Muon
- Muon neutrino
- Tau
- Tau neutrino


**Baryon** là fermion tổ hợp bao gồm ba quark.

- **Proton:** Hai quark lên + một quark xuống + ba gluon
- **Neutron:** Hai quark xuống + một quark lên + ba gluon
- **Lambda:** Một quark xuống + một quark lên + một quark lạ + ba gluon
- **Rất nhiều các hạt khác**

**Meson** là các boson tổ hợp có chứa quark và phản quark.

- **Pion dương:** Một quark lên + một phản quark xuống
- **Kaon âm:** Một quark lạ + một phản quark lên
- **Rất nhiều các hạt khác**


- **Photon**
- **Gluon**
- **Boson W+**
- **Boson W-**
- **Boson Z**
- **Hạt Higgs**



Lực điện từ giữ các electron quay trong quỹ đạo xung quanh hạt nhân

#### Lực điện từ

Tương tác giữa các hạt tích điện được mang bởi photon, là các hạt không có khối lượng, di chuyển với tốc độ ánh sáng.




#### Lực hạt nhân mạnh

Lực hạt nhân mạnh liên kết các quark lại với nhau, chống lại lực đẩy điện từ trong các proton và neutron. Lực này hoạt động trong phạm vi ngắn và được mang bởi gluon.

### Các lực cơ bản

Thay vì lực đẩy và kéo đơn giản, các lực trong thế giới hạ nguyên tử được mang bởi các hạt. Hãy tưởng tượng hai người trượt băng ném bóng trên sân băng; quả bóng mang năng lượng từ người trượt băng thứ nhất, tác dụng một lực lên người thứ hai, vì vậy người trượt băng thứ hai sẽ di chuyển khi bắt được bóng.



#### Lực hạt nhân yếu

Trong quá trình phân rã phóng xạ, các hạt bị đẩy ra khỏi hạt nhân khi loại quark thay đổi - điều này được thực hiện bởi các boson W và Z, mang lực yếu.



#### Trọng lực

Trọng lực là một lực hấp dẫn hoạt động trong phạm vi vô hạn, vì vậy hạt chưa được phát hiện của loại lực này phải di chuyển với tốc độ ánh sáng.



# Sóng và hạt

Sóng và hạt dường như là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau: ánh sáng là sóng và nguyên tử là hạt. Tuy nhiên, đôi khi sóng, chẳng hạn như ánh sáng, hoạt động như các hạt, và hạt, chẳng hạn như electron, hoạt động như sóng. Hiện tượng này được gọi là lưỡng tính sóng-hạt.

## Ánh sáng như sóng


Thí nghiệm hai khe hẹp (thí nghiệm khe Young) là một cách đơn giản cho thấy ánh sáng có tính chất sóng. Ánh sáng được chiếu qua hai màn, màn đầu tiên có một khe để tạo ra chùm ánh sáng hẹp, và màn thứ hai có hai khe để chia ánh sáng làm hai. Sau khi được phân chia, ánh sáng chiếu vào màn hình quan sát, nơi nó tạo ra một loạt các dải sáng và tối xen kẽ. Nếu ánh sáng chỉ hoạt động như các hạt, kết quả thu được sẽ rất khác.

### Các hạt ánh sáng

Nếu ánh sáng chỉ hoạt động như các hạt đơn giản, ví dụ hạt cát, một số sẽ đi qua một khe và số khác sẽ đi qua khe còn lại, kết quả thu được sẽ chỉ là hai dải ánh sáng riêng biệt trên màn hình quan sát. Tuy nhiên, những gì thực sự xảy ra khi ánh sáng được truyền qua hai khe là rất khác (xem bên dưới).

### Các sóng ánh sáng

Sau khi đi qua các khe, ánh sáng tạo thành dạng gợn sóng, giống như khi ta ném một hòn đá xuống ao. Các gợn sóng tương tác với nhau, tạo ra một loạt các dải sáng và tối - một mô hình giao thoa - trên màn hình quan sát.




**NĂM 2015, CÁC NHÀ KHOA HỌC ĐÃ CHỤP ĐƯỢC BỨC ẢNH ĐẦU TIÊN CHO THẤY ÁNH SÁNG CÓ**

**CẢ HAI TÍNH CHẤT SÓNG VÀ HẠT**

## CÓ PHẢI TẤT CẢ CÁC HẠT ĐỀU CÓ TÍNH CHẤT SÓNG?

Có vẻ như không chỉ là các hạt nhỏ như electron mới có thể hoạt động như sóng. Một số phân tử lớn với hơn 800 nguyên tử cũng hoạt động giống như sóng trong các thí nghiệm hai khe hẹp - mặc dù chúng ta chưa biết liệu có phải mọi phân tử lớn đều hoạt động theo cách này.

### NGUỒN SÁNG



Các hạt ánh sáng


MÀN HÌNH HAI KHE

Hình ảnh ở phía trước màn hình quan sát

MÀN HÌNH QUAN SÁT

Dải ánh sáng được xác định rõ

### NGUỒN SÁNG



Sóng ánh sáng

MÀN HÌNH MỘT KHE


MÀN HÌNH HAI KHE






## Ánh sáng như hạt

Khi được chiếu sáng, kim loại có thể phát ra các electron, nhưng chỉ khi ta sử dụng ánh sáng có bước sóng (màu) phù hợp. Hiệu ứng này - được gọi là hiệu ứng quang điện - xảy ra vì ánh sáng đóng vai trò như các hạt. Các photon (hạt) của ánh sáng đỏ với bước sóng dài có năng lượng ít hơn so với các photon có bước sóng ngắn hơn (chẳng hạn như trong ánh sáng lục và tia cực tím), và do đó không đủ để cho các electron thoát ra khỏi kim loại.




### Ánh sáng đỏ

Photon của ánh sáng đỏ có quá ít năng lượng để khiến hầu hết các kim loại phát ra các electron từ bề mặt của chúng, dù đèn có sáng tới đâu.



### Ánh sáng lục

Photon của ánh sáng lục có nhiều năng lượng hơn ánh sáng đỏ - đủ năng lượng để cho phép các electron thoát ra khỏi bề mặt kim loại.




### Tia cực tím

Photon của tia cực tím có năng lượng rất cao, vì vậy chúng kích thích sự giải phóng các electron năng lượng cao khỏi bề mặt kim loại.

## Lưỡng tính sóng-hạt

Khi thí nghiệm hai khe hẹp được thực hiện với các hạt, chẳng hạn như electron hoặc nguyên tử, mô hình giao thoa gồm các vân sáng và tối cũng được tạo ra, giống như xảy ra với sóng. Các hạt do đó cũng có tính chất sóng - gọi là lưỡng tính sóng-hạt. Nếu các electron được bắn ra từng hạt một, ta cũng sẽ thu được mô hình giao thoa tương tự, bởi vì các tính chất giống như sóng của hạt khiến chúng tự giao thoa với nhau.

### SÚNG ELECTRON



Electron được bắn ra từng hạt

### MÀN HÌNH HAI KHE


Vân giao thoa hiện trên màn hình quan sát

### MÀN HÌNH QUAN SÁT

### MÀN HÌNH QUAN SÁT

### Giao thoa

Khi hai sóng cùng pha, gặp nhau tại cùng một điểm của chu kỳ (đỉnh với đỉnh, đáy với đáy), chúng sẽ cộng hưởng với nhau. Khi chúng ngược pha (một đỉnh gặp một đáy), chúng triệt tiêu lẫn nhau.



Vân sáng nơi sóng ánh sáng tăng cường lẫn nhau (giao thoa tăng cường)

Hình ảnh ở phía trước màn hình quan sát



Vân tối nơi sóng ánh sáng triệt tiêu lẫn nhau (giao thoa triệt tiêu)



# Thế giới lượng tử


Ở cấp độ hạ nguyên tử, sự vật không còn hoạt động theo cách chúng ta đã quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày. Các hạt vừa có thể hoạt động như sóng vừa có thể hoạt động như hạt, sự thay đổi năng lượng xảy ra trong các bước nhảy – được gọi là bước nhảy lượng tử – và các hạt có thể ở trạng thái không xác định cho đến khi chúng được quan sát.

## Gói năng lượng

Một lượng tử là lượng nhỏ nhất có thể có của bất kỳ thuộc tính vật lý nào, chẳng hạn như năng lượng hoặc vật chất. Ví dụ, lượng bức xạ điện từ nhỏ nhất, chẳng hạn như ánh sáng, là một photon. Lượng tử là đại lượng không thể phân tách – chúng chỉ có thể tồn tại dưới dạng bội số nguyên của một lượng tử.

## Bước nhảy lượng tử

Các electron trong nguyên tử chỉ có thể nhảy trực tiếp từ một mức năng lượng, hoặc lớp vỏ, sang một mức khác – một “bước nhảy lượng tử”; chúng không thể chiếm một mức năng lượng trung gian. Khi chúng di chuyển giữa các lớp vỏ, các electron hấp thụ hoặc phát ra năng lượng.




## Nguyên lý bất định

Trong thế giới lượng tử, không thể cùng biết chính xác cả vị trí lẫn vận tốc của một hạt hạ nguyên tử, chẳng hạn như electron hoặc photon. Hiệu ứng này, được gọi là nguyên lý bất định, xảy ra là bởi việc đo lường một đại lượng sẽ làm nhiễu loạn hạt, khiến cho phép đo của đại lượng còn lại không chính xác.


## Vị trí hay vận tốc?

Vị trí và vận tốc của một electron không thể cùng được xác định chính xác. Biết được vị trí của nó càng chính xác thì tốc độ của nó càng không chính xác và ngược lại.



## RỐI LƯỢNG TỬ

Rối lượng tử (vướng vúi lượng tử) là một hiệu ứng kỳ lạ, theo đó một cặp hai hạt hạ nguyên tử, chẳng hạn như electron, liên đới với nhau, hay còn gọi là vướng vúi, và chúng vẫn luôn được kết nối ngay cả khi cách nhau một khoảng cách vật lý cực xa (ví dụ, trong các thiên hà khác nhau). Kết quả là, việc tác động lên một hạt ngay lập tức làm thay đổi hạt còn lại. Tương tự, đo các thuộc tính của một hạt ngay lập tức cung cấp thông tin về các thuộc tính của hạt còn lại.



## LIỆU CÓ THỂ XẢY RA DỊCH CHUYỂN TỨC THỜI?

Sử dụng rối lượng tử, các nhà nghiên cứu đã dịch chuyển thông tin qua một khoảng cách khoảng 1.200 km. Tuy nhiên, việc dịch chuyển tức thời một vật thể vẫn chỉ tồn tại trong khoa học viễn tưởng.



## Âm giới lượng tử


Trong thế giới lượng tử, các hạt tồn tại trong một loại “thế giới bên kia” cho đến khi chúng được quan sát. Ví dụ, một nguyên tử phóng xạ có thể ở trạng thái không xác định, trong đó nó vừa phân rã, giải phóng bức xạ, lại vừa không phân rã. Trạng thái trung gian này được gọi là chồng chất. Chỉ khi một hạt được quan sát hoặc đo lường thì nó mới “quyết

định” trạng thái của mình, hay nói một cách khoa học hơn, nó không còn chồng chất nữa. Sự chồng chất ngụ ý rằng các sự kiện hạ nguyên tử sẽ không bao giờ được xác định rõ ràng, cho đến khi chúng được quan sát – một ý tưởng khiến nhà vật lý Erwin Schrödinger nghĩ ra một thí nghiệm tưởng tượng nổi tiếng, được gọi là Con mèo của Schrödinger.

### Con mèo của Schrödinger

Một con mèo bị nhốt trong hộp cùng một chai thuốc độc và một lượng chất phóng xạ. Nếu chất phóng xạ bắt đầu phân rã và phát ra bức xạ, bức xạ này sẽ được bộ đếm Geiger phát hiện và theo đó kích hoạt việc đập một cái búa để làm vỡ chai thuốc độc, giết chết con mèo. Tuy nhiên, phân rã phóng xạ diễn ra ngẫu nhiên, vì vậy không thể biết được con mèo còn sống hay đã chết nếu không nhìn vào trong hộp – thực tế, con mèo ở trạng thái “vừa sống vừa chết” cho đến khi ta mở hộp.

## CÓ MỘT HỒ MẶT TRẮNG ĐƯỢC ĐẶT THEO TÊN ERWIN SCHRÖDINGER






# Máy gia tốc hạt

Máy gia tốc hạt là các thiết bị giúp tăng vận tốc của các hạt hạ nguyên tử đến mức gần tốc độ ánh sáng nhằm nghiên cứu các câu hỏi cơ bản về vật chất, năng lượng và Vũ trụ.

## Máy gia tốc hoạt động như thế nào?

Máy gia tốc hạt sử dụng điện trường tạo bởi điện áp cao và từ trường mạnh để tạo ra chùm hạt hạ nguyên tử năng lượng cao, chẳng hạn như proton hoặc electron, cho chúng va chạm vào nhau hoặc bắn vào một mục tiêu kim loại. Nhiều máy gia tốc hạt có dạng hình tròn, giúp hạt có thể quay thật nhiều vòng, tăng thêm năng lượng sau mỗi lần quay, trước khi cuối cùng va chạm.




### Va chạm hạ nguyên tử


Các proton di chuyển nhanh được tạo ra bằng cách dẫn khí hydro đi qua điện trường. Được điều hướng bởi từ trường, các proton va chạm với các hạt hạ nguyên tử khác hoặc các nguyên tử trong một miếng kim loại. Máy dò sẽ ghi nhận bức xạ hoặc các hạt nảy ra từ vụ va chạm.

## Nghiên cứu thế giới hạ nguyên tử


Máy gia tốc hạt được sử dụng chủ yếu để nghiên cứu vật chất và năng lượng ở cấp độ hạ nguyên tử, nhưng chúng cũng đã được sử dụng để nghiên cứu vật chất tối (xem trang 206) và các điều kiện ngay sau khi diễn ra Vụ Nổ Lớn (xem trang 202). Cùng với việc được sử dụng để khám phá hạt Higgs, các máy gia tốc cũng góp phần phát hiện ra các hạt hạ nguyên tử kỳ lạ khác, như ngũ quark, một loại hạt tổng hợp bao gồm bốn hạt quark và một phản quark, có thể tồn tại trong siêu tân tinh.







## CÁC HẠT ĐI HẾT VÒNG TRÒN 27 KM CỦA LHC HƠN 11.000 LẦN MỖI GIÂY




### HẠT HIGGS

Hạt Higgs là thành phần của một trường – được gọi là trường Higgs – tạo ra khối lượng thông qua sự tương tác của nó với các hạt khác, chẳng hạn như photon và electron. Các hạt Higgs có thể đem so sánh với một bông tuyết trong một bãi tuyết. Bãi tuyết – trường Higgs – có tương tác khác nhau với các vật thể khác nhau: một vật thể tương tác mạnh với trường (chìm sâu trong tuyết) có khối lượng lớn; vật tương tác yếu hơn (nằm trên bề mặt tuyết) sẽ có khối lượng nhỏ; và vật không tương tác với trường thì hoàn toàn không có khối lượng.

Các hạt tương tác mạnh đáng kể với trường Higgs có khối lượng lớn

Các hạt không tương tác với trường Higgs (như photon) thì không có khối lượng



Trường Higgs được tạo thành từ các hạt Higgs, giống như những bông tuyết tạo thành một bãi tuyết

Các hạt tương tác yếu với trường Higgs có khối lượng nhỏ



# Các nguyên tố

Các nguyên tố chỉ chứa một loại nguyên tử, do đó chúng không thể bị phân chia hóa học thành các phần nhỏ hơn. Các nguyên tử có sự khác nhau về số lượng proton, neutron và electron mà chúng chứa, nhưng proton là thành phần chính giúp xác định một nguyên tố. Bảng tuần hoàn các nguyên tố là cách sắp xếp chúng theo số lượng proton có trong hạt nhân của một nguyên tử.


## Bảng tuần hoàn

Các nguyên tố được sắp xếp trong bảng tuần hoàn theo số hiệu nguyên tử – tức số lượng proton của chúng. Trong bảng này, số nguyên tử tăng dần từ trái sang phải theo một hàng. Vị trí của một nguyên tố trong bảng tuần hoàn cũng cho ta biết thêm về nó; ví dụ, các nguyên tố trong cùng một cột có phản ứng theo những cách tương tự nhau.

Chu kỳ – Hàng, được đánh số từ 1 đến 7; tất cả các nguyên tố trong một chu kỳ có cùng số lớp vỏ electron


### ĐỒNG VỊ

Đồng vị của một nguyên tố có cùng số proton nhưng khác số neutron, do đó chúng khác nhau về nguyên tử khối. Ví dụ, các đồng vị carbon trong tự nhiên có 6, 7 hoặc 8 neutron. Đồng vị có phản ứng giống nhau về mặt hóa học, nhưng hoạt động khác nhau trong những khía cạnh khác – ví dụ, một số đồng vị carbon có tính phóng xạ.




**CARBON-12**

6 neutron + 6 proton = 12



**CARBON-13**

7 neutron + 6 proton = 13



**CARBON-14**

8 neutron + 6 proton = 14

1	1.008	<b>H</b>	Hydro
2	6.94	<b>Li</b>	Lithi
3	9.0122	<b>Be</b>	Beryli
11	22.990	<b>Na</b>	Natri
12	24.305	<b>Mg</b>	Magnesi
19	39.098	<b>K</b>	Kali
20	40.078	<b>Ca</b>	Calci
37	85.468	<b>Rb</b>	Rubidi
38	87.62	<b>Sr</b>	Stronti
55	132.91	<b>Cs</b>	Caesi
56	137.33	<b>Ba</b>	Bari
87	(223)	<b>Fr</b>	Franci
88	(226)	<b>Ra</b>	Radi

1	1.008	<b>H</b>	HYDRO
---	-------	----------	-------

Ký hiệu hóa học – tên viết tắt của một nguyên tố

Tên đầy đủ của nguyên tố

Nhóm – Cột, được đánh số từ 1 đến 18; các nguyên tố trong một nhóm có cùng số electron ở lớp vỏ ngoài cùng và có tính chất hóa học tương tự nhau

3	4	5	6	7
21	22	23	24	25
44.956	47.867	50.942	51.996	54.938
<b>Sc</b>	<b>Ti</b>	<b>V</b>	<b>Cr</b>	<b>Mn</b>
Scandi	Titan	Vanadi	Chromi	Mangan
39	40	41	42	43
88.906	91.224	92.906	95.95	(98)
<b>Y</b>	<b>Zr</b>	<b>Nb</b>	<b>Mo</b>	<b>Tc</b>
Ytri	Zirconi	Niobi	Molypden	Techneti
72	73	74	75	
178.49	180.95	183.84	186.21	
<b>Hf</b>	<b>Ta</b>	<b>W</b>	<b>Re</b>	
Hafni	Tantal	Wolfram	Rheni	
104	105	106	107	
(267)	(268)	(269)	(270)	
<b>Rf</b>	<b>Db</b>	<b>Sg</b>	<b>Bh</b>	
Rutherfordi	Dubni	Seaborgi	Bohri	

57-71

89-103

### Trật tự các nguyên tố

Số hiệu nguyên tử trong bảng tuần hoàn tăng dần theo chiều từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Các nguyên tố kim loại nằm bên trái của bảng, phi kim ở bên phải.

57	58	59	60
138.91	140.12	140.91	144.24
<b>La</b>	<b>Ce</b>	<b>Pr</b>	<b>Nd</b>
Lanthan	Ceri	Praseodymi	Neodymi
89	90	91	92
(227)	232.04	231.04	238.03
<b>Ac</b>	<b>Th</b>	<b>Pa</b>	<b>U</b>
Actini	Thori	Protactini	Urani





## CHÚ THÍCH

  Hydro – một loại khí phản ứng

## KIM LOẠI PHẢN ỨNG

  Kim loại kiềm – kim loại mềm, rất dễ phản ứng

  Kim loại kiềm thổ – kim loại phản ứng ở mức độ vừa phải

## CÁC NGUYÊN TỐ CHUYỂN TIẾP

  Kim loại chuyển tiếp – một nhóm kim loại đa dạng, nhiều loại có đặc tính có giá trị

## PHI KIM

  Á kim – các nguyên tố có tính chất giữa các kim loại và phi kim loại

  Kim loại yếu – chủ yếu là các kim loại tương đối mềm với điểm nóng chảy thấp

  Carbon và các phi kim loại khác

  Halogen – phi kim rất dễ phản ứng

  Khí trơ – khí không màu, gần như không có phản ứng

## NGUYÊN TỐ ĐẤT HIỂM

  Còn được gọi là Họ Lanthan và Họ Actini, đây là những kim loại phản ứng – một số rất hiếm, số khác được tổng hợp trong phòng thí nghiệm

## Chu kỳ, nhóm và khối

Tất cả các nguyên tố trong một hàng, hoặc chu kỳ, có cùng số orbital electron (xem trang 25). Các cột trong bảng tuần hoàn, được gọi là các nhóm, chứa các nguyên tố có cùng số electron trong lớp vỏ ngoài cùng, và do đó phản ứng hóa học theo cách tương tự nhau. Bốn khối chính (xem chú thích) đã gộp các nguyên tố có tính chất tương tự nhau, chẳng hạn như các nguyên tố chuyển tiếp, phần lớn là các kim loại cứng và sáng bóng. Hydro có một tập hợp các tính chất riêng biệt và bản thân nó là một nhóm riêng.

8	9	10	11	12
26 55.845 <b>Fe</b> Sắt	27 58.933 <b>Co</b> Cobalt	28 58.693 <b>Ni</b> Nickel	29 63.546 <b>Cu</b> Đồng	30 65.38 <b>Zn</b> Kẽm
44 101.07 <b>Ru</b> Rutheni	45 102.91 <b>Rh</b> Rhodi	46 106.42 <b>Pd</b> Paladi	47 107.87 <b>Ag</b> Bạc	48 112.41 <b>Cd</b> Cadimi
76 190.23 <b>Os</b> Osmi	77 192.22 <b>Ir</b> Iridi	78 195.08 <b>Pt</b> Bạch kim	79 196.97 <b>Au</b> Vàng	80 200.59 <b>Hg</b> Thủy ngân
108 (277) <b>Hs</b> Hassi	109 (278) <b>Mt</b> Meitneri	110 (281) <b>Ds</b> Darmstati	111 (282) <b>Rg</b> Roentgeni	112 (285) <b>Cn</b> Copernici

61 (145) <b>Pm</b> Promethi	62 150.36 <b>Sm</b> Samari	63 151.96 <b>Eu</b> Europi	64 157.25 <b>Gd</b> Gadolini	65 158.93 <b>Tb</b> Terbi
93 (237) <b>Np</b> Neptuni	94 (244) <b>Pu</b> Plutoni	95 (243) <b>Am</b> Americi	96 (247) <b>Cm</b> Curium	97 (247) <b>Bk</b> Berkeli

13	14	15	16	17	18
5 10.81 <b>B</b> Bor	6 12.011 <b>C</b> Carbon	7 14.007 <b>N</b> Nitơ	8 15.999 <b>O</b> Oxy	9 18.998 <b>F</b> Fluor	10 20.180 <b>Ne</b> Neon
13 26.982 <b>Al</b> Nhôm	14 28.085 <b>Si</b> Silic	15 30.974 <b>P</b> Phosphor	16 32.06 <b>S</b> Lưu huỳnh	17 35.45 <b>Cl</b> Chlor	18 39.948 <b>Ar</b> Argon
31 69.723 <b>Ga</b> Gali	32 72.63 <b>Ge</b> Germani	33 74.922 <b>As</b> Arsenic	34 78.97 <b>Se</b> Seleni	35 79.904 <b>Br</b> Brom	36 83.80 <b>Kr</b> Krypton
49 114.82 <b>In</b> Indi	50 118.71 <b>Sn</b> Thiếc	51 121.76 <b>Sb</b> Antimon	52 127.60 <b>Te</b> Teluri	53 126.90 <b>I</b> Iod	54 131.29 <b>Xe</b> Xenon
81 204.38 <b>Tl</b> Tali	82 207.2 <b>Pb</b> Chì	83 208.98 <b>Bi</b> Bismuth	84 (209) <b>Po</b> Poloni	85 (210) <b>At</b> Astatin	86 (222) <b>Rn</b> Radon
113 (286) <b>Nh</b> Nihoni	114 (289) <b>Fl</b> Flerovi	115 (289) <b>Mc</b> Moscovi	116 (293) <b>Lv</b> Livermori	117 (294) <b>Ts</b> Tennessine	118 (294) <b>Og</b> Oganesson

66 162.50 <b>Dy</b> Dysprosi	67 164.93 <b>Ho</b> Holmi	68 167.26 <b>Er</b> Erbi	69 168.93 <b>Tm</b> Thulium	70 173.05 <b>Yb</b> Yterbi	71 174.97 <b>Lu</b> Luteti
98 (251) <b>Cf</b> Californi	99 (252) <b>Es</b> Einstein	100 (257) <b>Fm</b> Fermi	101 (258) <b>Md</b> Mendelevi	102 (259) <b>No</b> Nobeli	103 (262) <b>Lr</b> Lawrenci <sup>(1)</sup>

1. Danh pháp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn này và trong toàn bộ sách được thống nhất theo Tiêu chuẩn Quốc gia về Thuật ngữ hóa học – Danh pháp các nguyên tố và hợp chất hóa học TCVN 5530:2010.



# Phóng xạ


Vật liệu phóng xạ chứa các hạt nhân không ổn định, liên tục giải phóng năng lượng, hay bức xạ. Phóng xạ thường được coi là nguy hiểm, và có thể nguy hiểm nếu xử lý không đúng cách. Tuy nhiên, nó cũng có thể giúp làm giảm sự phụ thuộc của con người vào các nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm.

## Bức xạ là gì?


Bức xạ bao gồm các luồng sóng hoặc hạt năng lượng có khả năng đánh bật các electron khỏi các nguyên tử khác. Với lượng lớn, bức xạ có thể làm hỏng ADN trong các tế bào. Ngoài ra, nó có thể tạo ra các gốc tự do phản ứng trong cơ thể, và các gốc này cũng có thể làm hỏng các tế bào.

## Các loại bức xạ

Một hạt alpha bao gồm hai neutron và hai proton (một hạt nhân heli). Một hạt beta là một electron hoặc một positron. Tia gamma là sóng điện từ năng lượng cao.



## NGUYÊN TỬ PHÓNG XẠ



## Năng lượng hạt nhân

Khi các nguyên tử phân tách hoặc hợp nhất với nhau, năng lượng sẽ được giải phóng dưới dạng năng lượng hạt nhân. Năng lượng này tồn tại ở dạng nhiệt, có thể được sử dụng để đun sôi nước nhằm cung cấp năng lượng cho turbine, hết nhu trong các máy phát điện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch (xem trang 84).

## Phản ứng phân hạch

Trong phản ứng phân hạch, hạt nhân nguyên tử được phân tách để giải phóng năng lượng. Trong nhà máy điện hạt nhân, quá trình này được kiểm soát cẩn thận nhằm ngăn chặn phản ứng dây chuyền.

### 1 Neutron bắn vào hạt nhân nguyên tử


Vật liệu phóng xạ (phổ biến nhất là urani) bị bắn phá bằng neutron, một số neutron trong đó sẽ bắn trúng vào hạt nhân của một nguyên tử và làm nó mất ổn định.

### 2 Phân tách hạt nhân

Các hạt nhân không ổn định tách làm đôi. Sự phân hạch này giải phóng một lượng lớn năng lượng và thêm nhiều neutron tự do.

### 3 Phản ứng dây chuyền

Các neutron vừa được giải phóng lại tiếp tục bắn vào các nguyên tử khác, từ đó có thể phân tách và giải phóng nhiều neutron hơn, khởi đầu một phản ứng dây chuyền.








## BẢN RÃ VÀ PHÂN RÃ

Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ là thời gian cần thiết để chất đó phân rã còn bằng một nửa lượng ban đầu. Một số chất phân rã rất nhanh, trong khi số khác lại mất hàng triệu năm. Ví dụ, urani-235, được sử dụng trong các lò phản ứng phân hạch, có chu kỳ bán rã khoảng 704 triệu năm, điều này tạo ra khó khăn trong xử lý chất thải hạt nhân.



## PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH LIỆU CÓ AN TOÀN?

Sẽ không có nguy cơ bị tan chảy lõi trong lò phản ứng nhiệt hạch (khác với lò phản ứng phân hạch) bởi vì bất kỳ trục trặc nào cũng sẽ làm hạ nhiệt plasma và dừng phản ứng.

### Phản ứng nhiệt hạch

Trong các phản ứng nhiệt hạch, hạt nhân của các nguyên tử riêng biệt được hợp nhất với nhau thành một hạt nhân lớn hơn. Quá trình này giải phóng một lượng năng lượng khổng lồ, và đây chính là cách Mặt Trời và các ngôi sao khác tạo ra ánh sáng và nhiệt (xem trang 193).

#### 1 Nung nóng hạt nhân


Hạt nhân triti và deuteri được nung nóng đến nhiệt độ cực cao để tạo thành plasma và cung cấp cho chúng đủ năng lượng để vượt qua lực đẩy tự nhiên của chúng.

#### 2 Tổng hợp hạt nhân

Các hạt nhân deuteri và triti năng lượng cao va chạm với nhau, và sự va chạm này khiến hai hạt nhân hợp nhất với nhau.

#### 3 Năng lượng được giải phóng

Sự hợp nhất của hai hạt nhân tạo ra một hạt nhân heli và giải phóng một lượng khổng lồ năng lượng. Một neutron dư thừa cũng được giải phóng.





# Hỗn hợp và hợp chất

Khi các chất khác nhau được trộn lẫn, một trong hai điều có thể xảy ra. Chúng có thể phản ứng để tạo thành một chất mới – một hợp chất – hoặc chúng vẫn là các chất riêng lẻ nhưng được trộn chung với nhau.

## Hỗn hợp

Khi được trộn lẫn, nhiều chất không phản ứng với nhau mà giữ nguyên tính chất hóa học, như hỗn hợp cát và muối. Các chất có thể là các nguyên tử riêng lẻ, phân tử của một nguyên tố, hoặc phân tử của nhiều hơn một nguyên tố (hợp chất).

Hạt của một chất

Hạt của một chất khác

## Hợp chất

Hợp chất chứa các nguyên tử của hai hoặc nhiều nguyên tố liên kết với nhau về mặt hóa học. Thuộc tính của hợp chất có thể khác rất nhiều so với thuộc tính của các thành tố của nó; ví dụ, hydro và oxy đều là các chất khí nhưng kết hợp với nhau tạo thành nước – một chất lỏng.

Liên kết hóa học giữa các nguyên tử của các nguyên tố khác nhau

Giấy lọc

Các hạt bị giữ lại bởi giấy lọc

Chất lỏng được lọc (dịch lọc)

## Phân tách hỗn hợp

Hỗn hợp có thể được tách ra bằng các phương pháp vật lý, vì thành phần của chúng không liên kết hóa học với nhau. Phương pháp phân tách thích hợp còn tùy thuộc vào loại hỗn hợp. Ví dụ, các hỗn hợp trong đó chỉ có một thành phần hòa tan có thể được tách ra bằng cách lọc. Các loại hỗn hợp khác đòi hỏi các phương pháp phức tạp hơn, chẳng hạn như sắc ký, chưng cất hoặc ly tâm.

### Lọc

Bộ lọc cho phép các hạt rất nhỏ hoặc các hạt hòa tan đi qua, nhưng chặn các hạt lớn hơn hoặc không hòa tan. Chẳng hạn, dung dịch muối sẽ chảy qua bộ lọc nhưng bất kỳ hạt cát nào trong hỗn hợp cũng sẽ bị bộ lọc giữ lại.






## Các loại hỗn hợp

Có nhiều loại hỗn hợp khác nhau, thay đổi tùy theo độ hòa tan của các thành phần và kích thước của các hạt. Dung dịch hình thành khi một chất hòa tan trong chất còn lại, chẳng hạn như đường hòa tan trong nước (xem trang 62-63). Trong hệ keo và huyền phù, các hạt của các thành phần không hòa tan mà phân tán vào nhau.

Chất tan hòa tan hoàn toàn



Hạt nhỏ



Hạt lớn



### Dung dịch


Trong dung dịch, chẳng hạn như muối hòa tan trong nước, tất cả các thành phần đều ở cùng một trạng thái của vật chất - ở đây là chất lỏng.

### Hệ keo

Một hệ keo có các hạt nhỏ phân bố đều qua hỗn hợp. Các hạt này rất nhỏ, vô hình với mắt thường, và không lắng xuống.

### Huyền phù

Huyền phù chứa các hạt phân tán có kích thước của hạt bụi. Chúng có thể được nhìn thấy bằng mắt thường và có thể lắng xuống.



### Sắc ký

Các thành phần của hỗn hợp thường có thể được tách ra bằng sắc ký. Khi dung môi di chuyển lên phía trên dải giấy lọc, các thành phần riêng lẻ trong hỗn hợp sẽ được đưa đến các vị trí khác nhau.

### Chưng cất

Hỗn hợp chất lỏng với các điểm sôi khác nhau có thể được tách ra bằng cách chưng cất. Khi hỗn hợp được làm nóng, từng thành phần sẽ sôi lên, và mỗi thành phần đó sẽ được ngưng tụ lại thành chất lỏng.

### Ly tâm

Một hỗn hợp các hạt có mật độ khác nhau hoặc các hạt lơ lửng trong chất lỏng có thể được tách ra bằng cách quay trong máy ly tâm. Các hạt phân bố dày hơn hoặc các hạt lơ lửng tạo thành các lớp ở phía dưới.




# Phân tử và ion

Một phân tử bao gồm hai hoặc nhiều nguyên tử liên kết với nhau. Các nguyên tử có thể thuộc cùng một nguyên tố hoặc các nguyên tố khác nhau. Chúng được liên kết bởi lực giữa các hạt tích điện của chúng – lực hút được tạo ra bởi sự chuyển giao hoặc chia sẻ electron.


## Vỏ electron

Electron quay quanh hạt nhân ở các mức năng lượng riêng biệt, hay còn gọi là lớp vỏ. Mỗi lớp có thể chứa một số lượng electron tối đa cố định: lớp vỏ thứ nhất có thể chứa tối đa hai electron, lớp thứ hai và thứ ba có thể chứa đến tám electron. Các nguyên tử luôn hướng đến việc sắp xếp các electron sao cho ổn định nhất về mặt năng lượng, thường có nghĩa là lớp vỏ ngoài cùng có đủ số electron.



## Thế nào là một ion?

Các nguyên tử trung hòa về điện – điện tích dương của các proton trong hạt nhân cân bằng với điện tích âm của các electron. Các nguyên tử thường tích điện nhằm đạt được sự sắp xếp electron ổn định – một nguyên tử tích điện (hay một phân tử tích điện) được gọi là ion. Một số nguyên tử thường ion hóa bằng cách thu các electron để lấp đầy một hoặc hai khoảng trống ở lớp vỏ ngoài cùng của chúng. Trong các trường hợp khác – chẳng hạn, đối với các kim loại nhóm I (kiềm) như natri (xem trang 34) – cách tốt hơn là từ bỏ một vài electron ở lớp vỏ ngoài. Hai cách này đều sẽ làm tích điện nguyên tử, vì chúng không còn có số electron và proton bằng nhau.








## Chia sẻ electron


Đối với một số cặp nguyên tử, cách dễ nhất để ổn định là chia sẻ electron với nhau. Các nguyên tử dùng chung electron được liên kết bằng các lực gọi là liên kết cộng hóa trị. Các liên kết này khá phổ biến giữa hai nguyên tử của cùng một nguyên tố, hoặc nguyên tử của hai nguyên tố đứng gần nhau trong bảng tuần hoàn.



PHÂN TỬ CHLOR:  $\text{Cl}_2$

### Liên kết đơn

Chlor có bảy electron lớp ngoài cùng, vì vậy mỗi nguyên tử chlor trong cặp chia sẻ một electron để lớp ngoài cùng của chúng có tối đa electron. Những liên kết đơn này tạo thành các phân tử  $\text{Cl}_2$ .





PHÂN TỬ OXY:  $\text{O}_2$

### Liên kết đôi

Oxy chỉ có sáu electron ngoài cùng, vì vậy chúng phải chia sẻ hai cặp electron để trở nên ổn định. Sự chia sẻ hai cặp electron này được gọi là liên kết đôi.

## Chuyển giao electron

Khi một nguyên tử chỉ có một hoặc một vài electron ở lớp vỏ ngoài gặp phải một nguyên tử có khoảng trống ở lớp vỏ ngoài, nó sẽ tặng electron cho nguyên tử kia, tạo thành các ion dương và âm. Vì điện tích trái dấu thì hút nhau, hai ion này được liên kết về tĩnh điện, tạo thành một hợp chất ion.



### 1 Chuyển giao electron

Một electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử natri chuyển sang chlor, tạo ra lớp vỏ ngoài đầy đủ cho cả hai nguyên tử, đồng thời ion hóa cả hai, tạo thành cation natri và anion chloride. Với các cặp nguyên tử khác, hai, ba hoặc nhiều electron hơn có thể di chuyển.

### 2 Hình thành liên kết ion

Các cation và anion hút lẫn nhau, tạo thành một hợp chất gọi là natri chloride (muối). Điện tích được cân bằng, do đó, các hợp chất trung hòa về điện. Các hợp chất ion có xu hướng tiếp tục liên kết để tạo thành các mạng lớn hơn, thường sẽ tạo thành các tinh thể (xem trang 60).



# Tạo ra phản ứng


Phản ứng hóa học là các quá trình thay đổi các chất bằng cách phá vỡ liên kết nguyên tử của chúng và tạo ra các liên kết mới. Nhiều phản ứng trong số này diễn ra ngay trong cơ thể con người và đóng vai trò rất quan trọng đối với sự sống còn của chúng ta.

## Phản ứng là gì?

Khi các chất xảy ra phản ứng hóa học, các nguyên tử của chúng sẽ được sắp xếp lại. Hãy hình dung những nguyên tử này giống như các khối Lego – chúng khớp với nhau theo nhiều cách, nhưng số lượng và loại khối vẫn giữ nguyên. Cách các nguyên tử được sắp xếp lại phụ thuộc vào việc chúng phản ứng với thứ gì. Các chất phản ứng với nhau được gọi là chất phản ứng, và các chất mới mà chúng tạo thành được gọi là sản phẩm.


### Phản ứng không thể đảo ngược

Hầu hết các phản ứng là không thể đảo ngược, có nghĩa là chúng chỉ xảy ra theo một chiều, chẳng hạn như khi acid hydrochloric (HCl) được trộn với natri hydroxide (NaOH) sẽ tạo ra natri chloride (NaCl) và nước (H<sub>2</sub>O).



## MUỐI ĂN ĐƯỢC TẠO RA NHƯ THẾ NÀO?


Muối ăn có thể được tạo ra bằng cách trộn natri và chlor với nhau. Điều này gây ra phản ứng hóa học tạo thành hợp chất natri chloride (còn được gọi là muối ăn).



## Cân bằng động

Trong các phản ứng thuận nghịch, phản ứng bắt đầu khi các chất phản ứng được trộn lẫn, tạo thành các sản phẩm (trong ví dụ này là amonia). Nhưng sau một thời gian, nếu không có gì được thêm vào hoặc lấy ra, lượng sản phẩm sẽ ngừng tăng. Tại thời điểm này, phản ứng hóa học vẫn xảy ra theo cả hai hướng, nhưng chúng cân bằng nhau. Điều này được gọi là cân bằng động.

Các phản ứng cân bằng lẫn nhau









## CHÚ THÍCH

- Oxy (O)
- Chlor (Cl)
- Hydro (H)
- Natri (Na)
- Nitơ (N)


## Phản ứng thuận nghịch

Trong một số phản ứng, chất phản ứng có thể được hình thành lại từ các sản phẩm, chẳng hạn như trong việc tạo ra amoniac ( $\text{NH}_3$ ) từ nitơ ( $\text{N}_2$ ) và hydro ( $\text{H}_2$ ).



## Nghiêng cán cân

Nếu ta thay đổi một đại lượng trong phản ứng cân bằng, trạng thái cân bằng sẽ dịch chuyển để chống lại sự thay đổi đó. Bốn ví dụ dưới đây cho thấy những gì xảy ra khi bốn yếu tố khác nhau được thay đổi trong quá trình tạo ra amoniac.



## CÁC PHẢN ỨNG HÓA HỌC LIÊN TỤC XẢY RA TRONG 37,2 TỶ TẾ BÀO CỦA CƠ THỂ CON NGƯỜI



## Tăng nồng độ sản phẩm

Điều này dẫn đến việc hình thành nhiều chất phản ứng hơn để chống lại sự gia tăng sản phẩm.


## Các loại phản ứng thường gặp

Phản ứng hóa học có thể được nhóm thành một số loại. Một số liên quan đến việc kết hợp các phân tử, số khác lại chia tách các phân tử phức tạp thành các phân tử đơn giản hơn. Trong một số phản ứng, các nguyên tử trao đổi vị trí cho nhau, tạo ra các phân tử khác. Sự đốt cháy (xem trang 54-55) cũng là một loại phản ứng, xảy ra khi oxy phản ứng với một chất khác, tạo ra đủ nhiệt và ánh sáng để đốt cháy.

Loại phản ứng	Định nghĩa	Phương trình
<b>Tổng hợp</b>	Hai hoặc nhiều nguyên tố hoặc hợp chất kết hợp với nhau tạo thành một chất phức tạp hơn	$A + B \rightarrow AB$
<b>Phân hủy</b>	Các hợp chất phân hủy thành các chất đơn giản hơn	$AB \rightarrow A + B$
<b>Thay thế đơn</b>	Xảy ra khi một nguyên tố thay thế một nguyên tố khác trong một hợp chất	$AB + C \rightarrow AC + B$
<b>Thay thế đôi</b>	Xảy ra khi các nguyên tử khác nhau trong hai hợp chất khác nhau trao đổi vị trí	$AB + CD \rightarrow AC + BD$

## PHÁO HOA

Khi pháo hoa được bắn lên, một phản ứng hóa học sẽ nhanh chóng diễn ra, giải phóng chất khí, phát nổ ra bên ngoài thành những tia lửa màu. Màu sắc của tia lửa phụ thuộc vào kim loại được sử dụng. Ví dụ, stronti carbonat tạo ra pháo hoa màu đỏ.





# Phản ứng và năng lượng

Phản ứng chỉ có thể xảy ra nếu các nguyên tử tham gia có đủ năng lượng để bắt đầu quá trình phá vỡ và tái tạo liên kết của chúng. Các chất dễ phản ứng chỉ cần thêm ít năng lượng để kích hoạt phản ứng, nhưng các chất khác lại cần phải được nung nóng ở nhiệt độ cao thì mới phản ứng được, vì liên kết giữa các phân tử của chúng mạnh hơn.

## Năng lượng hoạt hóa


Để bắt đầu một phản ứng, năng lượng phải được đưa vào, gọi là năng lượng hoạt hóa. Quá trình này có thể so sánh với một ngọn núi mà người trượt tuyết cần phải leo lên thì mới có thể trượt xuống sườn bên kia. Một số phản ứng bắt đầu ngay khi các chất phản ứng được kết hợp với nhau. Những phản ứng này có mức năng lượng hoạt hóa thấp, chẳng hạn như phản ứng giữa acid mạnh và kiềm.

Người trượt tuyết leo lên đỉnh núi giống như năng lượng hoạt hóa cần thiết để bắt đầu phản ứng

Một khi đã lên đến đỉnh, cô ấy có thể trượt xuống; tương tự, các chất phản ứng bây giờ đã có đủ năng lượng để phản ứng, tạo thành các sản phẩm, và giải phóng năng lượng

NĂNG LƯỢNG HOẠT HÓA

NĂNG LƯỢNG GIẢI PHÓNG



### Giải phóng năng lượng rỗng

Trộn calci oxide với nước là một ví dụ về phản ứng tỏa nhiệt, bởi vì năng lượng được giải phóng (dưới dạng nhiệt) nhiều hơn được hấp thụ trong quá trình phản ứng. Vì vậy, kết quả của phản ứng là giải phóng năng lượng rỗng.

## LIỀU PHẢN ỨNG CÓ THỂ VƯỢT RA NGOÀI TẦM KIỂM SOÁT?

Nếu không được kiểm soát chặt chẽ, tốc độ của phản ứng tỏa nhiệt có thể gia tăng tới mức nguy hiểm khi nhiệt độ tăng. Điều này sẽ dẫn đến gây ra các vụ nổ, giải phóng nhiều hóa chất độc hại, như trường hợp ở Bhopal, Ấn Độ, năm 1984.

## Năng lượng được giải phóng hoặc hấp thụ

Nếu nhiều năng lượng được giải phóng hơn là hấp thụ, các sản phẩm có ít năng lượng hơn các chất phản ứng, và phản ứng tỏa nhiệt. Nếu năng lượng hấp thụ nhiều hơn năng lượng giải phóng, các chất phản ứng có ít năng lượng hơn sản phẩm, và phản ứng là phản ứng thu nhiệt.

Lần này, người trượt tuyết cần phải leo lên một ngọn núi cao hơn, tượng trưng cho năng lượng hoạt hóa cao hơn


PHẢN ỨNG TỎA NHIỆT





## KEM TRÁI CÂY SHERBET



Khi nước bọt tiếp xúc với acid citric và natri bicarbonat trong kem trái cây, chúng sẽ hòa tan và phản ứng, tạo ra bọt khí carbon dioxide, khiến cho món sherbet có nhiều bọt. Vì nhiệt được hấp thụ bởi phản ứng, hỗn hợp sherbet khi tan ra sẽ tạo cảm giác lạnh nơi đầu lưỡi.



Người trượt tuyết trượt xuống một con dốc ngắn hơn ngọn núi mà cô leo lên; tương tự, năng lượng được giải phóng ít hơn so với năng lượng hoạt hóa được đưa vào lúc bắt đầu.



**CAESI**  
**PHẢN ỨNG**  
**CỰC NHẠY,**  
**NÓ BỐC CHÁY**  
**KHI TIẾP XÚC VỚI**  
**KHÔNG KHÍ**



### Hấp thụ năng lượng rỗng

Nung nóng calci carbonat là một ví dụ về phản ứng thu nhiệt, bởi vì năng lượng được hấp thụ (dưới dạng nhiệt) nhiều hơn là được giải phóng trong phản ứng. Vì vậy, kết quả của phản ứng là sự hấp thụ năng lượng rỗng.

**PHẢN ỨNG THU NHIỆT**

## Tốc độ phản ứng

Phản ứng chỉ có thể xảy ra khi các nguyên tử của chất phản ứng va chạm vào nhau với đủ năng lượng. Tăng nhiệt độ, nồng độ hoặc diện tích bề mặt tiếp xúc của chất phản ứng, hoặc giảm thể tích vật chứa sẽ làm tăng số lượng va chạm và tăng tốc độ phản ứng.


### Tăng nồng độ

Nhiều chất phản ứng dẫn đến va chạm nhiều hơn giữa các nguyên tử, do đó tốc độ phản ứng tăng lên.

**TRƯỚC**



**SAU**



### CHẤT KHÍ VÀ CHẤT LỎNG


### Tăng nhiệt độ

Điều này khiến các nguyên tử di chuyển nhanh hơn, va chạm thường xuyên hơn và với nhiều năng lượng hơn.

**TRƯỚC**



**SAU**




### CHẤT KHÍ, LỎNG, RẮN


### Giảm thể tích

Trong một thùng chứa nhỏ hơn, các nguyên tử bị nén lại với nhau, khiến chúng va chạm thường xuyên hơn.

**TRƯỚC**



**SAU**




### CHỈ CHẤT KHÍ


### Tăng diện tích bề mặt chất phản ứng

Va chạm chỉ xảy ra trên các bề mặt của chất rắn; tăng diện tích bề mặt sẽ làm tăng tốc độ phản ứng.

**TRƯỚC**




**SAU**



### CHỈ CHẤT RẮN





### Các thuộc tính chính

Thuộc tính của kim loại giúp chúng trở nên hữu ích cho một loạt các mục đích sử dụng - từ dây đồng có tính dẫn điện cao và chảo, đến đồ trang sức bằng vàng và bạch kim không dễ phản ứng nhưng dễ uốn thành hình.





# Kim loại

Kim loại chiếm hơn 3/4 các nguyên tố được tìm thấy trong tự nhiên trên Trái Đất và cực kỳ đa dạng về vẻ ngoài lẫn cách thức hoạt động. Tuy nhiên, vẫn có những tính chất chính mà hầu hết các kim loại đều chia sẻ.

## Thuộc tính của kim loại

Kim loại là các chất kết tinh, vì vậy chúng thường cứng, sáng bóng, dẫn điện và dẫn nhiệt rất tốt. Chúng cũng có khối lượng riêng lớn, với điểm nóng chảy và sôi cao, nhưng có thể dễ dàng được định hình qua nhiều phương pháp. Dù vậy, một số kim loại cũng đi ngược lại xu hướng chung. Chẳng hạn, thủy ngân là chất lỏng ở nhiệt độ phòng vì các electron ở lớp vỏ ngoài của chúng rất ổn định, bởi vậy chúng không có xu hướng liên kết với các nguyên tử khác.

## GỈ SÉT

Nhiều kim loại có tính phản ứng cao, đặc biệt là các kim loại nhóm I (xem trang 34-35). Hầu hết các kim loại tạo thành oxide khi chúng kết hợp với oxy. Ví dụ, khi tiếp xúc với oxy trong không khí hoặc nước, sắt tạo thành oxide sắt, còn được gọi là gỉ sét.




## Hợp kim


Hầu hết các kim loại nguyên chất thường quá mềm, giòn, hoặc có độ phản ứng quá cao để đem vào ứng dụng thực tế. Việc kết hợp các kim loại với nhau hoặc trộn kim loại với phi kim sẽ tạo thành hợp kim, với các tính chất được cải thiện. Thay đổi tỷ lệ và kim loại sẽ làm thay đổi tính chất của hợp kim. Một trong những hợp kim phổ biến là thép – hỗn hợp của sắt, carbon và vài nguyên tố khác. Thêm nhiều carbon làm cho thép cứng hơn, tốt cho việc xây dựng. Thêm chromi giúp tạo ra thép không gỉ chống ăn mòn. Các nguyên tố khác cũng có thể được thêm vào thép để tăng khả năng chịu nhiệt, độ bền, hoặc độ cứng nhằm đáp ứng yêu cầu cần thiết như phụ tùng xe hơi hoặc máy khoan.

### Thành phần hợp kim


Đồng tạo thành hai hợp kim phổ biến: đồng thanh (thiếc được thêm vào để tăng độ cứng); và đồng thau (kẽm giúp cải thiện tính dẻo uốn và độ bền của hợp kim). Thép không gỉ, một hợp kim phổ biến khác, cũng có thành phần thay đổi.



ĐỒNG THANH



ĐỒNG THAU



THÉP KHÔNG GỈ ĐIỂN HÌNH

## HUY CHƯƠNG VÀNG OLYMPIC CÓ THỰC SỰ LÀ VÀNG?

Những huy chương vàng hiện nay chỉ có khoảng 6 g vàng thật (lớp mạ). Huy chương vàng Olympic bằng vàng thật cuối cùng đã được trao vào năm 1912.




# Hydro

Nguyên tố hydro được cho là chiếm đến 90% phần nhìn thấy được của Vũ trụ. Nó đóng vai trò rất quan trọng đối với sự sống trên Trái Đất, chủ yếu là bởi nó liên quan mật thiết đến sự hình thành của nước và các hợp chất hữu cơ gọi là hydrocarbon. Hydro cũng có tiềm năng là nguồn năng lượng sạch cho tương lai.


## Hydro là gì?

Hydro là thành phần chính của các ngôi sao và các hành tinh như Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Hải Vương và Sao Thiên Vương. Trên Trái Đất, ở nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn, hydro là một loại khí không màu, không mùi và không vị. Nó rất dễ cháy và tương đối dễ phản ứng, vì vậy trên Trái Đất, nó chủ yếu tồn tại ở dạng phân tử như nước, tức là hydro kết hợp với oxy. Hydro và carbon tạo thành hàng triệu hợp chất hữu cơ được gọi là hydrocarbon, làm nền tảng của nhiều sinh vật sống.



## Nguyên tố đơn giản nhất

Chỉ bao gồm một proton và một electron, hydro là nguyên tố nhỏ nhất, nhẹ nhất và đơn giản nhất trong bảng tuần hoàn (xem trang 34-35). Nhưng nó có thể phản ứng theo những cách thức vô cùng phức tạp, hình thành các loại liên kết nguyên tử khác nhau, và cho phép tương tác giữa các acid và base.







## Khai thác hydro


Trước khi hydro có thể được sử dụng làm nhiên liệu, nó phải được cô lập. Nó có thể được chiết xuất trong phản ứng hơi nước với khí methan, nhưng quá trình này sẽ tạo ra khí nhà kính. Một phương pháp sạch hơn gọi là điện phân, sử dụng điện để tách nước thành các nguyên tử cấu thành của nó. Tuy nhiên, phương pháp này thường kém hiệu quả và tốn năng lượng, vì vậy người ta đang phát triển thêm các phương pháp khác để phân tách các phân tử nước bằng cách sử dụng các xúc tác chuyên dụng.

### Điện phân hoạt động ra sao?

Truyền dòng điện qua nước làm cho các nguyên tử hydro và oxy lần lượt mất đi và thu được các electron, biến chúng thành các hạt tích điện (ion). Các ion sau đó di chuyển đến cực dương và cực âm, tái hợp với các electron của chúng và biến trở lại thành các nguyên tử hydro và oxy.

Các ion oxy âm ( $O^{2-}$ ) bị hút về cực dương; mỗi ion mất đi hai electron để tạo thành một nguyên tử oxy ( $O$ ) và các nguyên tử phản ứng tạo thành phân tử  $O_2$ .

Ống nghiệm thu thập oxy



### Nhiên liệu của tương lai

Xe hơi chạy bằng hydro sử dụng các thùng chứa khí hydro nén, cung cấp hydro cho các pin nhiên liệu nằm trong một ngăn xếp. Trong các pin này, hydro và oxy trải qua một phản ứng điện hóa, tạo ra điện để cung cấp cho động cơ xe.

Bộ điều khiển công suất lấy điện từ pin nhiên liệu, điều khiển lưu lượng của nó đến động cơ

**BỘ ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT**

**ĐỘNG CƠ**

**NGĂN CHỨA PIN NHIÊN LIỆU**

### 2 Chuyển đổi thành điện

Ngăn chứa pin nhiên liệu bao gồm hàng trăm pin nhiên liệu riêng lẻ. Trong mỗi pin, hydro và oxy được kết hợp để tạo ra điện. Quá trình này hiệu quả hơn nhiều so với việc đốt cháy nhiên liệu trong một chiếc xe chạy bằng xăng.

## Xe chạy bằng hydro

Năng lượng lưu trữ trong hydro khiến nó trở thành một nhiên liệu thay thế khả thi cho xăng. Nhưng vì là chất khí nên nó chứa ít năng lượng trên một đơn vị thể tích hơn xăng, và phải được bảo quản trong môi trường áp suất cao. Điều này cần đến các thiết bị chuyên dụng đòi hỏi năng lượng, từ đó tạo ra khí thải. Các nhà khoa học đang phát triển, cải tiến các phương pháp lưu trữ và vận chuyển, chẳng hạn như hydride kim loại. Những chất này lưu trữ hydro ở dạng rắn, mà sau đó sẽ trải qua phản ứng hóa học thuận nghịch (xem trang 42-43)

để giải phóng hydro tinh khiết khi cần. Điều này giúp giải quyết bài toán lưu trữ, nhưng lại tạo ra các vấn đề của riêng nó, chẳng hạn như khối lượng của hợp chất.

### 3 Cung cấp cho động cơ

Một động cơ điện trực tiếp điều khiển các bánh xe, vì vậy nó ít gây tiếng ồn hơn hẳn so với động cơ đốt trong. Năng lượng bị lãng phí ít hơn, giúp cho quá trình hiệu quả hơn.



# Carbon

Nguyên tố carbon chiếm 20% trong tất cả các sinh vật sống và các nguyên tử của nó là vật liệu xây dựng nên các phân tử phức tạp nhất mà khoa học biết đến. Không có nguyên tố nào khác có cấu trúc đủ linh hoạt để hoạt động theo cách tương tự.

## Điều gì khiến carbon đặc biệt?

Các nguyên tử carbon liên kết với các nguyên tử khác theo nhiều cách để tạo thành một loạt các hình dạng phân tử đáng kinh ngạc. Mỗi nguyên tử carbon có một vỏ ngoài gồm bốn electron có thể tạo thành bốn liên kết mạnh. Thông thường nhất, các nguyên tử carbon liên kết với các nguyên tử hydro nhỏ hơn, hoặc liên kết với nhau – nhưng các nguyên tố khác cũng có thể là một phần trong đó. Kết quả thu được là các phân tử có chứa một “bộ xương” carbon liên kết với nhau và một “lớp da” hydro bao phía ngoài: từ khí methan đơn giản, chỉ với một nguyên tử carbon, đến các chuỗi cực dài.

Hạt nhân của một nguyên tử carbon luôn chứa sáu proton tích điện dương

Mỗi liên kết cộng hóa trị bao gồm hai electron dùng chung – một từ hydro và một từ vỏ ngoài của carbon

Hạt nhân hydro bao gồm một proton duy nhất

## HỮU CƠ LÀ GÌ?

Theo nghĩa hóa học, các chất “hữu cơ” có chứa carbon. Thuật ngữ này thường được giới hạn trong các hợp chất của carbon và hydro, được gọi là hydrocarbon.

Hai electron quay xung quanh hạt nhân ở lớp trong cùng của nguyên tử


Hầu hết các nguyên tử carbon chứa sáu neutron trong hạt nhân của chúng; các loại carbon hiếm hơn – được gọi là đồng vị – có số neutron khác

## Liên kết carbon với hydro

Các nguyên tử carbon hình thành liên kết cộng hóa trị với các nguyên tử lân cận (xem trang 40-41). Điều này có nghĩa là electron được chia sẻ trong một kết nối mạnh mẽ. Một nguyên tử carbon liên kết với bốn nguyên tử hydro để tạo ra một phân tử methan.


## CHUỖI VÀ VÒNG

Có vô vàn cách để carbon và các nguyên tử khác có thể liên kết với nhau để tạo thành các phân tử. Mỗi hình dạng là một hợp chất hóa học độc nhất với các thuộc tính riêng. Chuỗi ngắn nhất là khí tự nhiên gồm hai nguyên tử carbon được gọi là ethan ( $C_2H_6$ ). Nếu đủ dài, các đầu của một chuỗi nguyên tử carbon có thể nối lại thành vòng – chẳng hạn như benzen ( $C_6H_6$ ), một thành phần lỏng của dầu thô.



Liên kết vòng được hình thành bởi các electron dùng chung giữa tất cả sáu nguyên tử carbon

Cấu trúc vòng thường thấy chứa sáu nguyên tử carbon trong một hình lục giác








## Các dạng thù hình của carbon

Các nguyên tử của một số nguyên tố ở dạng tinh khiết nhất của chúng có thể liên kết lại theo những cách khác nhau, hình thành các trạng thái vật lý khác nhau được gọi là thù hình. Carbon rắn có ba thù hình chính: than chì với cấu trúc lớp dễ vỡ, tinh thể kim cương siêu cứng, và fullerene dạng "chiếc lồng" rỗng.


### Than chì

Than chì dễ vỡ vì các nguyên tử carbon của nó được sắp xếp theo cấu tạo lớp, vì vậy chúng có thể trượt qua nhau. Mỗi nguyên tử có ba, thay vì bốn, liên kết đơn; các electron thừa di chuyển qua lại giữa các tấm, làm cho than chì có tính dẫn điện.




### Kim cương

Trong kim cương, các nguyên tử carbon được sắp xếp thành một tinh thể ba chiều, mỗi nguyên tử liên kết với bốn nguyên tử khác. Điều này khiến cho toàn bộ cấu trúc trở nên rất mạnh và rất cứng. Không có electron tự do nào, vì vậy khác với như than chì, kim cương không dẫn điện.



### Fullerene

Fullerene có các nguyên tử được sắp xếp thành những "chiếc lồng" hình cầu hoặc hình ống. Mặc dù rỗng, cấu trúc của chúng vẫn cứng cáp và mạnh mẽ; ngoài ra, sự sắp xếp nguyên tử độc đáo của fullerene có nhiều ứng dụng, chẳng hạn như giúp gia cố than chì trong vợt tennis.




**KIM CƯƠNG CULLINAN**  
- VIÊN KIM CƯƠNG LỚN NHẤT THẾ GIỚI -  
**CÓ TRỌNG LƯỢNG 621,35 G**




## Các khối xây dựng sự sống

Các phân tử chứa carbon phức tạp nhất đều nằm trong cơ thể của các sinh vật sống. Ở đây, các nguyên tử carbon thường xuyên kết hợp oxy, nitơ và một vài nguyên tố khác vào cấu trúc của chúng để tạo thành các chất sinh hóa - các phân tử của sự sống. Hầu hết trong số này rơi vào bốn nhóm chính: protein, carbohydrat, lipid và acid nucleic. Tất cả được hình thành qua các chuỗi phản ứng phức tạp được gọi là trao đổi chất.




### Protein

Các acid amin chứa carbon tạo thành chuỗi gọi là protein, vốn là thành phần tạo nên các mô như cơ bắp, cũng như giúp tăng tốc độ phản ứng trong tế bào.



### Carbohydrat


Carbon là cấu thành quan trọng của các loại carbohydrat, trong đó loại đơn giản nhất là đường, sẽ được phân giải để giải phóng năng lượng.



### Lipid

Chất béo và dầu - gọi chung là lipid - chứa các phân tử được gọi là acid béo, hình thành từ carbon, hydro và oxy. Rất nhiều trong số lipid này là nguồn dự trữ năng lượng.

Xương sống của chuỗi xoắn kép ADN được hình thành từ đường



### Acid nucleic

Acid nucleic - chẳng hạn như ADN - là các phân tử phức tạp mang thông tin di truyền; chúng bao gồm nitơ, phosphor và carbon.

### CHÚ THÍCH

- Carbon
- Hydro
- Oxy
- Nitơ



# Không khí

Không khí là hỗn hợp khí trong khí quyển. Nó rất quan trọng cho sự sống còn, cung cấp oxy cho hô hấp ở động vật, và carbon dioxide cho quang hợp ở thực vật.

Thế nên, khi không khí trở nên ô nhiễm, nó sẽ ảnh hưởng đến các quá trình này và có thể gây hại cho sức khỏe của chúng ta.

## Thành phần của không khí

Không khí chủ yếu là nitơ, với khoảng 20% oxy, 1% argon và một lượng nhỏ các loại khí khác bao gồm cả carbon dioxide ( $\text{CO}_2$ ). Lượng hơi nước trong không khí khác nhau tùy địa điểm, do đó nó thường không được tính vào thành phần của không khí, nhưng nó có thể chiếm tới 5% không khí ở vùng khí hậu ẩm. Hành vi của con người cũng làm thay đổi thành phần của không khí, đáng chú ý nhất là khi chúng ta làm tăng lượng  $\text{CO}_2$ .





**92% DÂN SỐ THẾ GIỚI ĐANG PHẢI HÍT THỞ LOẠI KHÔNG KHÍ VƯỢT QUÁ NGUỒN AN TOÀN THEO TIÊU CHUẨN WHO**

## Ô nhiễm không khí

Ô nhiễm không khí đang là một vấn đề nghiêm trọng – Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phát hiện ra rằng không khí ô nhiễm là nguyên nhân gây tử vong cao hơn cả lao phổi, HIV/AIDS và tai nạn giao thông cộng lại. Tại các nước đang phát triển, nguồn gây ô nhiễm không khí lớn nhất là đốt gỗ hoặc nhiên liệu khác trong nhà. Ở các thành phố, khí thải từ xe hơi, nhà ở, và các khu công nghiệp có thể hình thành các khu vực ô nhiễm cao. Tình hình này có thể làm trầm trọng thêm triệu chứng của bệnh hen suyễn và các bệnh hô hấp khác. Chất dạng hạt (bụi mịn) – một hỗn hợp phức tạp gồm các hạt nhỏ trong không khí và các giọt chất lỏng – sẽ trở nên đặc biệt có hại nếu chúng đủ mịn để thâm nhập sâu vào phổi.

### Các chất gây ô nhiễm chính và nguồn của chúng

Có sáu chất gây ô nhiễm chính, được thải trực tiếp vào khí quyển, và tương tự, cũng có sáu nguồn tạo ra các chất gây ô nhiễm chính. Hình minh họa được mã hóa màu cho thấy tỷ trọng chất gây ô nhiễm chính tạo ra bởi từng nguồn.








## Màu sắc thay đổi của bầu trời

Màu sắc của ánh sáng khá kiến phụ thuộc vào việc sóng ánh sáng nào chiếu vào mắt chúng ta. Ánh sáng lam, với bước sóng ngắn, bị tán xạ nhiều nhất bởi các hạt trong khí quyển. Quá trình này tạo ra hiệu ứng bầu trời xanh vào ban ngày (xem trang 107). Ánh sáng đỏ và cam, với bước sóng dài hơn, bị tán xạ ít nhất, vì vậy ta không thể nhìn thấy chúng vào ban ngày, nhưng có thể nhìn được chúng vào lúc hoàng hôn, khi mặt trời lặn gần xuống đường chân trời. Hoàng hôn màu đỏ như máu xảy ra ở các thành phố phần lớn là do các hạt lơ lửng thải ra từ động cơ đốt trong. Những hạt này tán xạ ánh sáng tím và lam và tăng cường ánh sáng đỏ.


### Hoàng hôn đỏ

Vào lúc hoàng hôn, mặt trời ở góc thấp, có nghĩa là ánh sáng phải đi qua nhiều khí quyển hơn, vậy nên chỉ còn lại ánh sáng đỏ và cam.




## Ô NHIỄM TRONG NHÀ



Không khí trong nhà của chúng ta cũng có thể bị ô nhiễm nặng. Benzen từ khói thuốc lá, sơn và nền thơm, nito dioxide phát ra từ quá trình đốt cháy không hoàn toàn trong bếp gas, và formaldehyde từ lớp mút xốp bên trong đồ nội thất đều cực kỳ phổ biến trong nhà, và tất cả đều nguy hiểm cho sức khỏe của chúng ta. Việc tăng số lượng cây trồng trong nhà sẽ giúp hấp thụ các hóa chất độc hại, máy lọc không khí cũng ngày càng hiệu quả hơn trong việc cải thiện chất lượng không khí.




**Công nghiệp**  
Các nhà máy gây ra một lượng lớn phát thải lưu huỳnh dioxide, nito oxide và chất dạng hạt.



**Nhà ở**  
Phần lớn lượng khí thải carbon monoxide sinh ra trong quá trình nấu nướng và sưởi ấm trong nhà, đặc biệt là với bếp lò nhiên liệu rắn.



**Cung cấp nhiên liệu**  
Chiết xuất, phương tiện vận chuyển và xử lý nhiên liệu cũng tạo ra ô nhiễm, chủ yếu là dưới dạng các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi.



**Nông nghiệp**  
Nông nghiệp gây ra phần lớn lượng khí thải amonia từ chất thải động vật.



# Cháy và nổ

Việc tìm ra lửa đã cho phép con người có thể nấu ăn, xua đuổi động vật nguy hiểm, tạo ra điện và phát triển các động cơ. Nhưng lửa cũng có thể gây ra thiệt hại lớn nếu nó vượt khỏi tầm kiểm soát; một quá trình đốt cháy đơn giản có thể trở thành một vụ nổ tàn khốc, vì vậy điều quan trọng là phải hiểu rõ cách hoạt động của lửa.

## Sự cháy

Cháy là một phản ứng hóa học. Một loại nhiên liệu, thông thường là một hydrocarbon như than đá hoặc methane, phản ứng với oxy trong không khí, giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt và ánh sáng. Trong quá trình đốt cháy hoàn toàn, với lượng oxy dồi dào, carbon dioxide và nước được tạo ra. Một khi nó đã bắt đầu, quá trình đốt cháy sẽ luôn tiếp tục, trừ phi lửa được dập tắt, hoặc nhiên liệu hay oxy cạn kiệt.



**MỘT VỤ CHÁY RỪNG CÓ THỂ CÓ NHIỆT ĐỘ LÊN ĐẾN 800°C HOẶC HƠN**

## TỰ BỐC CHÁY

Thông thường, năng lượng, như tia lửa hoặc ngọn lửa, cần phải được thêm vào để bắt đầu quá trình đốt cháy. Tuy nhiên, một số chất - như cỏ khô, một số loại dầu hoặc một số nguyên tố dễ phản ứng như rubidi - có thể tự bốc cháy nếu chúng đủ nóng.



CỎ KHÔ VÀ RƠM



DẦU LANH



RUBIDI

## Đốt than

Đốt cháy hoàn toàn than tạo ra carbon dioxide. Nếu oxy tiếp xúc không đều với than, quá trình đốt cháy không hoàn toàn cũng xảy ra, tạo ra carbon monoxide. Các tạp chất trong than được giải phóng dưới dạng lưu huỳnh dioxide và nitơ oxide.

Nitơ oxide từ quá trình đốt các tạp chất trong than

Oxy trong không khí


Lưu huỳnh dioxide từ quá trình đốt cháy tạp chất trong than

Carbon monoxide từ quá trình đốt cháy không hoàn toàn carbon trong than

Carbon dioxide



Carbon trong than








## Dập tắt đám cháy

Lửa cần ba thứ để có thể cháy: nhiệt, nhiên liệu và oxy (thường ở trong không khí). Loại bỏ bất kỳ yếu tố nào trong số đó có thể dập lửa. Tuy nhiên, phương pháp để dập tắt đám cháy phụ thuộc vào loại cháy. Ví dụ, sử dụng nước để dập lửa điện có thể dẫn đến điện giật, và sử dụng nước trên lửa dầu hoặc mỡ có thể khiến dầu hoặc mỡ cháy lan rộng.




## Nổ

Một vụ nổ là một sự giải phóng đột ngột nhiệt, ánh sáng, khí và áp suất. Nổ xảy ra nhanh hơn nhiều so với cháy. Nhiệt từ vụ nổ không thể tiêu tan, và các khí sinh ra sẽ nhanh chóng lan rộng, tạo ra một sóng xung kích vượt ra khỏi vụ nổ và có thể đủ mạnh gây thương tích và thiệt hại tài sản. Các mảnh vụn bị đẩy ra ngoài bởi vụ nổ cũng sẽ gây thêm thiệt hại.


### LIỆU BẠN CÓ THỂ CHẠY THOÁT KHỎI MỘT VỤ NỔ?

**Không. Trong một vụ nổ hóa chất, tốc độ của vật liệu bắn ra là hơn 8 km/s, nhanh hơn bất cứ ai có thể chạy.**




### Nổ vật lý

Một điểm yếu nhỏ trong một vật chứa có áp suất có thể gây vỡ và cho phép chất bên trong thoát ra đột ngột. Việc giảm áp suất khiến các khí giãn nở rất nhanh, dẫn đến một vụ nổ.



### Nổ hóa học

Các vụ nổ hóa học thường do các phản ứng nhanh, giải phóng một lượng lớn khí và nhiệt. Phản ứng thường được kích hoạt bởi nhiệt, như trong trường hợp thuốc súng, hoặc sốc vật lý, như với nitroglycerine.



### Nổ hạt nhân

Vụ nổ hạt nhân có thể được cung cấp năng lượng bằng phản ứng phân hạch (chia tách) hoặc nhiệt hạch (tổng hợp) của hạt nhân nguyên tử. Cả hai cách đều rất nhanh chóng tạo ra một năng lượng khổng lồ, đi kèm với đó là bụi phóng xạ.



### Nước đá

Khi nước được làm lạnh, các phân tử của nó chuyển động chậm lại, cho phép hình thành nhiều liên kết hydro hơn. Các liên kết này nối các phân tử lại với nhau khi nước đông băng và bị khóa chặt trong một cấu trúc mở. Đây là lý do tại sao nước lại "nở" khi nó đông cứng.

Hình thành  
nhiều liên kết  
hydro hơn

Các phân tử  
trải ra, gây ra  
sự giãn nở

### Nước lỏng

Khi nước là chất lỏng, liên kết hydro của nó liên tục được hình thành và phá vỡ khi các phân tử di chuyển qua nhau. Nếu không có các liên kết này, nước sẽ là một chất khí ở nhiệt độ phòng.


Các liên kết bị  
phá vỡ khi các  
phân tử nước  
di chuyển

# Nước

Nước có thể rất bình thường trong cuộc sống hằng ngày, nhưng nó rất phi thường. Nước là chất duy nhất có thể tồn tại ở cả ba thể: rắn, lỏng và khí ở nhiệt độ và áp suất bình thường, đồng thời là chất duy nhất ở thể rắn lại có khối lượng riêng nhỏ hơn ở thể lỏng.

### Tính chất độc đáo

Mỗi phân tử nước bao gồm hai nguyên tử hydro liên kết với một nguyên tử oxy. Một bên của phân tử (bên có oxy) có điện tích âm yếu, trong khi bên còn lại có điện tích dương nhỏ. Các điện tích khác nhau này cho phép hình thành liên kết hydro giữa các phân tử, tạo cho nước tính chất độc đáo của nó.








## NƯỚC TRONG CƠ THỂ


Nước chiếm khoảng 60% trọng lượng cơ thể ở nam giới và khoảng 55% ở nữ giới. Lượng nước ở nữ giới thấp hơn vì họ có nhiều chất béo cơ thể hơn, vốn chứa ít nước hơn mô nạc. Trung bình, chúng ta cần uống 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày để bù cho lượng nước mất qua nước tiểu, mồ hôi và hơi thở, mặc dù lượng chính xác còn phụ thuộc vào thời tiết và mức độ hoạt động.



Phần lớn nước trong cơ thể nằm trong các tế bào

## SỨC CĂNG BỀ MẶT

Các phân tử nước thích liên kết với nhau hơn là với không khí. Do đó, các phân tử nước ở bề mặt liên kết mạnh hơn với các phân tử nước lân cận, thay vì liên kết với các phân tử không khí ở bên trên chúng. Trong thực tế, điều này tạo ra một mặt nước đủ bền để cho phép côn trùng nhỏ đi trên đó.



## HIỆN TƯỢNG MAO DẪN

Các phân tử nước bị hút vào một số bề mặt - độ lớn của lực phụ thuộc vào vật liệu bề mặt. Trong một ống thủy tinh mỏng, nước dâng lên thành ống vì lực hấp dẫn giữa các phân tử thủy tinh và nước mạnh hơn so với lực giữa các phân tử nước.

Ống càng hẹp, nước càng dâng cao

ỐNG MAO DẪN

Các phân tử nước ở ngoài kéo các phân tử lân cận, truyền lực hấp dẫn dọc theo mặt nước

Nước di chuyển lên trên


Nước bị hút vào thành ống hơn là bị hút bởi chính nó

## TẠI SAO ĐÔI KHI NƯỚC CÓ MÀU XANH?

Nước hấp thụ các ánh sáng có bước sóng dài, ở gần phía đầu đỏ của quang phổ, vì vậy phần còn lại mà ta thấy được chỉ gồm các ánh sáng với bước sóng ngắn hơn, ở phía đầu xanh.

# 9 PHẦN TRĂM

## LÀ MỨC MÀ NƯỚC DẪN NỞ THÊM KHI NÓ ĐÔNG CỨNG







# Acid và base

Mặc dù chúng có tác dụng ngược nhau về mặt hóa học, cả acid và base đều quen thuộc với chúng ta dưới dạng những chất ăn mòn, thậm chí ăn mòn tới mức nguy hiểm. Độ mạnh yếu của acid và base là cực kỳ đa dạng.


## Thế nào là acid?

Acid là các chất mà khi hòa tan trong nước sẽ giải phóng nguyên tử hydro dưới dạng ion hydro tích điện dương. Càng nhiều ion này được giải phóng, acid càng mạnh. Ví dụ, khí hydro chloride sẽ hoạt động theo cách này để tạo thành một dung dịch gọi là acid hydrochloric. Đây là một trong những acid mạnh nhất, với nồng độ ion hydro lớn hơn hàng nghìn lần so với các acid yếu hơn được tìm thấy trong một số loại trái cây chua.



## MƯA ACID


Tác dụng ăn mòn của một acid là do các ion hydro của nó gây ra, bởi vì các phần tử hóa học có tính phản ứng cao này có khả năng phá vỡ các vật liệu khác. Khí lưu huỳnh dioxide gây ô nhiễm, một sản phẩm phụ của công nghiệp, phản ứng với các giọt nước trong khí quyển tạo thành acid sulfuric. Khi các giọt này rơi xuống, chúng chính là mưa acid, ăn mòn các tòa nhà đá vôi, làm chết tán lá cây cũng như nhiều loại thực vật khác.





## Thế nào là base?

Base là các chất hóa học đối kháng (đối lập) với acid – nhưng khả năng phản ứng cũng tương tự như acid. Các base trung hòa acid bằng cách trung hòa các ion hydro của chúng. Đã với hoặc phần là các loại đá cơ bản vì chúng phản ứng với acid theo cách này. Các base mạnh nhất, chẳng hạn như natri hydroxide (xút ăn da), có thể dễ dàng hòa tan trong nước và được gọi là kiềm. Trong nước, chúng giải phóng các hạt tích điện âm gọi là ion hydroxide.



## Phản ứng acid-base

Phản ứng giữa một acid và một base tạo ra nước và một loại chất khác gọi là muối. Loại muối hình thành phụ thuộc vào các loại acid và base tham gia phản ứng. Chẳng hạn, acid hydrochloric và natri hydroxide phản ứng tạo thành natri chloride (muối ăn thông thường), còn các ion hydroxide và hydro kết hợp với nhau dưới dạng nước.



## ACID VÀ KIỀM GÂY HẠI CHO TA NHƯ THẾ NÀO?

Acid và kiềm đều gây hư hại protein trong da, làm chết các tế bào da. Ngoài ra, khác với acid, kiềm còn có khả năng hóa lỏng mô, từ đó có thể giúp chúng xâm nhập sâu hơn vào cơ thể và gây hại nhiều hơn acid.

### Đo độ acid

Thang đo pH là thước đo độ acid hoặc kiềm của một chất. Nó dao động từ pH 0 của acid mạnh đến pH 14 của kiềm mạnh. Ở mỗi nấc của thang đo, nồng độ ion hydro thấp hơn 10 lần so với nấc trước đó. Một loại sắc tố được gọi là chất chỉ thị có thể được sử dụng để đo độ pH của một chất. Phản ứng với chất chỉ thị tạo ra màu, từ đó cho pH 0 đến tím cho pH 14, và lục ở pH 7 (trung tính).






# Tinh thể

Từ những viên đá quý cứng nhất đến những bông tuyết mỏng manh, cấu trúc tinh thể có thể vô cùng xinh đẹp. Tính chất này đến từ sự sắp xếp vi mô cực kỳ chính xác của các nguyên tử hoặc các hạt khác.

## Một tinh thể là gì?

Chất rắn kết tinh (xem trang 14) được tạo thành từ các hạt được sắp xếp gọn gàng: một trật tự lặp đi lặp lại của các nguyên tử, ion hoặc phân tử trong toàn bộ cấu trúc. Đây là điểm trái ngược với chất rắn vô định hình (không kết tinh), chẳng hạn như polyetylen hoặc thủy tinh (xem trang 70-71), trong đó các hạt được xáo trộn ngẫu nhiên với nhau. Một số chất rắn, ví dụ như hầu hết các kim loại, chỉ kết tinh một phần. Chúng chứa rất nhiều tinh thể nhỏ gọi là hạt tinh thể, nhưng các hạt riêng lẻ này liên kết với nhau ngẫu nhiên.



## TẠI SAO MỘT SỐ TINH THỂ LẠI CÓ MÀU?

Giống như bất kỳ chất nào, tinh thể sẽ có màu nếu các nguyên tử của chúng phản xạ hoặc hấp thụ các bước sóng ánh sáng nhất định. Chẳng hạn, đá ruby có màu đỏ do các nguyên tử chromi của nó phản xạ ánh sáng đỏ.

### Cấu trúc tinh thể


Cấu trúc tinh thể là sự sắp xếp lặp đi lặp lại của các nguyên tử, được gọi là một mạng. Mạng tinh thể đơn giản nhất – được minh họa trong hình – là một khối gồm tám hạt. Các mặt phẳng nguyên tử chạy song song với nhau và các tinh thể có thể được phân chia dọc theo các mặt phẳng này.

## Tinh thể khoáng

Khoáng chất – các thành phần hóa học của đá – được kết tinh từ móng đá của Trái Đất qua các quá trình địa chất. Tinh thể hình thành khi đá nóng chảy rắn lại, hoặc khi các mảnh rắn tái kết tinh do nhiệt và áp suất. Các tinh thể cũng có thể hình thành từ dung dịch, vì các khoáng chất hòa tan sẽ lắng đọng nếu chúng trở nên quá đậm đặc để dòng nước có thể mang theo. Nếu sự kết tinh này ổn định trong một thời gian dài (hình bên phải), tinh thể có thể phát triển đến kích thước khổng lồ.



**CÁC TINH THỂ THẠCH CAO TỰ NHIÊN KHỔNG LỒ NẶNG TỚI 50 TẤN**









## Tinh thể lỏng

Một số chất tuy chảy nhưng cũng có tính kết tinh. Những tinh thể lỏng này tồn tại ở trạng thái giữa lỏng và rắn. Các hạt của chúng được sắp xếp gọn gàng, nhưng chúng cũng có thể xoay, nên chúng quay về các hướng khác nhau. Giống như các hạt trong tinh thể rắn, chúng ảnh hưởng đến cách truyền ánh sáng. Các phân tử quay có thể “xoắn” ánh sáng phân cực (ánh sáng dao động theo một hướng). Đặc tính này tạo thành cơ sở của màn hình tinh thể lỏng (LCD), trong đó điện điều khiển sự sắp xếp các phân tử để chiếu sáng một số pixel nhất định mà không phải là các pixel khác.

### Màn hình tinh thể lỏng

Ở trạng thái “ngủ nghỉ”, các phân tử tinh thể lỏng vẫn xoắn ánh sáng phân cực để chiếu sáng một pixel. Nhưng khi được căn chỉnh bởi dòng điện, ánh sáng đi qua mà không bị đổi hướng, và rung động dọc của nó đã bị chặn bởi bộ lọc ngang, kết quả là tạo thành một pixel tối.






# Dung dịch và dung môi

Muối hoặc đường trông như thể biến mất khi được cho vào nước. Nhưng vị của chúng vẫn còn đó – bằng chứng cho thấy rằng chúng hòa tan trong nước và lan đều trong dung dịch.


## Các loại dung môi

Khi một chất hòa tan trong chất khác, chất bị hòa tan được gọi là chất tan và chất hòa tan nó được gọi là dung môi. Có hai loại dung môi chính: phân cực và không phân cực. Các dung môi phân cực, chẳng hạn như nước, có sự khác biệt nhỏ về điện tích trên các phân tử, tương tác với các điện tích trái dấu của các chất tan phân cực. Các dung môi không phân cực, như pentan, không có các điện tích kiểu này. Chúng có khả năng hòa tan rất tốt các nguyên tử và phân tử không tích điện, như dầu và mỡ.



### Dung môi phân cực

Trong các chất phân cực, chẳng hạn như nước, một bên của phân tử mang điện tích âm và bên còn lại mang điện tích dương.




### Dung môi không phân cực

Trong các chất không phân cực, chẳng hạn như pentan, không có sự phân tách điện tích giữa các phần khác nhau của phân tử.


## Các loại dung dịch

Khi một chất tan hòa tan trong dung môi để tạo thành dung dịch, hai chất hòa trộn với nhau hoàn hảo đến mức các hạt của chúng (nguyên tử, phân tử hoặc ion) hoàn toàn hòa quyện vào nhau. Tuy nhiên, các hạt không phản ứng với nhau nên chúng vẫn không thay đổi về mặt hóa học. Dung dịch chất rắn trong chất lỏng là loại dung dịch quen thuộc nhất, nhưng cũng có những loại khác, chẳng hạn như chất khí trong chất lỏng, và chất rắn trong chất rắn. Khi một chất tan hòa tan, dung dịch thu được sẽ có cùng trạng thái (lỏng, rắn hoặc khí) với dung môi.




### Chất rắn trong chất lỏng

Cà phê ngọt là dung dịch của một chất rắn (đường) hòa tan trong một chất lỏng (cà phê, bao gồm chủ yếu là nước với các phân tử hương vị).



### Chất khí trong chất lỏng


Amonia là một chất khí và dễ dàng hòa tan trong nước để tạo thành một dung dịch kiềm là thành phần của một số chất tẩy rửa gia dụng.



### Chất rắn trong chất rắn

Đồng thanh là dung dịch của thiếc trong đồng. Đồng là dung môi, vì nó có tỷ trọng lớn hơn so với thiếc: khoảng 88% so với 12% thiếc.







## Những chất giống nhau thì hòa tan vào nhau

Dung môi phân cực hòa tan chất tan phân cực vì các điện tích trái dấu của chúng hút nhau tạo ra các liên kết yếu. Nước có tính phân cực, vì các nguyên tử oxy của nó tích điện âm nhẹ và các nguyên tử hydro của nó tích điện dương nhẹ. Các chất không phân cực không thể hòa tan trong các chất phân cực, đó là lý do tại sao dầu và nước chẳng thể trộn lẫn vào nhau. Chỉ các hạt không phân cực mới có thể kết hợp với nhau để tạo thành một dung dịch.

## NƯỚC ĐƯỢC GỌI LÀ DUNG MÔI VẠN NĂNG, VÌ NÓ HÒA TAN ĐƯỢC NHIỀU CHẤT HƠN BẤT KỲ CHẤT LỎNG NÀO KHÁC




Phân tử carbon tetrachloride



### Chất tan không phân cực trong dung môi không phân cực

Các dung môi không phân cực, chẳng hạn như carbon tetrachloride, có thể hòa tan các chất tan không phân cực, chẳng hạn như i-đốt, nhưng không thể hòa tan các chất tan phân cực.

Phân tử nước






### Chất tan phân cực trong dung môi phân cực

Các dung môi phân cực, chẳng hạn như nước, có thể hòa tan các chất có điện tích, chẳng hạn như muối ăn (natri chloride,  $\text{NaCl}$ ) và đường.

## Độ hòa tan

Độ hòa tan là mức độ mà một chất có thể được hòa tan. Nó thay đổi tùy thuộc vào nhiệt độ và, đối với chất khí, còn phụ thuộc áp suất. Ví dụ, đường sẽ hòa tan nhiều hơn trong nước nóng thay vì nước lạnh, và nếu áp suất của chất khí càng cao thì càng nhiều khí sẽ hòa tan trong chất lỏng. Lượng chất tan tối đa hòa tan trong một lượng dung môi nhất định ở nhiệt độ và áp suất cụ thể được gọi là điểm bão hòa của chất đó.



### NỒNG ĐỘ TĂNG DẦN

#### Dung dịch chưa bão hòa

Trong dung dịch chưa bão hòa, thêm nhiều chất tan (ở đây là tinh thể đồng sulfat) sẽ hòa tan hoàn toàn trong dung môi.

#### Dung dịch bão hòa

Trong dung dịch bão hòa, lượng chất tan tối đa ở nhiệt độ cụ thể đó đã hòa tan trong dung dịch.

#### Dung dịch siêu bão hòa

Sẽ hòa tan được nhiều chất tan hơn nếu đem dung dịch đun nóng, sau đó cần làm lạnh nhanh để tạo ra dung dịch siêu bão hòa trước khi tinh thể kết tinh trở lại.




# Chất xúc tác

Phản ứng hóa học diễn ra nhanh hơn ở nhiệt độ cao, khi các nguyên tử và phân tử va chạm ở tốc độ cao hơn. Một số hóa chất – được gọi là chất xúc tác – cũng có thể làm tăng tốc độ phản ứng. Chúng không bị biến đổi trong phản ứng, vì vậy chúng có thể được tái sử dụng.

## Chất xúc tác hoạt động thế nào?


Các hạt cần phải có đủ năng lượng để phản ứng với nhau. Đối với một số phản ứng, năng lượng hoạt hóa này (xem trang 44) lớn đến mức các hạt liên quan sẽ tuyệt đối không phản ứng ở điều kiện thường. Chất xúc tác hoạt động bằng cách hạ thấp năng lượng hoạt hóa, tạo điều kiện cho phản ứng xảy ra. Thông thường, chỉ cần một lượng nhỏ chất xúc tác để thực hiện điều này.



## Chất xúc tác công nghiệp

Các loại chất xúc tác đa dạng thường được sử dụng để giúp các phản ứng hóa học công nghiệp hiệu quả hơn, nhiều trong số đó là kim loại hoặc oxide kim loại. Chẳng hạn, sắt giúp sản xuất amonia theo phương pháp Haber (xem trang 67). Hầu hết các chất xúc tác công nghiệp là chất rắn, có thể dễ dàng phân tách và tái sử dụng.

Lưới gồm các nguyên tử nhôm, silic và oxy



### Zeolite

Zeolite là các phân tử lớn với cấu trúc lỗ, giống như lưới. Chúng có nhiều ứng dụng trong công nghiệp – ví dụ, trong việc tinh chế dầu thô thành các hóa dầu hữu ích hơn.



**ENZYME  
CATALASE  
CÓ THỂ XÚC  
TÁC KHOẢNG 40  
TRIỆU PHẢN ỨNG  
MỖI GIÂY**

Năng lượng của sản phẩm

SẢN PHẨM

CHẤT XÚC TÁC


SẢN PHẨM






## Bộ chuyển đổi xúc tác

Các bộ chuyển đổi xúc tác được gắn trong các xe hơi hiện đại có chứa "tổ ong" bằng gốm được phủ chất xúc tác bạch kim và rhodi. Cách sắp xếp này cung cấp diện tích bề mặt lớn để các chất xúc tác giúp xử lý khí thải, chuyển khí độc thành carbon dioxide, nước, oxy và nitơ ít gây hại hơn. Nhiệt từ động cơ xe hơi cũng giúp cho các chất xúc tác hoạt động ở tốc độ hiệu quả.




BỘ CHUYỂN ĐỔI XÚC TÁC




### 1 Maltose liên kết với enzyme

Phân tử phản ứng - ở đây là đường maltose - liên kết tạm thời với điểm hoạt động (vị trí xúc tác) của enzyme maltase. Chỉ có maltose là khớp với maltase.



### 2 Liên kết maltose suy yếu

Năng lượng hoạt hóa cần để phân tách maltose được hạ thấp khi nó liên kết với điểm hoạt động của enzyme. Điều này có nghĩa là liên kết phân tử maltose có thể dễ dàng bị maltase phá vỡ.



### 3 Tạo ra glucose


Phản ứng hóa học tại điểm hoạt động sẽ sắp xếp lại các liên kết hóa học, tách maltose thành hai phân tử glucose. Enzyme khi đó cũng sẵn sàng cho hoạt động tiếp theo.

## Chất xúc tác sinh học

Hầu hết các chất xúc tác vô cơ sử dụng trong công nghiệp có thể tham gia xúc tác cho một loạt các phản ứng, nhưng các chất xúc tác trong cơ thể sống thì có tính chuyên biệt cao hơn. Các phân tử protein tên gọi enzyme sẽ xúc tác cho từng phản ứng sinh học cụ thể, chẳng hạn như sao chép ADN hoặc tiêu hóa thức ăn. Mỗi enzyme có hình dạng riêng, khớp với loại chất phản ứng cụ thể. Cần đến hàng ngàn enzyme khác nhau để thúc đẩy quá trình trao đổi chất - tập hợp tất cả các phản ứng hóa học cần thiết để giữ cho một sinh vật sống.

## CHẤT TẨY RỬA SINH HỌC

Giống như các chất xúc tác khác, enzyme có những ứng dụng hữu ích. Chúng được sử dụng trong bất cứ trường hợp nào cần phản ứng sinh học, chẳng hạn như khi làm sạch vết bẩn trên quần áo. Chất tẩy rửa sinh học chứa các enzyme tiêu hóa chất béo trong dầu mỡ hoặc protein trong máu. Và bởi vì các enzyme hoạt động ở nhiệt độ cơ thể - và thậm chí có thể bị phá hủy nếu quá nóng - chúng dễ dàng hoạt động trong nước có nhiệt độ thấp hơn, giúp tiết kiệm năng lượng và ít gây tổn hại cho các loại vải mỏng manh.





# Chế tạo hóa chất


Hàng ngày, chúng ta luôn sử dụng các sản phẩm nhân tạo, từ nhựa và nhiên liệu đến thuốc men. Việc sản xuất nhiều sản phẩm trong số này đòi hỏi phải có các hóa chất cơ bản, chẳng hạn như acid sulfuric, amonia, nitơ, chlor và natri.

## Acid sulfuric

Acid sulfuric là một trong những hóa chất thô được sử dụng phổ biến nhất – nó được sử dụng trong chất tẩy rửa cống rãnh và trong các viên pin, đồng thời còn dùng trong sản xuất giấy, phân bón hay lon thiếc. Các phương pháp khác nhau có thể được sử dụng để sản xuất acid sulfuric, nhưng nổi tiếng nhất là quy trình tiếp xúc.


### Quy trình tiếp xúc

Lưu huỳnh lỏng phản ứng với không khí tạo thành sản phẩm khí lưu huỳnh dioxide. Khí này được làm sạch, làm khô rồi chuyển hóa thành khí lưu huỳnh trioxide nhờ chất xúc tác vanadi. Acid sulfuric được thêm vào khí để tạo ra acid disulfuric, sau đó tiếp tục pha loãng với nước để tạo ra acid sulfuric.



## Chlor và natri

Chlor và natri được tách ra từ muối ăn thông thường (natri chloride), sử dụng một quy trình gọi là điện phân, được thực hiện ở quy mô công nghiệp trong một bể chứa được gọi là bể Downs. Bể chứa natri chloride nóng chảy, cùng với hai điện cực từ sắt và carbon. Khi dòng điện được truyền qua các điện cực, các ion natri và chloride sẽ di chuyển đến các điện cực trái dấu, rồi kết hợp thành các nguyên tử của các nguyên tố của chúng, sau đó các nguyên tử sẽ được thu thập.



### Bể chứa Downs


Các ion natri tích điện dương di chuyển đến cực âm, nơi chúng thu được một electron để tạo thành kim loại natri. Kim loại này nổi lên bề mặt của natri chloride nóng chảy. Trong khi đó, các ion chloride tích điện âm di chuyển đến cực dương, ở đó chúng mất đi một electron để tạo thành chlor, sủi lên trong dạng bọt khí.





## Nitơ

Không khí chứa khoảng 78% nitơ và là nguồn chính để sản xuất khí nitơ tinh khiết. Nitơ được chiết xuất từ không khí bằng cách chưng cất phân đoạn. Không khí được làm mát thành chất lỏng, sau đó được làm ấm dần lên. Trong quá trình đó, các thành phần khác nhau của không khí quay trở lại thành chất khí ở các nhiệt độ khác nhau, tương ứng với độ cao khác nhau của ống chưng cất. Riêng oxy vẫn là một chất lỏng ở phía dưới.



## CÁC SẢN PHẨM TỪ DẦU

Chưng cất phân đoạn dầu thô tạo ra nhiều loại sản phẩm hữu ích. Một số có thể đem sử dụng ngay lập tức sau khi chưng cất – chẳng hạn như khí tự nhiên, nhiên liệu như xăng và dầu diesel, dầu bôi trơn và bitumen làm nhựa đường. Những sản phẩm khác được chế biến thêm để tạo thành các sản phẩm như nhựa và dung môi.



KHÍ TỰ NHIÊN



NHIÊN LIỆU CHO VẬN TẢI



BITUMEN



DUNG MÔI




NHỰA



DẦU BÔI TRƠN

HƠN 230 TRIỆU TẤN ACID SULFURIC ĐƯỢC SẢN XUẤT HÀNG NĂM TRÊN TOÀN THẾ GIỚI




## Amonia

Phương pháp Haber giúp tạo ra amonia từ khí nitơ và khí hydro. Amonia đóng vai trò quan trọng trong sản xuất phân bón, thuốc nhuộm và chất nổ, đồng thời cũng được sử dụng trong chất tẩy rửa làm sạch. Khí nitơ thường trơ và không có phản ứng, vì vậy phương pháp Haber sử dụng sắt làm chất xúc tác, cùng với nhiệt độ và áp suất cao trong lò phản ứng để cải thiện tốc độ phản ứng và tạo ra lượng amonia cao nhất.

### Phương pháp Haber

Khí hydro và khí nitơ được trộn lẫn và thổi qua xúc tác sắt, kích thích chúng phản ứng với nhau và tạo thành amonia. Làm mát hỗn hợp cho phép thu về amonia lỏng. Nitơ và hydro chưa phản ứng sẽ được tái chế.





# Nhựa


Nhựa rất bền, nhẹ và rẻ. Chúng đã thay đổi cuộc sống hiện đại. Nhưng, bởi vì hầu hết các loại nhựa được chế tạo từ nhiên liệu hóa thạch và không thể phân hủy sinh học, việc sử dụng nhựa ngày càng tăng của con người đang kéo theo nhiều vấn đề về môi trường.

## Monome và polyme

Nhựa là một loại polyme tổng hợp – một chuỗi dài các phân tử được tạo thành từ các đơn vị lặp đi lặp lại gọi là monome. Chuỗi polyme có thể dài đến hàng trăm phân tử. Nhựa làm từ các monome khác nhau có tính chất và công dụng khác nhau. Ví dụ, nylon trở thành sợi cứng dùng trong bàn chải đánh răng, trong khi polyethylen thường được sử dụng để làm các túi nhựa nhẹ.


### Monome

Các monome của nhiều loại nhựa có liên kết đôi carbon-carbon (xem trang 41).




### Polyme

Để tạo thành một polyme, liên kết đôi bị phá vỡ, để mỗi monome có thể liên kết với phân tử lân cận của nó, tạo ra một chuỗi dài.



## POLYME TỰ NHIÊN


Các polyme cũng tồn tại trong tự nhiên – đường, cao su và ADN là các ví dụ tiêu biểu. ADN hình thành từ các monome được gọi là nucleotide, trong đó chứa một nhóm đường và một nhóm phosphat (tạo thành xương sống của nó) và một gốc nucleobase (base nitơ) cung cấp mã để tạo ra protein.



**TỔNG LƯỢNG  
NHỰA THẢI RA  
MỖI NĂM ĐỦ BAO  
QUANH TRÁI ĐẤT  
BỐN LẦN**

## Sản xuất nhựa

Hầu hết nhựa được làm từ chế phẩm hóa dầu chưng cất từ dầu thô. Thêm một chất xúc tác trong điều kiện nhiệt độ và áp suất có kiểm soát sẽ kích thích các monome kết hợp thành chuỗi. Đồng thời, các hóa chất khác có thể được thêm vào để điều chỉnh các thuộc tính của nhựa. Một khi đã hình thành, nhựa có thể được định hình thành các sản phẩm khác nhau. Nhựa sinh học, sản xuất từ các nguồn tái tạo, chẳng hạn như gỗ hoặc ethanol sinh học, cũng tồn tại nhưng chỉ là một thiểu số trong số các loại nhựa được sản xuất ngày nay. Nhựa được phân loại thành nhựa nhiệt rắn và nhựa nhiệt dẻo. Nhựa nhiệt rắn chỉ có thể được tạo hình một lần duy nhất, nhưng nhựa nhiệt dẻo có thể được nấu chảy và định hình lại nhiều lần.







## Tái chế

Một số loại nhựa có thể được tái chế dễ dàng, bằng cách cắt nhỏ, nung chảy, và sau đó đem tái tạo. Nhưng các loại nhựa khác lại cần đến phương pháp tái chế khác. Một trong số đó là biến nhựa thành nhiên liệu lỏng, hoặc đốt chúng để trực tiếp tạo ra năng lượng. Một ý tưởng khác là tạo ra các loại nhựa mà vi khuẩn có thể tiêu hóa, nhưng những ý tưởng này hiện chưa thể được thực hiện trên quy mô lớn.

Nhựa thải được đưa đến bãi chôn lấp rác hoặc đổ ra biển




### Chất thải

Hầu hết rác thải nhựa sẽ tồn tại hàng nghìn năm trong bãi chôn lấp rác, phân hủy hóa chất độc hại vào đất. Một số trôi ra biển, trở thành hạt vi nhựa, vốn vô cùng có hại cho động vật hoang dã.

## LỢI ÍCH VÀ TÁC HẠI CỦA NHỰA

Lợi ích	Tác hại
Sản xuất nhựa rất rẻ, lại không phụ thuộc vào cây trồng hoặc vật nuôi hay các tài nguyên thiết yếu cho việc nuôi trồng.	Nhựa chủ yếu được làm từ các tài nguyên không tái tạo, và chỉ việc khai thác các tài nguyên này cũng đã gây hại cho môi trường.
Nhựa nhẹ nhưng dẻo dai, vì vậy một lượng nhỏ vật liệu có thể tạo ra nhiều sản phẩm hữu ích.	Nhựa có thể phân hủy thành những mảnh nhỏ, trôi vào hệ thống cấp nước và ảnh hưởng đến các loài động vật hoang dã cũng như thức ăn của chúng ta.
Nhựa có thể được điều chỉnh để có một loạt các tính chất – độ cứng, độ linh hoạt, độ dẻo dai và nhiều tính chất khác đều có thể được kiểm soát.	Nhựa có thể trở nên mỏng giòn và dễ vỡ sau khi sử dụng nhiều lần. Tia UV từ Mặt Trời cũng có thể làm cho đồ nhựa giòn hơn.
Sợi tổng hợp có thể được chế tạo để có tính co giãn và có khả năng chống nhăn, chống nước và chống vết bẩn hơn so với sợi tự nhiên.	Quần áo tổng hợp không cho phép mồ hôi bay hơi, vì vậy người mặc có thể không thoải mái trong thời tiết nóng. Tĩnh điện cũng có thể xảy ra.
Một số loại nhựa có thể được tái chế, làm cho chúng thân thiện với môi trường hơn so với các loại nhựa không thể tái chế.	Nhựa không phân hủy sinh học đã góp phần gây ô nhiễm toàn cầu, trên biển và trên đất liền. Chúng cũng đang lấp đầy các bãi chôn lấp rác.

### PHẢN ỨNG TRÙNG HỢP




### 3 Phản ứng trùng hợp

Thêm chất xúc tác đồng thời kiểm soát nhiệt độ và áp suất sẽ kích thích phản ứng ở các monome để trở thành polyme. Trong một số trường hợp, các phân tử nhỏ như nước cũng xuất hiện như là sản phẩm phụ.

Các viên nhựa được nghiền và nấu chảy

### 4 Tạo hình cho nhựa

Nhiều loại nhựa trở nên linh hoạt hơn khi được nung nóng, do đó chúng có thể được ép hoặc uốn thành hình, và sẽ rắn lại khi được làm mát. Nhựa mềm cũng có thể được thổi vào khuôn, hoặc kéo căng lên khuôn bằng máy hút chân không. Người ta cũng có thể ép nhựa nóng chảy.



### 5 Thành phẩm

Nhựa được sản xuất thành mọi thứ, từ chai lọ đến điều khiển tivi, và sợi vải cho quần áo. Mỗi sản phẩm đòi hỏi các tính chất khác nhau, vì vậy các loại nhựa được sử dụng và phương thức sản xuất cũng khác nhau.






# Thủy tinh và gốm sứ

Cứng, chống ăn mòn và thường trong suốt, thứ thủy tinh mà chúng ta đều biết chủ yếu có thành phần là cát, hoặc silic dioxide. Thủy tinh còn thuộc về một nhóm vật liệu lớn hơn là gốm.

## Cấu trúc của thủy tinh

Thủy tinh có cấu trúc vô định hình, có nghĩa là chỉ có rất ít hoặc thậm chí không có trật tự nào trong việc sắp xếp các phân tử (hoặc nguyên tử) của chúng. Ở cấp độ nguyên tử, chúng trông giống như những chất lỏng bất động (xem trang 16-17). Tuy nhiên, thủy tinh là chất rắn. Chúng thường được chế tạo bằng cách nung chảy một chất và sau đó làm nguội thật nhanh, đến mức các nguyên tử (hoặc phân tử) không kịp sắp xếp theo cấu trúc thông thường của chúng, cho dù đó là tinh thể hay kim loại. Thay vào đó, chúng bị mắc kẹt tại chỗ, hỗn độn như khi ở thể lỏng.



## Phân loại thủy tinh

Chúng ta đều biết thủy tinh là loại vật liệu trong suốt, dễ vỡ dùng để làm kính cửa. Loại này chủ yếu là silic dioxide. Nhưng thủy tinh có thể được chế tạo từ một loạt các vật liệu – kim loại có thể trở thành thủy tinh, và một số dạng polyme, hoặc nhựa, cũng được coi là thủy tinh về mặt kỹ thuật. Các hóa chất khác được thêm vào thủy tinh silicat để thay đổi tính chất của chúng. Các hóa chất này có thể ảnh hưởng đến màu sắc hoặc độ trong của sản phẩm, giúp nó có khả năng chịu nhiệt tốt hơn, chẳng hạn thủy tinh borosilicat như Pyrex, hoặc giúp chống trầy xước, như Gorilla Glass (dùng trong nhiều màn hình điện thoại thông minh).

## Tính chất của thủy tinh

Độ cứng của thủy tinh, khả năng chống ăn mòn và độ phản ứng thấp khiến cho nó phù hợp với nhiều sản phẩm, nhưng đặc tính hữu ích nhất của nó có lẽ là tính trong suốt, cho phép sử dụng rộng rãi để làm cửa sổ trong các tòa nhà và trên xe hơi.


**GIÒN**

Vỡ mà không biến dạng


Thủy tinh rất giòn, dễ vỡ vì các phân tử của chúng bị khóa tại chỗ và không thể trượt qua nhau. Bất kỳ phần rạn vỡ nào trên bề mặt của thủy tinh cũng sẽ nhanh chóng lan ra khắp vật liệu, khiến vết nứt lan rộng.

**TRONG SUỐT**

Tia sáng phân tán



**TINH THỂ**



**THỦY TINH**

Tia sáng không bị cản trở

Thủy tinh có tính trong suốt vì năng lượng của ánh sáng khả kiến không phù hợp với mức năng lượng có thể có của các electron trong thủy tinh, vậy nên photon không được hấp thụ. Cũng không có ranh giới tinh thể nào trong thủy tinh để tán xạ ánh sáng.






## Các loại gốm sứ khác

Thủy tinh là một tập con của loại vật liệu gọi là gốm sứ. Theo truyền thống, thuật ngữ “gốm sứ” mô tả các sản phẩm làm từ đất sét, nhưng định nghĩa khoa học của nó lại bao hàm bất kỳ chất rắn phi kim loại nào có thể được tạo hình dạng và sau đó được làm cứng bằng phương pháp nung nóng. Gốm sứ có thể có cấu trúc tinh thể hoặc vô định hình; nó cũng có thể được tạo ra từ gần như bất kỳ nguyên tố nào. Giống như thủy tinh, chúng thường cứng nhưng giòn và có điểm nóng chảy cao. Điều này khiến gốm sứ trở nên lý tưởng để cách nhiệt và điện, chẳng hạn như titan carbide gốm, dùng trên lá chắn nhiệt tàu vũ trụ.



KHÓ TRẦY XƯỚC



ĐỘ NÉN CAO



KHÔNG PHẢN ỨNG




CÁCH ĐIỆN

## THỦY TINH THỰC SỰ CÓ THỂ CHẢY?

Mô tả thủy tinh như một chất lỏng chảy chậm là sai. Các cửa sổ thủy tinh rất cũ thường có phần dưới dày hơn, bởi vì các tấm thủy tinh không đều được sắp đặt theo cách đó ngay từ đầu để đảm bảo tính ổn định.

## CHỐNG NƯỚC

Thủy tinh thông thường có lực hút với nước, vì vậy nước tạo thành một màng trên bề mặt. Các lớp phủ chống thấm nước giúp cho hạt nước nảy lên và chảy ra khỏi kính, cải thiện tầm nhìn, đồng thời làm sạch kính trong quá trình này.




Thủy tinh rắn không cho nước chảy qua



## THỦY TINH ĐƯỢC SẢN XUẤT LẦN ĐẦU TIÊN TẠI AI CẬP KHOẢNG 5.000 NĂM TRƯỚC

## KÍNH CƯỜNG LỰC




Kính cường lực có mặt ngoài được nén lại và phần bên trong được kéo căng, để giúp nó có độ bền cao hơn. Nếu kính cường lực bị vỡ, lớp nhựa lót trong sẽ giữ các mảnh thủy tinh với nhau.

## NHÔM TRONG SUỐT

Thường được gọi là nhôm trong suốt, nhôm oxynitride là một loại gốm siêu cứng, trong suốt. Hỗn hợp bột được nén lại và làm nóng đến 2.000°C, sau đó được làm lạnh để các phân tử của nó vẫn ở dạng vô định hình. Loại nhôm này có thể chịu được nhiều tác động từ đạn xuyên giáp, nhưng đồng thời vẫn trong suốt. Mức giá đắt đỏ hiện tại đồng nghĩa với việc nó chỉ được sử dụng cho các ứng dụng quân sự chuyên dụng, nhưng nhôm trong suốt có tiềm năng được ứng dụng rộng rãi hơn trong tương lai.

Sức mạnh và độ trong của loại gốm này giúp nó trở thành vật liệu lý tưởng cho kính chống đạn trên xe bọc thép



GỐM TRONG SUỐT



# Vật liệu kỳ diệu


Từ siêu mạnh đến siêu nhẹ, một số vật liệu mà chúng ta đang sử dụng sở hữu những đặc tính đáng kinh ngạc. Nhiều trong số này là sản phẩm nhân tạo, nhưng cũng có những vật liệu tự nhiên. Một số vật liệu tổng hợp đã được lấy cảm hứng từ thiên nhiên, một quá trình gọi là phỏng sinh học.

## Composite

Đôi khi, chỉ một vật liệu đơn nhất thì không tài nào đạt được thuộc tính mong muốn của một sản phẩm nhất định. Để giải quyết vấn đề này, hai hoặc nhiều vật liệu có thể được kết hợp để thành phẩm mang các đặc tính tốt nhất của từng loại. Những vật liệu này được gọi là composite (vật liệu tổng hợp). Bê tông là loại composite phổ biến nhất trong thời hiện đại, nhưng phen trát đất, tạo nên từ rơm hoặc cành cây trộn bùn, được dùng để dựng tường từ cách đây 6.000 năm, có thể xem như một ví dụ về composite ở giai đoạn đầu. Vật liệu và kỹ thuật mới đang được sử dụng để tạo ra các composite tiên tiến hơn.


### Sức mạnh tương đối

Bê tông là một hỗn hợp của cốt liệu đá trong một ma trận xi măng. Mạnh dưới lực nén, nhưng yếu dưới lực kéo, để xây nhà thì không thể chỉ sử dụng riêng bê tông.




### Tăng thêm khả năng chịu lực kéo

Trong xây dựng, bê tông được gia cố thêm bằng các thanh thép, có khả năng chịu lực kéo rất mạnh. Cùng nhau, chúng kết hợp để tạo ra bê tông cốt thép – một trong những vật liệu linh hoạt nhất của thế giới hiện đại.



### Composite tiên tiến

Composite công nghệ cao bao gồm các polyme được gia cố, chẳng hạn như sợi carbon và sợi thủy tinh, trong đó sợi carbon hoặc thủy tinh được dệt và kẹp giữa các lớp polyme khác, hoặc trộn cùng keo resin trong khi nó vẫn ở dạng lỏng. Cả hai loại sợi này đều rất mạnh, lại cực nhẹ, nhưng cũng có giá khá cao.



## CÓ PHẢI TẤT CẢ CÁC COMPOSITE ĐỀU LÀ NHÂN TẠO?

Không; gỗ và xương là hai ví dụ về composite trong tự nhiên. Xương được cấu tạo từ hydroxyapatite cứng nhưng giòn, kết hợp với collagen mềm và dẻo.






### Aerogel

Thay thế chất lỏng trong gel bằng chất khí sẽ tạo ra một chất rắn siêu nhẹ. Với hơn 98% khối lượng là không khí, aerogel là chất cách điện cách nhiệt cực tốt.



### Lụa tơ nhện

Sản xuất tơ nhện ở quy mô lớn có thể mở đường cho các vật liệu chống đạn mới. Loại vật liệu này mạnh như thép, nhưng nhẹ hơn rất nhiều, lại còn có thể co giãn để chống lại đứt vỡ.



### Graphene

Được làm từ các lớp than chì với độ dày một nguyên tử, graphene bền hơn cả thép, đồng thời là một chất dẫn điện tốt, trong suốt, linh hoạt và cực kỳ nhẹ.




### Nhựa tự liền

Nhựa tự liền chứa các viên nang có thể vỡ ra khi chúng bị hư hỏng, cho phép các chất lỏng bên trong phản ứng và hóa rắn để lấp đầy mọi lỗ hổng do hư hại.

## Các tính chất tuyệt vời

Một số vật liệu, dù tự nhiên hay nhân tạo, sở hữu các đặc tính đáng kinh ngạc. Từ Kevlar linh hoạt với khả năng chống đạn, đến nhựa tự liền, những vật liệu này cung cấp lựa chọn thay thế nhằm giúp cuộc sống của chúng ta trở nên an toàn và dễ dàng hơn. Ví dụ, xương mới có thể phát triển qua việc cấy ghép bột kim loại vào cơ thể, và kính siêu chống thấm có thể giúp ta không phải tốn công làm sạch cửa sổ của các tòa nhà cao tầng, vốn là công việc rất nguy hiểm.



### Bột kim loại

Thêm bột kim loại vào kim loại đang nóng chảy có thể tạo ra bột. Loại vật liệu này có trọng lượng nhẹ, trong khi vẫn giữ được nhiều tính chất của kim loại.




### Kevlar

Là một loại sợi siêu dẻo, Kevlar có thể được dệt thành quần áo hoặc thêm vào polyme để tạo thành composite.




### Vật liệu siêu chống thấm

Các vật liệu chống thấm có các chỗ lồi lên nhỏ bao phủ bề mặt của chúng, các phần này sẽ giữ hạt nước lại, giúp cho vật liệu không bị ướt.



**MỘT TẤM GRAPHENE ĐƠN NHẤT CÓ THỂ CHỊU ĐƯỢC SỨC NẶNG CỦA MỘT CON MÈO 4 KG, NHƯNG BẢN THÂN NÓ NẶNG KHÔNG BẰNG MỘT CÁI RÂU MÈO**







NĂNG LƯỢNG

VÀ LỰC



# Năng lượng là gì?

Các nhà vật lý hiểu về Vũ trụ bằng cách nghiên cứu vật chất và năng lượng trong không gian và thời gian. Năng lượng tồn tại dưới nhiều dạng và có thể chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác. Khi một lực được sử dụng để di chuyển một vật thể, chúng ta nói rằng công đã được thực hiện trên vật thể đó.

## Các loại năng lượng

Năng lượng có ở khắp mọi nơi, không thể bị phá hủy, và đã tồn tại từ khởi điểm của thời gian. Tuy nhiên, để đơn giản hóa trong tìm hiểu và đo lường, các nhà khoa học phân loại năng lượng thành nhiều dạng khác nhau. Mọi hiện tượng tự nhiên cũng như mọi quá trình nhân tạo của máy móc và công nghệ đều xảy ra bởi vì một dạng năng lượng đang làm cho nó hoạt động – đồng thời năng lượng cũng chuyển đổi thành một dạng khác trong quá trình đó.



### Năng lượng hóa học

Sự cháy và các phản ứng hóa học khác được thúc đẩy bởi loại năng lượng liên kết các nguyên tử với nhau.



### Năng lượng điện

Dòng điện mang năng lượng dưới dạng một dòng chuyển động của các hạt tích điện, thường là các electron.



### Năng lượng bức xạ

Ánh sáng và các bức xạ khác là năng lượng dưới dạng biến đổi điện trường và từ trường.



### Nhiệt năng

Chuyển động của các nguyên tử, thường là dao động, được gọi là năng lượng nhiệt hoặc nhiệt năng. Các nguyên tử càng nóng thì càng dao động nhiều hơn.



### Thế năng tĩnh điện

Một viên pin được chế tạo với thế năng có thể được giải phóng dưới dạng dòng điện.



### Thế năng đàn hồi

Vật liệu bị kéo dãn hoặc nén sẽ giải phóng thế năng thông qua việc trở lại hình dạng ban đầu của chúng.



### Thế năng hấp dẫn

Các vật thể được nâng lên cao có thế năng để rơi xuống – giải phóng năng lượng dưới dạng chuyển động.



### Năng lượng âm thanh

Năng lượng mà sóng âm mang theo có khả năng nén và kéo căng không khí (hoặc các môi trường khác).



### Năng lượng hạt nhân

Phân rã phóng xạ và các vụ nổ hạt nhân sử dụng loại năng lượng liên kết trong hạt nhân nguyên tử.



### Động năng

Bất cứ thứ gì chuyển động, từ electron cho đến các thiên hà, đều có động năng hay năng lượng của chuyển động.

## Giải phóng năng lượng hóa học

Khi một người di chuyển vật nặng, một chuỗi chuyển đổi năng lượng sẽ diễn ra. Khi bắt đầu quá trình, cơ thể chuyển đổi năng lượng hóa học có trong thực phẩm thành động năng.

Động năng được chuyển sang xe cút kít cho đến khi đạt tốc độ ổn định



THẾ NĂNG HẤP DẪN TĂNG

## Bảo toàn năng lượng

Tổng năng lượng trong Vũ trụ luôn được giữ nguyên. Năng lượng không tự sinh ra hoặc mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Nó chính là quá trình chuyển đổi năng lượng vốn thúc đẩy các quá trình mà ta quan sát được. Năng lượng cũng có thể được truyền đi, hoặc trở nên thiếu trật tự và ít "hữu dụng" hơn. Nếu xét riêng, mọi quá trình luôn mất đi năng lượng, thường cuối cùng là dưới dạng nhiệt. Vì vậy, cần phải có một nguồn năng lượng để duy trì các quá trình này.

### 1 Khi đang di chuyển

Động năng của cơ thể được chuyển sang xe cút kít. Năng lượng được sử dụng để vượt qua ma sát giúp cho xe di chuyển. Cơ thể cũng trở nên nóng hơn khi một phần năng lượng của nó được chuyển thành nhiệt vô dụng.







## MỘT THANH CHOCOLATE CHỨA BAO NHIÊU NĂNG LƯỢNG?

Một thanh chocolate sữa 50 g chứa khoảng 250 calorie – tương đương với năng lượng được sử dụng bởi một người bình thường trong mỗi 2,5 giờ.

Thế năng hóa học được lưu trữ trong cơ thể giảm

Thế năng hấp dẫn bắt đầu chuyển thành động năng

Khi gạch rơi, động năng tăng và thế năng hấp dẫn giảm

### 2 Đi lên dốc


Người đàn ông đang tác dụng lực đẩy để chống lại lực kéo hấp dẫn trên xe cút kít. Khi người đàn ông dần dần đi lên đoạn đường dốc, động năng của anh đang được chuyển đổi thành thế năng hấp dẫn trong cơ thể và xe cút kít.

### 3 Giải phóng thế năng

Việc giảm tải cho xe giúp chuyển đổi thế năng của nó thành động năng. Khi va chạm với mặt đất, động năng được chuyển thành nhiệt, âm thanh, ngoài ra còn có năng lượng đàn hồi có thể làm cho các viên gạch nảy lên.

## Đo năng lượng

Năng lượng được đo bằng đơn vị gọi là joule (J). Một joule là năng lượng cần thiết để nâng một khối lượng khoảng 100 g lên cao 1 m. Năng lượng trong thực phẩm thường được đo bằng đơn vị calorie, vốn có liên quan đến lượng nhiệt mà thực phẩm đó tạo ra khi được đốt cháy trong một thiết bị gọi là nhiệt lượng kế.



### Đo calorie

Khi một mẫu thực phẩm cháy, nó làm tăng nhiệt độ nước. Sự gia tăng nhiệt độ này có thể được dùng để tìm ra có bao nhiêu calorie trong thực phẩm.

## CÔNG SUẤT

Tốc độ chuyển đổi năng lượng được định nghĩa là công suất. Công suất được đo bằng watt (W); 1 W = 1 J/giây. Một quá trình công suất cao sẽ sử dụng năng lượng nhanh hơn. Một bóng đèn 100 W có cùng tốc độ chuyển đổi năng lượng, hoặc sản lượng điện, với một người phụ nữ trưởng thành.



2.000 CALORIE TRONG 24 GIỜ

=



100 W TRONG 24 GIỜ



# Tĩnh điện

Hình thức quen thuộc nhất của điện là dòng điện cấp đến mỗi gia đình, một hiện tượng chủ yếu là nhân tạo. Hầu hết các hiệu ứng điện trong tự nhiên, chẳng hạn như sét, là do tĩnh điện.

## Tĩnh điện học

Dòng điện sinh ra do một thuộc tính của vật chất gọi là điện tích. Trong mọi nguyên tử, các proton được tích điện dương và đứng yên ở vị trí của mình, trong khi các electron tích điện âm có thể tự do di chuyển sang các vật thể khác. Nếu một vật thể có dư thừa electron, nó sẽ mang điện tích âm và sẽ hút các vật thể tích điện dương - những vật thể bị thiếu hụt electron. Lực này cũng làm cho các electron đẩy nhau, và cuối cùng chúng sẽ tìm thấy một lối để thoát khỏi vật tích điện - tạo ra tia lửa.

### Sốc điện

Khi điện tích tĩnh điện tích tụ trên cơ thể, nó sẽ được giải phóng nếu đi qua một vật dẫn, chẳng hạn như một vật kim loại, tạo ra một cú sốc điện bất ngờ và đôi khi còn có cả tia lửa.

Electron dư thừa

Toàn bộ cơ thể có một điện tích âm nhỏ

Chân và thảm chà xát với nhau

Tay nắm cửa trung tính

Electron nhảy sang tay nắm cửa, tạo ra một cú sốc nhỏ

Cơ thể tích điện âm

### 2 Phóng điện

Điện tích có thể được giải phóng qua kim loại, thường là tay nắm cửa. Khi bàn tay chạm vào nó - hoặc chỉ cần đến gần nó - các electron dư thừa trong cơ thể nhảy sang kim loại, tạo ra một cú sốc.

Electron di chuyển sang cơ thể

Thảm trung hòa về điện

### 1 Tích điện do ma sát

Bàn chân cọ xát vào sợi nhân tạo trong thảm làm cho các electron di chuyển từ mặt đất sang cơ thể, mang lại cho cơ thể một điện tích âm nhỏ.

Bàn chải pháp y

Hóa chất tích điện dương từ vân tay

Các hạt bụi tích điện âm bị hút vào dấu vân tay

### Tĩnh điện trong xác định dấu vân tay

Điều tra vân tay là một ứng dụng của tĩnh điện. Các điều tra viên phủ bột tích điện âm lên các hóa chất tích điện dương để lại trong dấu vân tay tại hiện trường vụ án.





## Ứng dụng của tĩnh điện

Tĩnh điện xuất hiện rất nhiều trong các tình huống hằng ngày. Nhìn chung, tĩnh điện thường được dùng nhằm tạo ra một trường lực nhỏ và dễ điều khiển, để hút hoặc đẩy các vật liệu khác. Tĩnh điện lớn hơn thì nguy hiểm, nhưng cũng có công dụng riêng của chúng, chẳng hạn như trong máy khử rung tim.



### Dầu xả

Dầu gội làm cho tóc tích điện. Những sợi tóc đẩy nhau; dầu xả trung hòa điện tích.



### Súng phun

Các súng phun chuyên dùng sẽ cấp cho sơn một điện tích dương để nó bị hút vào các vật tích điện âm.



### Máy khử rung tim

Một máy phát tĩnh điện tạo ra một điện tích đủ lớn để dẫn qua trái tim đã ngừng đập.



### Sách điện tử

Màn hình máy đọc sách điện tử hút hoặc đẩy các khối cầu có chứa các hạt dầu có điện tích dương (trắng) hoặc âm (đen).



### Màng bọc thực phẩm

Việc gỡ cuộn màng dính nhựa cung cấp cho nó một điện tích nhỏ. Điều này giúp lớp màng có thể bám vào các vật thể khác.




### Bộ lọc bụi

Các hạt có hại trong khói thải của nhà máy được cấp một điện tích, sau đó chúng sẽ được kéo ra bằng các tấm tích điện.

## SÉT ĐÁNH

Sét là một sự phóng tĩnh điện trên quy mô lớn. Không khí là một chất dẫn điện kém, do đó điện tích trong các đám mây bão không thể tiêu tan và sẽ tích tụ dần đến mức khổng lồ. Cuối cùng, một dòng điện sẽ được phóng đi ngoằn ngoèo trong không khí khi nó tìm đường dễ nhất để đến mặt đất.



### 5 Bản sao cuối cùng


Một bản sao xuất hiện. Điện tích trên bản gốc có thể được duy trì để tạo ra nhiều bản sao hơn.



## TÀI LIỆU GỐC



Bản gốc được đặt úp




Tấm tích điện dương

### 1 Ánh sáng

Một nguồn sáng mạnh chiếu qua tài liệu gốc lên một tấm tích điện dương.


Mô hình tích điện là hình ảnh phản chiếu của bản gốc



Điện tích âm thoát khỏi những nơi ánh sáng chiếu tới

### 4 Chuyển mực

Giấy được ép hoặc cuộn lên tấm, chuyển mực in lên giấy.



Mực tích điện âm



### 3 Mực âm

Mực là bột tích điện âm bám vào các vùng tích điện dương của tấm.

### 2 Phóng năng lượng

Ánh sáng giúp tách biệt tấm này khỏi các vùng tối của tài liệu.

## Máy photocopy

Máy photocopy tái tạo một hình ảnh hoặc văn bản bằng cách tạo ra một mô hình tĩnh điện vô hình. Mô hình này sau đó được sử dụng để đặt mực vào đúng vị trí giúp tạo ra bản sao giống hệt ban đầu.



# Dòng điện

Dòng điện chính xác là một dòng các điện tích. Trong các ví dụ hằng ngày, điện tích được mang theo trong chuyển động của electron qua các kim loại, chẳng hạn như dây đồng. Bất kỳ vật liệu nào dẫn điện tốt cũng có thể được gọi là vật dẫn. Vật cách điện thì dẫn điện không tốt.

## Tạo ra dòng điện



Khác với tĩnh điện, chẳng hạn như tia lửa hoặc tia sét (xem trang 78-79), điện tích trong dòng điện liên tục di chuyển. Các hạt tích điện chuyển động bởi vì chúng bị kéo về phía điện tích trái dấu với mình, trong khi tĩnh điện di chuyển là vì sự khác biệt về điện tích giữa nơi này và nơi khác. Tia lửa tĩnh điện cũng loại bỏ sự khác biệt điện tích mà bạn đã sản sinh ra nó. Trong một dòng điện, chẳng hạn được sản xuất bởi một viên pin, chính sự khác biệt về điện tích giữ cho dòng điện luôn chạy.

ĐẠI LƯỢNG	ĐƠN VỊ
<b>Dòng điện</b> là dòng các điện tích.	<b>A</b> <b>Ampe</b>
<b>Điện áp</b> , hoặc hiệu điện thế, là lực đẩy dòng điện dọc theo dây dẫn.	<b>V</b> <b>Volt</b>
<b>Điện trở</b> là sự cản trở chuyển động của dòng điện.	<b>Ω</b> <b>Ohm</b>




## Mạch điện

Dòng điện mang năng lượng có thể được chuyển hóa thành năng lượng hữu ích. Dòng electron cũng tương tự một dòng nước chảy. Năng lượng của nước chảy có thể được khai thác nhờ một guồng nước, từ đó cung cấp năng lượng cho thiết bị. Nước chảy qua kênh rạch, còn dòng điện được gửi đi nhờ các mạch, nhờ đó năng lượng của nó có thể được sử dụng trong các thiết bị như bóng đèn, lò sưởi hoặc động cơ. Cách năng lượng được phân bổ phụ thuộc vào thiết kế của mạch. Có hai loại mạch chính: nối tiếp và song song.







## ELECTRON TỰ DO

Hầu hết các kim loại, chẳng hạn như sắt, là chất dẫn điện tốt vì các electron ở vỏ ngoài của nguyên tử có thể tự do di chuyển xung quanh, đến vỏ của các nguyên tử khác. Nếu các electron được cung cấp đủ năng lượng, thì một dòng điện có thể được hình thành. Các nguyên tử bên trong chất cách điện - chẳng hạn như cao su - giữ chặt các electron hơn, nên dòng điện khó hình thành hơn.




CHẤT DẪN ĐIỆN

CHẤT CÁCH ĐIỆN

## Định luật Ohm


Mối liên hệ giữa điện áp, cường độ dòng điện và điện trở được gói gọn trong định luật Ohm. Công thức của nó (xem bên phải) có thể được sử dụng để tính toán cường độ dòng điện đi qua một vật dẫn, tùy thuộc vào điện áp của nguồn điện và điện trở của các vật dẫn trong mạch.

$$\text{CƯỜNG ĐỘ} = \frac{\text{ĐIỆN ÁP}}{\text{ĐIỆN TRỞ}}$$




### Ohm

Điện trở được đo bằng đơn vị gọi là ohm (Ω). Điện trở bằng 1 Ω cho phép dòng điện 1 A đi qua khi điện áp giữa hai đầu là 1 V.



### Tỷ lệ thuận

Cường độ dòng điện tỷ lệ thuận với điện áp. Nếu điện áp tăng, dòng điện cũng tăng, miễn là điện trở được giữ nguyên.



### Tăng điện trở

Thêm nhiều điện trở hơn đồng nghĩa với việc điện áp không đủ để đẩy dòng điện qua với cường độ như trước. Tăng điện áp sẽ giúp duy trì dòng điện.



# Lực từ


Lực từ (tương tác điện từ) giữa các vật liệu là biểu hiện ở cấp độ lớn hơn cho hoạt động hạ nguyên tử bên trong vật liệu đó. Nam châm có phạm vi sử dụng khá rộng, và là không thể thiếu đối với nhiều thiết bị.

## Từ trường

Một nam châm được bao quanh bởi một trường lực được kéo dài theo mọi hướng và có cường độ giảm nhanh chóng theo khoảng cách. Lực từ có hướng, và từ trường phát ra từ một đầu của nam châm, gọi là cực Bắc, và quay trở lại ở cực Nam. Từ trường dày đặc nhất là ở hai cực, và do đó tác động của lực cũng là mạnh nhất ở hai nơi này.


## Đường sức từ

Ta có thể hình dung từ trường dưới dạng các đường sức từ bao quanh một nam châm. Các đường này thực chất là tập hợp các điểm có cường độ từ trường bằng nhau và có thể được mô hình hóa bằng cách rắc các mảnh sắt vụn xung quanh một nam châm.




### Trái dấu thì hút nhau

Lực từ tuân theo quy luật “trái dấu thì hút nhau”. Cực Bắc của một nam châm sẽ hút cực Nam của một nam châm khác. Lực hút này kéo hai nam châm lại với nhau.



### Cùng dấu thì đẩy nhau

Hai cực từ giống hệt nhau, chẳng hạn cực Bắc với cực Bắc, thì đẩy nhau. Các đường sức từ của hai từ trường có cùng hướng và do đó chúng đẩy nhau chệch ra xa.







## Các loại từ tính

Mỗi nguyên tử đều có một từ trường nhỏ bé của riêng mình, và thông thường chúng được định hướng ngẫu nhiên nên không tạo ra hiệu ứng nào. Nếu các nguyên tử trong một chất được xếp thẳng với một từ trường bên ngoài, thì các trường nhỏ của chúng sẽ tích tụ thành một trường lực chung, lớn hơn.

### Vật liệu nghịch từ


Các chất như đồng và carbon tạo ra một từ trường ngược hướng với từ trường bên ngoài và đẩy nam châm ra xa.

### Vật liệu thuận từ

Hầu hết các kim loại là chất thuận từ. Các nguyên tử của chúng sẽ cùng hướng với từ trường bên ngoài và do đó bị nam châm hút.

### Vật liệu Ferri từ (sắt từ)

Các nguyên tử trong sắt và một vài kim loại khác vẫn sẽ xếp theo hướng từ trường ngay cả khi từ trường bên ngoài được loại bỏ, và tạo thành nam châm vĩnh cửu.



## ĐÂY LÀ NAM CHÂM MẠNH NHẤT?

Các sao neutron tự quay cực nhanh với tên gọi sao từ có từ trường mạnh gấp 1.000 triệu triệu lần so với từ trường Trái Đất.

MÁY QUÉT MRI SỬ DỤNG MỘT NAM CHÂM ĐƯỢC LÀM MÁT ĐẾN  $-265^{\circ}\text{C}$  ĐỂ TỪ HÓA TOÀN BỘ CƠ THỂ TRONG MỘT PHẦN GIÂY




## Nam châm điện

Từ tính của nam châm điện được tạo ra bởi một dòng điện chạy quanh lõi sắt. Điều này có nghĩa là từ trường có thể được bật lên và tắt đi. Nam châm điện được ứng dụng rộng rãi trong các thiết bị hiện đại.



## TỪ TRƯỜNG TRÁI ĐẤT

Sắt lỏng trong lõi ngoài của Trái Đất tạo ra một từ trường rất mạnh. Kim nam châm từ tính của la bàn luôn hướng về phía Bắc vì chúng xếp thẳng hàng với từ trường của hành tinh. Từ trường này cũng vươn ra ngoài vũ trụ, tạo thành một lá chắn chống lại gió mặt trời - một vụ nổ khí nóng, điện hóa do Mặt Trời tạo ra.






# Sản xuất điện

Điện là một nguồn năng lượng rất hữu ích. Nó có thể được phân phối rộng rãi đến những nơi khác cách xa nơi sản xuất, và nó có thể cung cấp năng lượng cho tất cả các loại thiết bị từ máy tính đến xe hơi.


## Dòng điện cảm ứng

Máy phát điện sử dụng một quá trình gọi là cảm ứng để tạo ra dòng điện. Khi một dây dẫn di chuyển trong một từ trường, một điện áp và dòng điện được tạo ra trong nó. Động năng của dây dẫn được chuyển đổi thành năng lượng điện, tạo ra dòng điện chạy qua nó. Một máy phát điện đơn giản thực hiện quá trình này bằng cách quay một vòng dây thật nhanh giữa hai cực của một nam châm cực mạnh.



## Nhà máy nhiệt điện

Vai trò của nhà máy nhiệt điện là khai thác nguồn nhiệt năng để làm quay rotor bên trong máy phát điện. Các nhà máy kiểu này tận dụng nhiệt lượng tỏa ra từ việc đốt nhiên liệu và chuyển đổi chúng thành năng lượng quay nhờ vào turbine hơi nước. Trong khi các nhà máy điện hạt nhân sử dụng nhiệt sản sinh từ sự phân tách các nguyên tử.



### 1 Nhiên liệu

Nhiên liệu là những chất giải phóng ra một lượng nhiệt lớn khi bị đốt cháy. Nhiên liệu phổ biến gồm than, khí tự nhiên và dầu. Các nhà máy điện cũng đốt gỗ, than bùn, và rác.

### 2 Lò đốt

Nước chảy qua các ống trong lò sẽ được đun sôi bằng nhiệt từ nhiên liệu bị đốt cháy. Điều này giúp tạo ra hơi nước áp suất cao mà sau đó được điều hướng đến turbine.

### 3 Turbine

Luồng hơi nước đi qua một turbine và làm quay cánh quạt. Áp suất hơi nước được chuyển thành động năng và truyền đến máy phát.

## ĐIỆN XOAY CHIỀU VÀ ĐIỆN MỘT CHIỀU

Mỗi lần vòng dây đi qua từ trường, hướng của dòng điện trong nó lại hoàn đổi. Dây được gọi là dòng điện xoay chiều (AC). Các trạm điện tạo ra điện xoay chiều, bởi vì cần có dòng điện đảo chiều liên tục trong các máy biến áp (xem bên dưới) để tạo ra dòng điện trong cuộn thứ cấp. Trong dòng điện một chiều (DC), kết nối của vòng dây với mạch được chuyển đổi mỗi lần quay để điện tích chỉ đi chuyển theo một chiều.



ĐIỆN XOAY CHIỀU

ĐIỆN MỘT CHIỀU






#### 4 Máy phát điện

Rotor trong máy phát được chế tạo để quay với tốc độ khoảng 3.600 vòng/phút và nó tạo ra một dòng điện xoay chiều với điện áp khoảng 25.000 V. Điện áp sau đó được tăng cường bằng máy biến áp (xem bên dưới) lên đến 400.000 V để có thể truyền qua khoảng cách xa được hiệu quả hơn.

Cột tải điện




### MỘT NGƯỜI Ở QATAR SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG NHIEU GẤP 89 LẦN MỘT NGƯỜI Ở SENEGAL



#### Nhà máy

Các nhà máy sử dụng nhiều mức điện áp, lên đến 33.000 V. Vì vậy, họ có thể có các trạm riêng chứa máy biến áp.




#### Máy biến áp

Máy biến áp là một thiết bị giúp thay đổi dòng điện và điện áp. Nó là một vòng sắt với một cuộn dây dẫn nằm mỗi bên. Máy biến áp đôi khi được cấp điện xoay chiều, có điện trường thay đổi liên tục. Điện trường thay đổi trong cuộn sơ cấp tạo ra nguồn cung điện xoay chiều trong cuộn thứ cấp.

#### 5 Phân phối điện

Dòng điện trong lưới điện cao thế là quá mạnh để sử dụng tại hộ gia đình. Mỗi địa phương sẽ có một trạm biến áp, trong đó máy hạ áp sẽ làm giảm điện áp xuống mức có thể sử dụng trong thực tế.



#### Khu dân cư

Tùy thuộc vào từng quốc gia, nguồn cung cấp điện cho gia đình nằm trong khoảng từ 110 V đến 240 V.

#### Tòa nhà văn phòng

Các tòa nhà thương mại có thể sử dụng điện áp cao hơn so với nhà dân.

Biến áp treo giúp làm giảm điện áp để sử dụng




# Năng lượng thay thế

Thay vì sử dụng nhiên liệu hóa thạch, các hệ thống năng lượng thay thế sử dụng một nguồn năng lượng khác như chuyển động tự nhiên của không khí hoặc nước, hoặc nhiệt từ Trái Đất hay Mặt Trời. Điều này giúp chúng ít gây hại cho môi trường hơn.

## Năng lượng gió

Gió là sự chuyển động của không khí từ vùng áp cao đến vùng áp thấp. Sự chênh lệch áp suất này là do Mặt Trời làm khí quyển nóng lên không đều. Turbine gió có thể khai thác luồng không khí này để dùng như một nguồn năng lượng.



### 1 Cánh turbine

Cánh turbine cong, hoạt động như một cánh quạt ngược. Chúng được định hình chính xác để bắt được luồng không khí và chuyển đổi chuyển động về phía trước của luồng khí thành chuyển động quay.

### 2 Bánh răng

Các cánh quay khoảng 15 vòng/phút, quá chậm để có thể tạo ra một dạng điện hữu ích. Hệ thống bánh răng giúp tăng tốc độ quay của trục lên khoảng 1.800 vòng/phút.

### 3 Máy phát điện

Chuyển động quay của trục được máy phát chuyển đổi thành điện. Máy phát điện cũng có thể được sử dụng như một động cơ khởi động bằng điện – dòng điện chạy qua nó theo chiều ngược lại sẽ làm cho các cánh quạt quay theo gió nhẹ.

## LIỆU CON NGƯỜI CÓ THỂ HOÀN TOÀN NGỪNG SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU HÓA THẠCH?


Năng lượng thay thế đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của con người, nhưng chúng ta phải phát triển các cách để trữ điện với số lượng lớn trước khi có thể thực sự ngừng sử dụng tất cả các nhiên liệu hóa thạch.

## THỦY ĐIỆN

Một trong những vấn đề của các hệ thống điện thay thế là phải tìm ra nguồn cung năng lượng đáng tin cậy. Các nhà máy thủy điện thường sử dụng đập để khai thác dòng chảy của các con sông. Các nhà máy này sản xuất hai phần ba tổng số năng lượng thay thế và cung cấp gần một phần năm lượng điện được sử dụng. Khi nước chảy, thế năng của nó chuyển thành động năng, được sử dụng làm quay turbine nước bên trong đập nhằm tạo ra điện.









## 2 Nước ra

Nhiệt núi lửa làm nước nóng lên cao hơn 100°C. Phần lớn lượng nước này vẫn tồn tại ở thể lỏng do điều kiện áp suất cao, vì vậy một hỗn hợp nước nóng và hơi nước được đưa lên bề mặt.




## 3 Tạo ra hơi nước

Hơi nước được tách ra khỏi nước lỏng để tạo thành một dòng khí áp suất cao hướng vào turbine, trong khi nước lỏng sẽ được điều về tháp giải nhiệt.



## 4 Máy phát điện

Hơi nước áp suất cao làm quay các cánh turbine, như trong một nhà máy nhiệt điện thông thường. Động năng quay sau đó được truyền đến máy phát để tạo ra điện.




## 1 Nước vào

Nước lạnh được bơm xuống một cái giếng, hoặc lỗ khoan, ở áp suất cao, vào một hồ chứa nước ngầm tự nhiên sâu dưới lòng đất - thường ở độ sâu 2.000 m trở lên.

## Nhiệt tự nhiên

Giống như chuyển động của không khí và nước, các nguồn nhiệt tự nhiên cũng có thể được sử dụng để sản xuất điện. Các nhà máy năng lượng mặt trời tập trung sử dụng các mảnh gương sắp xếp theo trật tự nhất định để tập trung ánh sáng mặt trời và sử dụng nó để đun sôi nước, làm quay turbine. Trong khi đó, các nhà máy điện địa nhiệt được đặt tại các khu vực núi lửa, nơi nhiệt từ bên trong Trái Đất tỏa ra rất gần mặt đất và có thể được sử dụng làm nguồn năng lượng.



## 5 Tháp giải nhiệt

Hơi nước được làm mát và ngưng tụ lại thành chất lỏng bên trong các tháp giải nhiệt lớn. Sau khi được làm mát, nước đã sẵn sàng để được bơm vào lòng đất một lần nữa và bắt đầu lại chu kỳ.

## Nhiên liệu sinh học

Nhiên liệu sinh học là một giải pháp ít gây ô nhiễm với tiềm năng thay thế cho nhiên liệu hóa thạch. Chúng có thể được tạo ra bằng cách thay đổi về mặt hóa học các nguyên liệu thô lấy từ các sinh vật sống. Có ba nguồn nhiên liệu sinh học chính: ngũ cốc, gỗ và tảo. Các loại ngũ cốc và gỗ đang gây ra vấn đề môi trường nhưng hy vọng rằng tảo, mặc dù mới chỉ trong giai đoạn đầu phát triển, có thể cung cấp nhiên liệu ít gây ô nhiễm với chi phí thấp.






# Điện tử hoạt động ra sao?

Điện tử là công nghệ tạo nên các thành phần điện và sử dụng chúng trong các mạch điện. Chúng bao gồm các transistor, được sử dụng để kiểm soát dòng điện, và hầu hết đều không có bộ phận chuyển động.


## Thế nào là một chất bán dẫn?

Chất dẫn điện có các electron tự do có sẵn để mang dòng điện (xem trang 81), trong khi các chất cách điện có hàng rào năng lượng lớn, còn gọi là năng lượng vùng cấm, ngăn các electron chạy qua chúng và tạo thành dòng điện. Các chất bán dẫn, như silic, có năng lượng vùng cấm tương đối nhỏ, do đó nó có thể chuyển từ một chất cách điện thành một chất dẫn điện.





## Bên trong một transistor

“Bộ não” của một máy tính được tạo thành từ các mạch điện tử nằm trên một con chip. Các mạch này sẽ được một bộ hướng dẫn – chương trình lập trình – cho biết phải làm gì. Cuối thập niên 1940, transistor, một thiết bị bán dẫn, đã được phát minh để thay thế các thiết bị điện tử ban đầu sử dụng ống chân không và gần như không đáng tin cậy. Các transistor được làm bằng tinh thể silic đã được “pha tạp”, hay được thêm vào các chất khác để thay đổi tính chất dẫn điện của nó. Sản phẩm tạo thành là một thiết bị có thể được điều khiển để kiểm soát dòng điện cực kỳ chính xác.



**KÍCH THƯỚC TỐI THIỂU DỰ KIẾN CỦA MỘT TRANSISTOR LÀ BẰNG 2 PHÂN TỬ ĐƯỜNG**



### 1 Cấu trúc cơ bản

Một transistor được làm từ một chất bán dẫn loại p kẹp giữa hai chất bán dẫn loại n. Loại n có electron dư thừa và tích điện âm. Loại p có chứa “lỗ” đóng vai trò điện tích dương.

### 2 Vùng khiếm khuyết


Các electron từ bán dẫn loại n bị kéo vào bán dẫn loại p bởi điện tích dương của nó. Điều này tạo ra các vùng khiếm khuyết, nơi không có các electron tự do để mang dòng điện. Ở giai đoạn này, không dòng điện nào có thể chạy qua, và công tắc của transistor đang ở trạng thái “tắt”.





## ĐỊNH LUẬT MOORE

Năm 1965, Gordon Moore, nhà đồng sáng lập công ty điện tử Intel, dự đoán rằng các transistor sẽ giảm một nửa kích thước cứ sau hai năm. Cho đến nay, định luật Moore vẫn khá chính xác. Ngày nay, các transistor tiêu chuẩn có chiều dài cơ sở là 14 nanomet. Kích thước này còn có thể thu hẹp hơn nữa, nhưng công nghệ điện tử sẽ đạt đến giới hạn trong thập niên tới, khi kích thước cơ sở của chúng trở nên quá nhỏ để tạo thành một rào cản hiệu quả đối với dòng điện.




## SILIC ĐẾN TỪ ĐÂU?


Silic là nguyên tố phổ biến thứ hai trong lớp vỏ Trái Đất. Nó có thể được tinh chế bằng cách đốt cát, có chứa silic, trộn với sắt nóng chảy.

### Pha tạp silic



Mục đích của việc pha tạp silic là nhằm tăng hoặc giảm số lượng electron. Việc thêm các nguyên tử phosphor sẽ làm tăng một electron, trong khi thêm bor làm giảm bớt một electron, từ đó tạo ra một khoảng trống, hoặc "lỗ", trong tinh thể.



SILIC LOẠI N ĐƯỢC PHA TẠP VỚI PHOSPHOR



SILIC LOẠI P ĐƯỢC PHA TẠP VỚI BOR



### 3 Đặt điện áp

Ngoài cực nguồn và cực máng, lần lượt là nơi dòng điện đi vào và đi ra, một transistor còn có một tiếp xúc điện thứ ba được gọi là cực nền, đưa vào bán dẫn loại p một điện áp dương. Khi được bật, cực nền sẽ hút các electron trong vùng khiếm khuyết.

### 4 Dòng điện di chuyển

Cực nền tạo ra một vùng các electron tự do trong transistor, thu nhỏ các vùng khiếm khuyết, vì vậy một dòng điện có thể đi qua nó. Ở trạng thái này, transistor đang được "bật". Khi cực nền tắt, các electron sẽ dừng chuyển động và công tắc transistor bị tắt một lần nữa.




# Vi mạch


Vi mạch (microchip) là thành phần công nghệ có thể được tìm thấy trong tất cả các đồ gia dụng hằng ngày, từ điện thoại đến lò nướng bánh. Chế tạo một vi mạch là việc kết hợp các linh kiện điện tử nhỏ xíu trên một miếng silic nguyên chất.

## Chế tạo vi mạch


Vi mạch là một mạch điện tích hợp, trong đó tất cả các thành phần và kết nối điện giữa chúng được gắn trên một mảnh vật liệu duy nhất. Mạch điện của vi mạch được khắc vào bề mặt của miếng silic. Các dây dẫn nhỏ được làm từ đồng hoặc các kim loại khác, còn các transistor và linh kiện điện tử có thể được chế tạo bằng cách pha tạp silic (xem trang 88-89) và thêm vào các chất bán dẫn khác.



**1 Lớp phủ**  
Một miếng silic nguyên chất kẻ ô sẽ được làm nóng để tạo ra một lớp oxide mịn trên bề mặt của nó. Sau đó, một lớp phủ có tính nhạy sáng, gọi là chất cảm quang, cũng được thêm vào.



**2 Tiếp xúc**  
Một âm bản cỡ lớn của thiết kế chip được vẽ sẵn trên một vật liệu trong suốt. Sau đó, đèn sẽ chiếu thiết kế lên chất cảm quang. Mỗi tấm kẻ ô có chỗ cho nhiều chip giống hệt nhau.



**3 Phát triển**  
Các bộ phận tiếp xúc với ánh sáng của tấm kẻ ô sẽ bị rửa trôi, để lộ một mẫu hình trên lớp oxide nằm bên dưới. Một số nét của mẫu thiết kế chip chỉ rộng độ vài chục nguyên tử.

## Cổng logic

Một mạch tích hợp đưa ra quyết định bằng cách sử dụng kết hợp các transistor và diode để tạo thành các cổng logic. Các cổng logic so sánh các dòng điện đến và gửi đi một dòng điện mới, dựa trên các phép toán logic. Được gọi là Đại số Boolean, loại logic này là một tập hợp các phép toán trong đó câu trả lời luôn luôn là đúng hoặc sai, được biểu thị bằng 1 hoặc 0.

### Cổng AND

Thành phần này có hai đầu vào. Nó chỉ bật (đầu ra bằng 1) nếu cả hai đầu vào là 1.

#### ĐẦU VÀO



Đầu vào A	Đầu vào B	Đầu ra
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

### Cổng OR

Ngược với cổng AND, cổng OR luôn xuất ra 1, trừ phi cả hai đầu vào đều bằng 0.

#### ĐẦU VÀO



Đầu vào A	Đầu vào B	Đầu ra
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1






## LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

Giống như các thành phần mạch khác, các linh kiện điện tử được thể hiện bằng một bộ ký hiệu. Các nhà thiết kế chip sử dụng chúng khi họ tạo ra các mạch tích hợp mới. Các chip hiện đại có hàng tỷ thành phần, vì vậy các nhà thiết kế sẽ thiết lập kiến trúc cấp cao của chip, rồi sau đó một máy tính sẽ chuyển đổi nó thành một mạch gồm các cổng logic. Phải cần đến hơn một nghìn người để chế tạo và thử nghiệm một thiết kế chip mới.




### Diode

Kênh một chiều cho phép dòng điện đi theo một hướng



### Diode phát quang

Sử dụng chất bán dẫn để làm cho các electron phát ra ánh sáng màu



### Photodiode

Chỉ tạo ra dòng điện khi ánh sáng chiếu vào nó




### Transistor NPN

Bật khi dòng điện được đặt vào cực nền



### Transistor PNP


Bật khi không có dòng điện đặt vào cực nền



### Tụ điện


Lưu trữ điện tích, có thể được giải phóng trở lại vào mạch

Phần chất cảm quang còn lại




Lớp oxide bị lộ đã được loại bỏ

Phần chất cảm quang còn lại được loại bỏ



Silic pha tạp được thêm vào để tạo thành các linh kiện điện tử

Chip được cắt



## 4 Khắc

Hóa chất được sử dụng để loại bỏ các phần bị lộ ra của lớp oxide, cắt các kênh dẫn được tạo hình chính xác lên bề mặt của tấm kê ô silic.

## 5 Pha tạp

Silic được pha tạp để sở hữu các đặc tính hữu ích và các kênh được đổ đầy các hỗn hợp hóa chất pha chính xác để tạo ra các thành phần trong mạch.


## 6 Cắt ghép

Các con chip được cắt khỏi tấm kê ô và được phủ một lớp nhựa hoặc thủy tinh để bảo vệ. Khi được gắn trên bảng mạch, chúng sẽ kết nối với các chip khác và với nguồn điện.

### Cổng NOT

Cổng logic này chuyển đổi giá trị đầu vào, vì vậy nó luôn luôn xuất ra kết quả ngược với đầu vào.

ĐẦU VÀO



Đầu vào	Đầu ra
0	1
1	0

### Cổng XOR

Cổng XOR hay cổng OR đặc biệt, phát hiện sự khác biệt trong các đầu vào và sẽ luôn xuất ra 0 nếu các đầu vào giống nhau.

ĐẦU VÀO




Đầu vào A	Đầu vào B	Đầu ra
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

HÀNG TRĂM TRIỆU TRANSISTOR LOẠI MỚI NHẤT CÓ THỂ NẪM VÀO MỘT CÂY ĐINH



## Các bộ phận cơ bản của máy tính

Các thiết bị đầu vào phổ biến bao gồm chuột, bàn phím và micro. Các thiết bị này chuyển đổi hoạt động của người dùng thành các chuỗi số, rồi gửi chúng đến bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM). Sau đó, thông tin đầu vào, theo thứ tự, sẽ được chuyển đến bộ xử lý trung tâm (CPU), nơi các phép tính được thực hiện dựa trên đầu vào để tạo đầu ra. Đầu ra có thể được lưu trên ổ cứng để sử dụng sau, hoặc có thể được gửi đến thiết bị đầu ra, ví dụ như tín hiệu âm thanh hoặc dưới dạng các chữ cái xuất hiện trên màn hình khi ta gõ bàn phím.



# Máy tính hoạt động như thế nào?

Lý giải cách đơn giản, máy tính là một thiết bị nhận tín hiệu đầu vào và biến nó thành tín hiệu đầu ra theo một bộ quy tắc được lập trình sẵn. Sức mạnh thực sự của hệ thống này nằm ở chỗ nó có thể thực hiện các phép tính nhanh và chính xác hơn nhiều so với con người.

## MÃ MÁY TÍNH

CPU xử lý các dữ liệu chỉ sử dụng hai chữ số 0 và 1, trong các chuỗi 8, 16, 32 hoặc 64. Con người thường đơn giản hóa những mã nhị phân dài thành hệ thập lục phân, một hệ thống đếm sử dụng 16 chữ số: từ 0 đến 9, và các ký tự từ A đến F đại diện cho các số từ 10 đến 15.



1111

HỆ NHỊ PHÂN

= 15



= F

HỆ THẬP LỤC PHÂN







## Internet hoạt động như thế nào?


Trong một mạng máy tính, các máy tính được kết nối trực tiếp với nhau, hoặc liên lạc qua các máy tính khác. Internet là một mạng không có điểm kiểm soát trung tâm, thay vào đó, dữ liệu được gửi từ một thiết bị nguồn đến thiết bị nhận.

## SIÊU MÁY TÍNH NHANH NHẤT THẾ GIỚI CÓ KHẢ NĂNG TÍNH 93 TRIỆU TỶ PHÉP TÍNH TRONG MỘT GIÂY



## Ổ đĩa cứng

Hầu hết các máy tính để bàn đều sử dụng ổ đĩa cứng (HDD) làm bộ lưu trữ chính. Thiết bị này ghi lại dữ liệu dưới dạng mô hình vật lý của các vùng từ hóa và khử từ. Những mô hình này vẫn sẽ được giữ nguyên khi tắt nguồn điện. Mỗi ổ cứng có một vài đĩa từ với khả năng quay hàng ngàn vòng trong một phút. Một số máy tính đời mới nhất, chẳng hạn như điện thoại và máy tính xách tay mỏng, sử dụng bộ nhớ trạng thái rắn (SSD) thay cho đĩa cứng. SSD lưu trữ dữ liệu trên các chip bộ nhớ được kết nối với nhau.



### Đọc và ghi

Mỗi đĩa từ sẽ được quét bởi đầu đọc-ghi. Nam châm điện trên đầu đọc ghi giúp phát hiện các mẫu được lưu trên đĩa và cũng có thể ghi thêm các mẫu mới.

## BYTE LÀ GÌ?

Mỗi chữ số trong mã máy tính được gọi là một bit dữ liệu. Chúng thường được xử lý theo chuỗi tám bit và chuỗi tám đó tạo thành một byte dữ liệu. Bốn bit, hoặc nửa byte, được gọi là một nibble.



# Thực tế ảo

Suốt nhiều năm qua, công nghệ vẫn chưa thể đáp ứng mong đợi của con người về những gì thực tế ảo (VR) có thể đạt được, và phải đến bây giờ các ứng dụng VR mới trở nên phổ biến. Một chiếc kính VR phải làm rất nhiều điều để thuyết phục người dùng rằng họ đang ở một nơi khác.

## Bên trong một chiếc kính VR

Thuật ngữ “ảo”, khi được sử dụng trong bối cảnh này, đang đề cập đến một thứ không có thật nhưng vẫn có thể xem, thao tác và tương tác như thể nó là thật. Một ví dụ điển hình là hình ảnh ảo được tạo ra trong gương, trong đó các vật thể xuất hiện “phía sau” mặt gương. Kính VR sử dụng màn hình để lấp đầy tầm nhìn của người dùng bằng một phần của cảnh ảo. Di chuyển kính VR trong chế độ xem sẽ làm cảnh tượng thay đổi tương ứng.

Giá đỡ giúp giữ chắc màn hình


Tai nghe cung cấp âm thanh

Mặt nạ chắn ánh sáng bên ngoài

Vị trí màn hình có thể được điều chỉnh để lấy nét

Bộ dò tìm theo dõi phát hiện chuyển động


THỂ GIỚI THỰC



### Tầm nhìn hai mắt

Màn hình VR hiển thị hai hình ảnh, một cho mỗi mắt. Mắt phải nhìn thấy một hình ảnh được dịch chuyển sang phải một chút so với mắt trái. Hệ thống này được gọi là soi lập thể, và nó mô phỏng tầm nhìn thực tế để tạo ra ảo ảnh của một cảnh ảo 3D.

MÀN HÌNH 3D









## Bộ dò

Để làm cho trải nghiệm trở nên chân thực hơn, kính VR theo dõi chuyển động đầu và mắt của người dùng và thay đổi cảnh hiển thị tương ứng. Điều này có nghĩa là người dùng có thể nhìn xung quanh không gian ảo một cách tự nhiên. Để theo dõi chuyển động của cánh tay và chân người dùng, kính VR có thể sử dụng một thiết bị riêng biệt phát chùm tia hồng ngoại chạm vào cơ thể và đổi hướng từ đó. Điều này cho phép người dùng tương tác nhiều hơn với môi trường ảo xung quanh họ.



### Theo dõi chuyển động đầu

Các cảm biến trên kính VR, tương tự cảm biến trong điện thoại thông minh, theo dõi chuyển động của đầu người dùng trên ba trục. Thông tin này được sử dụng để điều chỉnh cảnh ảo trên quy mô lớn.




### Theo dõi chuyển động mắt

Mắt người chỉ có thể tập trung vào một phần nhỏ trong một cảnh, vì vậy một số màn hình VR sẽ hiển thị hình ảnh sắc nét nhất tại điểm đó. Ánh sáng hồng ngoại chiếu vào mắt và một camera sẽ phân tích các tia phản xạ để xác định hướng nhìn.

### Thay đổi nhận thức

Kính VR đánh lừa nhận thức của người dùng nhằm giúp họ trải nghiệm một không gian 3D do máy tính tạo ra. Bên cạnh việc sử dụng hình ảnh và âm thanh, các thiết bị "xúc giác" gắn trên găng tay hoặc các bộ phận cơ thể khác cho phép người dùng tiếp xúc và cảm nhận các vật thể ảo.



Hiển thị cùng lúc hai hình ảnh, một hình cho mỗi mắt

Bộ xử lý đồ họa mạnh mẽ trên mạch chủ điều khiển hình ảnh hiển thị

## THỰC TẾ ẢO TĂNG CƯỜNG

Thực tế ảo tăng cường (AR) sử dụng công nghệ tương tự VR, nhưng đồ họa do máy tính AR tạo ra được phủ chồng lên trên cảnh thực. Người dùng AR có thể xem cảnh thông qua nguồn cấp dữ liệu camera trực tiếp - ví dụ như trên điện thoại thông minh - hoặc hình ảnh có thể được chiếu lên màn hình trong suốt, chẳng hạn như một cặp kính.





KỸ THUẬT SOI LẬP THỂ  
ĐƯỢC PHÁT MINH VÀO  
NĂM 1838 - CÒN TRƯỚC  
CẢ KỸ THUẬT CHỤP ẢNH




## Ống nano

Ống nano carbon là cấu trúc hình trụ có đường kính chỉ vài nanomet. Hiện tại, chúng bị giới hạn ở quy mô milimet, nhưng các ống nano dài hơn có thể tạo ra vật liệu mạnh hơn thép nhiều lần, trong khi vẫn duy trì nhiều đặc tính hữu ích khác như khối lượng riêng nhỏ.

## MỘT ỐNG NANO DÀI ĐẾN MẶT TRĂNG CÓ THỂ CUỘN LẠI THÀNH MỘT QUẢ BÓNG TỎ BẰNG HẠT ANH TÚC




Quả cầu carbon xuất hiện trong tự nhiên



Quả cầu được tạo thành từ carbon kết nối theo hình ngũ giác và lục giác

Thêm vào các nguyên tử carbon



### 1 Ghép ống nano


Một cách để tạo ra các ống nano là tự ghép chúng. Điểm khởi đầu là một vật liệu có sẵn trong tự nhiên, một quả cầu carbon 60 nguyên tử, gọi là buckyball.

### 2 Thêm vào các nhóm carbon hình lục giác


Phần lớn quả cầu  $C_{60}$  này được cấu tạo từ các nguyên tử carbon nối với nhau thành hình lục giác. Độ dài của buckyball được tăng lên bằng cách thêm nhiều hình lục giác kiểu này hơn.

### 3 Tăng chiều dài


Các vòng liên tiếp gồm 10 nguyên tử carbon được thêm vào quả cầu. Với chiều dài 1 mm, ống nano sẽ chứa hơn 1.000.000 nguyên tử.



Tấm graphene, dày một nguyên tử



Cách một tấm carbon được cuộn lại sẽ xác định độ dẫn điện và nhiệt của nó



### 1 Cuộn ống nano

Một phương pháp khác để chế tạo ống nano là cuộn một tấm carbon lục giác, có độ dày một nguyên tử gọi là graphene.


### 2 Linh hoạt và mạnh mẽ

Graphene rất cứng theo mọi hướng, có nghĩa là nó có thể uốn cong và nắn theo các hình dạng khác nhau - trong trường hợp này, nó được cuộn lại.

### 3 Cuộn lên

Cuộn một tấm graphene sẽ tạo ra ống nano đơn vách. Các ống nano đa vách được tạo ra bằng cách lồng một ống này bên trong ống khác.

### PHÂN TỬ NƯỚC



$10^{-1}$

### PHÂN TỬ GLUCOSE




1

### KHÁNG THỂ




10

### VIRUS



$10^2$

### VI KHUẨN




$10^3$


## THƯỚC ĐO NANO (nm)

Các nguyên tử và phân tử nhỏ có thể được mang bên trong một buckyball


Tinh thể silic dioxide được bọc một lớp vàng bên ngoài, với đặc tính quang học hữu ích trong điều trị ung thư




BÓNG NANO



BUCKYBALL




DENDRIMER



CHẤM LƯỢNG TỬ

Cụm các phân tử và nguyên tử bán dẫn có thể mang các thuộc tính cụ thể



ỐNG NANO

## CÁC CẤU TRÚC NANO

### Công nghệ siêu nhỏ

Xét khối lượng của chúng, các hạt nano có diện tích bề mặt rất lớn, có nghĩa là chúng có thể phản ứng rất nhanh. Các hạt nano sở hữu nhiều tính chất độc đáo không được chia sẻ bởi bất kỳ loại hạt tương tự nào ở các quy mô khác. Người ta cũng lo ngại rằng các hạt nano rất nhỏ này có thể gây hại cho cơ thể người khi chúng xâm nhập vào não thông qua mạch máu.

một loại polyme phân nhánh có thể được sử dụng để vận chuyển, phân phối hoặc thu thập vật liệu

tấm carbon được cuộn lại (xem ở trên)






## Ứng dụng của công nghệ nano

Công nghệ nano sẽ làm thay đổi tương lai của xây dựng, y học và điện tử. Một giả thuyết cho rằng những cỗ máy nhỏ bé được gọi là nanobot có thể hoạt động trong cơ thể, mang theo thuốc chữa bệnh. Một đề xuất khác là các công cụ nano có thể lắp ráp vật thể bằng cách ghép từng phân tử lại với nhau. Những công nghệ này còn phải chờ thêm nhiều thập niên nữa, nhưng vật liệu nano thì đã được đưa vào sử dụng. Ví dụ, kính chống trầy xước được làm cứng bằng một lớp hạt nano nhôm silicat, chỉ dày vài nanomet và vì vậy hoàn toàn trong suốt.

### Kem chống nắng trong suốt

Các hạt nano của oxide kẽm và titan được sử dụng trong kem chống nắng. Các tinh thể siêu nhỏ giúp tán xạ các tia gây hại ra khỏi da.



### TIVI OLED

Công nghệ Diode phát quang hữu cơ (Organic Light-Emitting Diode, OLED) tạo ra ánh sáng bằng cách điện khí hóa một lớp phân tử. Màn hình OLED mỏng và linh hoạt.



### Máy tính nhỏ hơn


Các ống nano có dạng như dây dẫn và chấm lượng tử có thể sớm được tích hợp vào các vi mạch, làm cho chúng nhỏ hơn và mạnh hơn.



### Cấu trúc lớn

Thêm ống nano vào các thành phần xây dựng làm cho chúng bền hơn nhiều, có thể cho phép xây dựng các cấu trúc lớn hơn nhiều trong tương lai.

TẾ BÀO UNG THƯ



$10^4$

ĐẦU BÚT CHÌ



$10^5$

DẤU CHẤM




$10^6$

ĐỒNG XU



$10^7$

BÓNG TENNIS



$10^8$

# Công nghệ nano


Bấy lâu nay, thu nhỏ đã luôn là một mục tiêu của kỹ thuật. Công nghệ nano nhằm mục đích xây dựng những cỗ máy siêu nhỏ bằng cách lắp ráp chúng từ các nguyên tử và phân tử riêng lẻ.

## Kích thước nano

Tiền tố "nano" có nghĩa là "một phần tỷ" – tức là có một tỷ nanomet (nm) trong một mét, và để dễ hình dung hơn, dấu chấm này . rộng khoảng một triệu nanomet. Cỗ máy nano, hay nanobot, là những cỗ máy mà về mặt lý thuyết có khả năng hoạt động ở cấp độ nano, và có thể rộng chừng 10 đến 100 nm.

## SỬ DỤNG ADN

Một đặc tính hữu ích của ADN là nó có thể tạo ra các bản sao của chính nó, trong đó một mạch ADN đóng vai trò là mẫu cho các bản sao. Khả năng tự sao chép này có thể được vận dụng để tạo ra các thiết bị có kích thước nano làm từ ADN, mà theo lý thuyết, chúng có thể thay đổi hình dạng và hoạt động giống như máy móc.





# Robot và tự động hóa

Robot là một cỗ máy được chế tạo để thực hiện các hoạt động phức tạp. Nó có thể được vận hành từ xa bởi một con người, nhưng thông thường robot được thiết kế để hoạt động tự động.

## Robot dùng để làm gì?

Các bộ phận của một robot có thể di chuyển độc lập theo các hướng khác nhau. Điều này cho phép robot thực hiện một số hoạt động nhất định cần thiết để hoàn thành một nhiệm vụ phức tạp mà nếu không có nó thì buộc phải có một công nhân. Ứng dụng của robot chủ yếu giới hạn trong các lĩnh vực mà chúng có lợi thế rõ ràng so với con người, chẳng hạn như làm việc ở những nơi nguy hiểm hoặc thực hiện các nhiệm vụ lặp đi lặp lại.

### LIỆU ROBOT SẼ THAY THẾ CON NGƯỜI?

Robot cơ học được thiết kế cho một số lượng nhỏ các nhiệm vụ cụ thể, và cho đến nay, chúng ta vẫn còn rất xa với việc tạo ra một cỗ máy đa năng như cơ thể con người.

#### Nhiệm vụ lặp đi lặp lại

Robot lắp ráp được lập trình để thực hiện một công việc lặp đi lặp lại nhiều lần. Chúng không bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay buồn chán, nhưng chúng cũng chẳng thể thay đổi hành động của mình nếu gặp phải những vấn đề không lường trước được.

Cánh tay lớn có thể nâng vật nặng

#### SẢN XUẤT

#### Khu vực nguy hiểm

Các phương tiện robot, như robot xử lý bom, được đưa đến những nơi quá nguy hiểm đối với con người. Những cỗ máy này sẽ gửi thông tin lại cho một người điều khiển.

Theo dõi chuyển động trên địa hình gồ ghề

#### CỨU TRỢ

## Actroid

Nhiều kỹ sư đã cố gắng chế tạo những cỗ máy mô phỏng hình dạng con người. Một phát triển gần đây trong lĩnh vực này là Actroid, một robot có làn da mềm mại, như thật, có thể nhận ra và phản ứng với lời nói và nét mặt. Tuy nhiên, các nhà thiết kế robot đang tranh cãi về hiện tượng "thung lũng kỳ lạ", một hiện tượng tâm lý khiến cho các bán sao vô tri của con người trông thật kỳ lạ, thậm chí đáng sợ, đặc biệt khi chúng trông càng giống con người.

MỨC ĐỘ QUEN THUỘC VỚI NGƯỜI XEM +



ROBOT CÔNG NGHIỆP



ROBOT HÌNH NGƯỜI

Vẫn có khác biệt trong nhận dạng với con người đủ để người xem cảm thấy thoải mái

MỨC ĐỘ GIỐNG NGƯỜI

50%

Vật thể giống con người đến nỗi nó khơi dậy cảm giác khó chịu trong người xem

### THUNG LŨNG KỶ LẠ



NGƯỜI KHỎE MẠNH



CON RỐI MARIONETTE





BÀN TAY GIẢ





## ĐỘNG CƠ BƯỚC


Việc các khớp của robot có thể uốn cong hoặc xoay phụ thuộc nhiều vào một loại động cơ gọi là động cơ bước. Động cơ này sử dụng một loạt các nam châm điện, mỗi nam châm di chuyển một trục một vài độ mỗi lần. Kết quả là, động cơ có khả năng thực hiện thao tác rất chính xác.



## CÁNH TAY CỦA XE THĂM HIỂM SAO HỎA CURIOSITY CÓ THỂ LẤY MẪU ĐỂ PHÂN TÍCH TỪ KHOẢNG CÁCH 7 M

### Hành tinh khác


Các phòng thí nghiệm khoa học di động, chẳng hạn như xe thám hiểm Sao Hỏa, tuân theo chỉ dẫn của người vận hành, nhưng cũng có thể phản ứng tự động trước nguy hiểm.



THĂM HIỂM

### Nhiệm vụ yêu cầu độ chính xác cao

Robot phẫu thuật có thể tiến hành quy trình phẫu thuật cực kỳ chính xác, hoặc theo hướng dẫn trực tiếp của bác sĩ, hoặc theo trình tự được lập trình trước.




PHẪU THUẬT

Màn hình được sử dụng để liên lạc

### Công việc chân tay


Robot dọn dẹp và mang vác một ngày nào đó có thể thay thế con người, mặc dù việc thiết kế một robot như vậy là rất khó.



VIỆC CHÂN TAY

## Xe không người lái

Những chiếc xe tự động điều hướng trên đường và phản ứng với môi trường xung quanh cũng được xem là một loại robot. Các thành phần robot của xe giúp vận hành bánh lái và van tiết lưu, nhưng thành công của một chiếc xe không người lái nằm ở khả năng diễn giải vị trí của nó và những gì đang xảy ra xung quanh nó. Các hệ thống máy dò khác nhau được sử dụng để tạo ra một cảm nhận tổng thể, đầy đủ về môi trường xung quanh.



### Camera

Tìm đường, biển báo và các loại vạch kẻ, đánh dấu khác.

### Radar

Xác định hướng và tốc độ của vật di chuyển hoặc đứng yên.

### LiDAR

Máy dò sử dụng laser để xác định kích thước và hình dạng của các vật thể.



# Trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ có thể được định nghĩa là khả năng đưa ra quyết định đầu là phản ứng phù hợp với các điều kiện hiện hành. Một trong những mục tiêu của khoa học máy tính là chế tạo các thiết bị sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

## Yếu hay mạnh?

Hầu hết các AI đều yếu; chúng không thể hoạt động bên ngoài các tiêu chí do lập trình viên đã đặt ra sẵn cho chúng. Một AI mạnh cần có khả năng linh hoạt hơn – nó phải làm được hầu hết mọi thứ mà bộ não con người có thể. Nó phải đủ thông minh để biết rằng mình chưa biết điều gì đó, và sau đó học về điều đó.

## LIỆU AI CÓ THỂ THỐNG TRỊ CHÚNG TA?

AI khó mà vượt qua trí thông minh của con người trong một thời gian dài nữa, nhưng chúng ta sẽ dựa vào AI để đưa ra quyết định cho mình – mà chẳng hiểu chúng làm điều đó như thế nào.



### Chuyên gia

Một máy tính chơi cờ vua là một hệ thống chuyên gia. Nó quyết định nước cờ của mình bằng cách tham khảo cơ sở dữ liệu mà một chuyên gia cờ đã biên soạn sẵn.




### Nhận dạng giọng nói

Một trợ lý ảo kích hoạt bằng giọng nói sẽ học cách nhận dạng các từ và phân tích các cụm từ để đưa ra câu trả lời tốt nhất. Tuy nhiên, nó không hề hiểu ý nghĩa của các từ đó.



### AI tổng quát

Watson của IBM là một hệ thống máy tính có khả năng giải quyết một loạt vấn đề, từ tham gia gameshow đến tư vấn cho các bác sĩ, tất cả đều dựa trên cùng một khung hoạt động. Đây có lẽ là ví dụ gần nhất ta có về một AI tổng quát.



### Điện toán lượng tử

Tương lai của AI có thể nằm ở điện toán lượng tử, nơi một loại bộ xử lý mới sẽ có thể xử lý nhiều dữ liệu hơn so với các siêu máy tính ngày nay.



### AI hẹp

Một công cụ đưa ra gợi ý, chẳng hạn như bảng nội dung trên mạng xã hội, là một AI hẹp. Nó có thể tìm kiếm và lựa chọn các mục liên quan tới những nội dung bạn đã xem trước đó.

## Các loại trí tuệ nhân tạo

Ý tưởng phổ biến nhất về AI là một thiết bị phi con người có trí thông minh gần giống với trí thông minh của chúng ta. Tuy nhiên, vẫn còn rất xa để tạo ra một AI với khả năng hoạt động như vậy (giả như điều đó có thể xảy ra). Các AI ngày nay vẫn chỉ tập trung vào một phạm vi hẹp gồm các nhiệm vụ rất cụ thể. Dẫu là vậy, chúng có thể thực hiện những nhiệm vụ đó nhanh hơn và chính xác hơn nhiều so với trí tuệ con người.

YẾU

MẠNH






## Học máy

Cho phép một hệ thống máy tính học cách điều chỉnh hành vi của chính nó để đáp lại các tình huống mới được gọi là học máy. Khái niệm này liên quan đến một mạng thần kinh nhân tạo, lấy cảm hứng từ các tế bào liên kết với nhau trong não của động vật học bằng cách xử lý thông tin và sử dụng chúng để đưa ra những suy đoán dựa trên thông tin. Nếu sai, nó sẽ điều chỉnh dự đoán của mình để có thể làm tốt hơn vào lần sau.

### Thử-sai

Trong quá trình học máy có giám sát, người phát triển sẽ cho hệ thống biết kết quả đầu ra của nó có chính xác hay không. Hệ thống áp dụng và thay đổi các trọng số, hay độ lệch, của các nút trong mạng để đạt được đầu ra chính xác.



#### 1 Đầu vào

Hệ thống nhập một hình ảnh vào "mạng thần kinh" dưới dạng một mẫu gồm các pixel có cường độ màu khác nhau.

#### 2 Học

Mục tiêu của máy tính là xác định được giữa các pixel các mẫu mà nó liên hệ với các động vật khác nhau. Ban đầu, nó sẽ chỉ đơn giản là đoán ngẫu nhiên.

#### 3 Phân tích

Dữ liệu về các pixel đi qua các lớp trong mạng thần kinh nhân tạo. Mỗi lớp phân tích các mẫu pixel thêm chi tiết.

#### 4 Máy học

Sau nhiều nỗ lực học tập (có thể là hàng trăm thậm chí hàng tỷ lần), mạng thần kinh trở nên giỏi hơn trong việc nhận ra các mẫu pixel có thể đại diện cho một con chó, một con mèo hoặc một con chuột.

#### 5 Đưa vào sử dụng


Sau khi hệ thống AI đã học xong nhiệm vụ của mình, nó có thể được sử dụng để phân tích hình ảnh - hoặc thực hiện một nhiệm vụ đã học khác - một cách tự động.

## Phép thử Turing

Một trong những người tiên phong trong ngành khoa học máy tính, Alan Turing, đã đề xuất một bài kiểm tra xem máy tính có thông minh hay không. Một người thẩm định sẽ cùng lúc trò chuyện qua văn bản với một máy tính và một người kiểm chứng khác. Nếu người thẩm định không thể biết đâu là con người và đâu là máy tính, thì máy tính đã vượt qua phép thử Turing.

### Phép thử không nhìn mặt

Người thẩm định không thể biết họ đang nói chuyện với ai. Trong các bài kiểm tra nâng cao hơn, thẩm định viên còn đưa ra hình ảnh và nói chuyện với các đối tượng thử nghiệm.



## BIT LƯỢNG TỬ

Các máy tính cổ điển sử dụng các chữ số nhị phân (bit), lưu trữ một mẫu dữ liệu tại một thời điểm - 1 hoặc 0. Máy tính lượng tử sử dụng các bit lượng tử hay qubit, với cơ hội mang giá trị 1 hoặc 0 là 50:50, và do đó, nó chứa hai bit dữ liệu cùng một lúc. Sức mạnh của điện toán lượng tử đến từ việc sử dụng các qubit cùng nhau; một bộ xử lý 32 qubit có thể xử lý 4.294.967.296 bit cùng một lúc.

#### BIT


0



1

#### QUBIT

0



1



# Sóng

Sóng là dao động – hay chuyển động nhịp nhàng – được tìm thấy trong tự nhiên. Ánh sáng và âm thanh đều là ví dụ tiêu biểu về sóng. Mặc dù chúng xuất hiện dưới các dạng thức khác nhau, tất cả các sóng đều chia sẻ một số đặc tính và biểu hiện.

## Phân loại sóng

Sóng là một ví dụ về năng lượng di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Tất cả các sóng đều có biểu hiện cơ bản giống nhau, sinh ra do chuyển động dao động của chúng và chuyển động đó có thể phát sinh dưới ba dạng. Âm thanh là một sóng dọc. Ánh sáng và các loại bức xạ khác là sóng ngang và không cần môi trường để truyền qua. Sóng biển là một ví dụ về dạng thứ ba phức tạp hơn, được gọi là sóng mặt, hay sóng địa chấn.

### Sóng mặt


Nước trong sóng mặt không di chuyển về phía trước cùng với ngọn sóng. Thay vào đó, nước gần bề mặt chuyển động thành các vòng, tạo ra các đỉnh và đáy có chiều cao bằng nhau, tính theo mực nước trong điều kiện tĩnh.

## SÓNG BIỂN ĐẾN TỪ ĐÂU?

Gió có thể tạo ra sóng trên đại dương bằng cách thổi qua mặt nước. Ma sát đẩy nước dâng thành ngọn, nhờ đó lại bắt được nhiều gió hơn.

Các phân tử không khí loãng dần, hay lan rộng ra, thành vùng áp suất thấp

## TIẾNG CÒI TÀU BIỂN



## Phương trình sóng

Nếu tốc độ sóng không đổi, việc tăng bước sóng sẽ làm giảm tần số và ngược lại.

## Đo sóng


Tất cả các sóng, dưới bất kỳ hình thức nào, đều có thể được đo bằng cùng một thang đo. Bước sóng là khoảng cách được tạo ra bởi một dao động hoàn chỉnh của sóng. Cách dễ nhất để xác định khoảng cách này là đo từ đỉnh sóng này đến đỉnh sóng tiếp theo. Tần số sóng là số bước sóng xảy ra trong mỗi giây và được đo bằng hertz (Hz). Biên độ sóng tương đương với chiều cao của sóng và biểu thị cho năng lượng sóng, hoặc lượng năng lượng được truyền theo thời gian.

Biên độ được đo từ một đường trung tâm mà sóng dao động quanh


Bước sóng dài hơn mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành

Bước sóng ngắn dẫn đến sóng có tần số cao hơn

KHOẢNG CÁCH







HƯỚNG SÓNG

Sóng dao động  
xung quanh một  
điểm trung tâm

Dao động nằm vuông  
góc với hướng sóng

### Sóng ngang

Dao động của sóng ngang vuông góc với hướng của sóng – chẳng hạn, lên và xuống, hoặc trái và phải. Trong một sóng ánh sáng, dao động sóng xảy ra do chuyển động trong trường điện từ.

Các phân tử  
không khí nén lại thành  
vùng áp suất cao


HƯỚNG SÓNG

### Sóng dọc

Tất cả các sóng dọc, chẳng hạn như sóng âm thanh, đòi hỏi một môi trường để truyền qua. Dao động nằm trong cùng mặt phẳng với chuyển động của sóng và tạo ra các vùng có áp suất cao và thấp (nén và loãng).

## Lan truyền sóng

Sóng lan ra từ một nguồn theo mọi hướng, miễn là không có gì cản đường nó. Cường độ sóng, hoặc nồng độ năng lượng của sóng, giảm khi nó di chuyển ra xa khỏi nguồn. Việc giảm cường độ – làm cho âm thanh lặn dần và ánh sáng mờ hơn – tuân theo luật bình phương nghịch đảo. Chẳng hạn, với mỗi lần nhân đôi khoảng cách, cường độ sóng giảm xuống bốn lần.



### Ảnh hưởng giảm dần

Cường độ sóng giảm đi rất nhanh. Khoảng cách từ nguồn tăng lên gấp ba, cường độ sẽ giảm đi 9 lần. Khoảng cách từ nguồn tăng lên 100 lần, cường độ giảm đi 10.000 lần.

## SÓNG ĐỒ

Sóng biển đổ xuống khi biển trở nên quá cạn để có thể nước lưu thông theo vòng tròn (xem trang 233). Khi sóng đi vào vùng nước nông, nước xoay tròn dâng lên thành một đỉnh cao hơn, thon dài hơn. Ngọn sóng nặng dần và sóng bắt đầu đổ.

Nước ở phần sau của sóng đang di chuyển nhanh hơn



### SÓNG XÔ VÀO BỜ




# Từ sóng vô tuyến đến tia gamma

Tất cả mọi thứ chúng ta nhìn thấy xung quanh mình đều là một mẫu ánh sáng khả kiến chạm đến mắt ta dưới dạng sóng. Nhưng những tia nhìn thấy được chỉ là một phần trong phổ sóng điện từ rộng hơn mang năng lượng từ nơi này sang nơi khác.

## Bức xạ điện từ

Năng lượng có thể được truyền đi bằng bức xạ điện từ. Nó có dạng sóng gợn cả trái-phải và lên-xuống. Hai thành phần của sóng dao động cùng pha – các đỉnh và đáy của chúng xuất hiện trong một chuyển động đều và xếp thẳng hàng với nhau. Bước sóng có thể khác nhau, nhưng sóng sẽ luôn truyền qua không gian trống với tốc độ ánh sáng.




### Sóng điện từ

Chúng được tạo thành từ hai sóng vuông góc với nhau – một sóng là điện trường dao động, và sóng còn lại là từ trường dao động.


## LÒ VI SÓNG CÓ NGUY HIỂM HAY KHÔNG?

Vi sóng mạnh có thể thiêu cháy bạn, nhưng những vi sóng yếu thì vô hại. Lò vi sóng được thiết kế để vi sóng luôn chỉ ở trong lò mà thôi.


## SÓNG VÔ TUYẾN



## VI SÓNG



## TIA HỒNG NGOẠI




## Phổ điện từ

Ta nhận thấy một số sóng điện từ dưới dạng ánh sáng khả kiến. Chúng gồm một dải màu, mỗi màu có bước sóng riêng từ đỏ đến tím. Nhưng phổ điện từ còn rộng hơn ánh sáng khả kiến rất nhiều. Các sóng có bước sóng dài bao gồm tia hồng ngoại mang năng lượng nhiệt, đến vi sóng và sóng vô tuyến. Các sóng có bước sóng ngắn hơn có thể kể đến tia cực tím, tia X và tia gamma.



### Kính viễn vọng vô tuyến

Một ăng ten đĩa có thể được sử dụng để phát hiện sóng vô tuyến phát ra từ các ngôi sao xa xôi.



### Lò vi sóng

Thực phẩm được làm nóng khi vi sóng năng lượng cao kích thích các phân tử nước bên trong chúng.



### Điều khiển từ xa

Điều khiển từ xa sử dụng các xung bức xạ hồng ngoại để truyền mã điều khiển kỹ thuật số.





Cho đến thập niên 1880, tia hồng ngoại, tia khả kiến và tia cực tím là những dạng bức xạ điện từ duy nhất được phát hiện. Nhưng công nghệ hiện đại đã cho phép ta khai thác toàn bộ phổ điện từ.



# Màu sắc

Màu sắc là một hiện tượng được tạo ra bởi mắt và hệ thống thị giác cho phép chúng ta nhìn thấy các bước sóng ánh sáng khác nhau. Màu sắc ta nhận thấy phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng mà mắt ta phát hiện.

## Phổ khả kiến

Mắt người có thể phát hiện ánh sáng với bước sóng nằm trong khoảng từ 400 đến 700 nanomet. Ánh sáng chứa tất cả các bước sóng này mang màu trắng với mắt người. Khi ánh sáng được phân chia thành các bước sóng riêng lẻ, não sẽ chỉ định cho mỗi sóng một màu cụ thể trong phổ màu. Ánh sáng đỏ có bước sóng dài nhất và ánh sáng tím có bước sóng ngắn nhất.

### Phân tách ánh sáng trắng

Nếu các bước sóng trong ánh sáng trắng bị phân tách bởi khúc xạ, thì mỗi màu sẽ bị bẻ theo một góc nhất định, tạo ra cầu vồng.



## TẠI SAO CHÚNG TA KHÔNG THỂ THẤY ĐƯỢC MÀU SẮC VÀO BAN ĐÊM?


Đêm tối khiến tế bào hình nón nhạy cảm với màu không thể hoạt động. Thay vào đó, các tế bào que hoạt động mạnh hơn giúp hiển thị hình ảnh thành những vùng sáng và tối.

## Thị giác màu

Mắt người tạo ra hình ảnh từ ánh sáng bằng ba loại tế bào phát hiện ánh sáng, được gọi là tế bào hình nón theo hình dạng của chúng. Các tế bào hình nón trong võng mạc chứa các sắc tố hóa học nhạy cảm với từng loại bước sóng ánh sáng cụ thể. Khi được kích hoạt, chúng phát ra một tín hiệu thần kinh. Não bộ nhận tín hiệu cho ánh sáng đỏ, lục và lam chiếu vào mắt, rồi tạo ra tri nhận về màu sắc từ chúng. Ví dụ, tín hiệu từ cả hai loại tế bào hình nón màu lục và màu đỏ tạo ra tri nhận về màu vàng. Tín hiệu từ cả ba tế bào hình nón cho cảm nhận về màu trắng, trong khi không có tín hiệu từ bất kỳ tế bào nào cho cảm nhận về màu đen.

### Cảm biến ánh sáng

Tất cả các bộ phận của võng mạc đều chứa các tế bào hình nón thuộc cả ba loại, mặc dù hầu hết các tế bào này nằm ở phần trung tâm ngay phía sau con ngươi. Đây là nơi các phần chi tiết nhất của hình ảnh được hình thành.









## TRỜI XANH

Bầu trời có màu xanh lam bởi vì, so với các màu khác, ánh sáng lam có bước sóng ngắn hơn và dội lại mạnh hơn từ các phân tử không khí, tán xạ theo mọi hướng, trước khi nó chiếu vào mắt chúng ta. Ánh sáng tím cũng tán xạ, nhưng ít hơn, và mắt người nhạy cảm hơn với ánh sáng xanh.




Hồng cánh sen thực chất không phải là một phần của cầu vồng tự nhiên nhưng nó được hình thành khi mắt phát hiện ánh sáng đỏ và lam nhưng không có ánh sáng lục



## Trộn màu

Khi ánh sáng chiếu vào một vật thể, nó có thể bị hấp thụ hoặc phản xạ. Bộ não gán một màu cụ thể cho một vật thể theo ánh sáng mà nó phản xạ lại. Ví dụ, một quả chuối phản xạ ánh sáng màu vàng và hấp thụ tất cả các màu khác. Hiện tượng này được gọi là phối màu trừ, thường được sử dụng trong sản xuất mực và thuốc nhuộm màu. Trộn màu trực tiếp từ nguồn sáng, chẳng hạn như trong dụng cụ ánh sáng sân khấu, đòi hỏi cách tiếp cận ngược lại, được gọi là phối màu cộng.


Trộn ba màu sơ cấp sẽ chuyển thành trắng (không màu)



Ba loại mực hấp thụ tất cả các màu và hiện ra màu đen

Hai màu sơ cấp tạo ra một màu thứ cấp

Trộn hai loại mực phản xạ một màu sơ cấp duy nhất



### Phối màu cộng

Ánh sáng truyền qua được thay đổi bằng hệ thống cộng màu. Đỏ, lục và lam là ba màu sơ cấp. Màu thứ cấp được tạo nên bằng cách kết hợp hai màu sơ cấp. Trộn ba màu sơ cấp sẽ tạo ra ánh sáng trắng.



Vật thể phản xạ tất cả các màu sẽ có màu trắng

Vật thể hấp thụ tất cả các màu sẽ có màu đen

### Ánh sáng phản xạ

Khi chúng ta nhìn vào một vật thể, nó có vẻ mang một màu nhất định. Điều này phụ thuộc vào bản chất của vật liệu và bước sóng ánh sáng mà nó hấp thụ hoặc phản xạ vào mắt chúng ta.



TÔM BỌ NGỰA CÓ TỚI 12 LOẠI THỤ

THỂ MÀU, CHÚNG CÓ THỂ NHÌN THẤY TIA CỰC TÍM VÀ TIA CẬN HỒNG NGOẠI



# Gương và thấu kính

Các chùm ánh sáng luôn truyền theo đường thẳng, nhưng chúng có thể thay đổi hướng do các hiện tượng như phản xạ và khúc xạ. Hai quá trình này được sử dụng để kiểm soát ánh sáng bằng gương và thấu kính.

## Phản xạ ánh sáng

Góc của chùm tia phản xạ luôn bằng với góc của chùm tia tới. Các góc được đo từ một đường tưởng tượng vuông góc với mặt tới. Ánh sáng phản xạ từ hầu hết các vật thể sẽ tán xạ theo mọi hướng vì các chùm tia chiếu vào bề mặt gồ ghề, không bằng phẳng, ở các góc khác nhau. Một chiếc gương có bề mặt phẳng nhẵn, vì vậy các chùm tia phản xạ giữ nguyên vị trí tương đối ban đầu của chúng và tạo ra một hình ảnh.

## ẢO TƯỢNG

Ảo tượng là ảo ảnh quang học có thể nhìn thấy trong những ngày nắng nóng. Trong sa mạc, ảo tượng xuất hiện như một màn nước long lanh ở phía xa. “Nước” ở đây thực ra là ánh sáng rực rỡ từ bầu trời, đang bị khúc xạ ngược lên mắt bởi một lớp không khí nóng.




## TẠI SAO KIM CƯƠNG LẠI LẤP LÁNH?

Kim cương sau khi được cắt gọt sẽ trông lấp lánh vì các góc trên bề mặt của chúng đảm bảo rằng bất kỳ chùm ánh sáng nào chiếu vào chúng đều phản chiếu quanh trong viên kim cương rồi mới ra ngoài từ đỉnh.

## Ảnh phản chiếu

Một chiếc gương tạo ra một ảnh ảo của vật thể, dường như được đặt phía sau gương. Hiện tượng phản chiếu sẽ làm lật hình ảnh theo chiều ngang, chính vì vậy chữ cái để trước gương sẽ bị ngược.









## Khúc xạ ánh sáng

Sóng ánh sáng truyền đi ở tốc độ khác nhau qua các môi trường khác nhau. Nếu ánh sáng truyền vào một môi trường trong suốt theo một góc, sự thay đổi tốc độ cũng dẫn đến một sự thay đổi nhỏ về hướng. Hiện tượng này được gọi là khúc xạ. Các phần khác nhau của chùm sáng chậm lại ở những thời điểm khác nhau, làm lệch hướng đi của ánh sáng.




### Thực tế và vẻ ngoài

Khúc xạ có thể đánh lừa mắt ta. Ánh sáng từ một con cá bị khúc xạ khi nó truyền từ nước sang không khí. Bộ não, tin rằng ánh sáng truyền theo đường thẳng, sẽ nhìn thấy con cá thẳng hàng với ánh sáng chiếu vào mắt.



Vị trí nhìn thấy của cá



Ánh sáng bị khúc xạ khi nó rời khỏi nước

Vị trí thực tế của cá

## CẦU VỒNG HÌNH THÀNH KHI ÁNH SÁNG BỊ PHẢN XẠ, KHÚC XẠ VÀ PHÂN TÁN BỞI NHỮNG HẠT MƯA




## Tập trung ánh sáng

Một thấu kính là một mảnh thủy tinh trong suốt sử dụng khúc xạ để thay đổi hướng ánh sáng. Nó có một mặt cong, có nghĩa là các chùm ánh sáng chiếu vào thấu kính ở một loạt các góc khác nhau, và kết quả là các tia đều bị khúc xạ theo các góc khác nhau. Có hai loại thấu kính chính. Một thấu kính hội tụ (lồi) bẻ ánh sáng vào trong, còn một thấu kính phân kỳ (lõm) bẻ ánh sáng ra ngoài.


### Thấu kính hội tụ

Các chùm ánh sáng chiếu qua một thấu kính lồi hội tụ tại một tiêu điểm ở phía đối diện. Khoảng cách giữa thấu kính và tiêu điểm là độ dài tiêu cự. Một thấu kính hội tụ có thể được sử dụng để phóng to các vật thể nhỏ (xem trang 113).



### Thấu kính phân kỳ

Một thấu kính lõm làm cho các chùm ánh sáng lan rộng ra như thể chúng đến từ một tiêu điểm phía sau thấu kính. Thấu kính loại này được sử dụng trong kính cận thị.





# Laser hoạt động ra sao?

Laser là thiết bị tạo ra một chùm ánh sáng cực mạnh song song và cố kết với nhau, nghĩa là các sóng ánh sáng trong chùm được xếp thẳng hàng và có cùng bước sóng. Điều này mang lại độ chính xác và sức mạnh cho chùm tia.


## Ánh sáng cung cấp năng lượng

Trong laser tinh thể, ánh sáng được chiếu vào một ống làm từ tinh thể nhân tạo, chẳng hạn như ruby. Các nguyên tử bên trong hấp thụ năng lượng và phát lại ánh sáng, khiến các nguyên tử gần đó cũng phát ra các photon ánh sáng, tất cả đều ở một bước sóng rất cụ thể. Các photon chuyển động qua lại giữa các gương trong ống cho đến khi ánh sáng đủ mạnh để thoát khỏi ống trong một chùm hẹp, với sức mạnh đủ để khoan xuyên qua kim cương.


Tinh thể ruby chứa các nguyên tử và photon

Gương ngăn chặn photon thoát khỏi tinh thể

Đèn flash đưa ánh sáng (photon) vào tinh thể






Electron  
Lớp electron năng lượng cao  
Lớp electron năng lượng thấp



Electron di chuyển trở lại lớp vỏ electron năng lượng thấp hơn

Photon va chạm với một electron bị kích thích của một nguyên tử khác



### 1 Kích thích

Khi một nguyên tử hấp thụ một photon, một trong số các electron của nó nhảy từ mức năng lượng thấp lên mức cao hơn. Nguyên tử sẽ bất ổn trong trạng thái kích thích.

### 2 Năng lượng dư thừa

Electron ở trạng thái bị kích thích chỉ trong vài mili giây, sau đó nó sẽ giải phóng photon bị hấp thụ. Photon được giải phóng bởi electron có một bước sóng cụ thể.

### 3 Bắn khắp nơi


Các electron đã bị kích thích tiếp tục bị một số photon bắn vào, khiến chúng giải phóng hai photon thay vì một. Hiện tượng này được gọi là phát xạ kích thích.





## Sử dụng ánh sáng laser

Laser đã chứng tỏ mình là một trong những phát minh linh hoạt nhất của thời hiện đại. Ngày nay, chúng có một loạt các ứng dụng hằng ngày và cực kỳ độc đáo, từ giao tiếp vệ tinh đến đọc mã vạch tại siêu thị.



Lượng photon trong tinh thể tăng lên khi các electron bị kích thích phát ra nhiều photon hơn

### LASER MẠNH ĐẾN MỨC NÀO?

Tia laser mạnh nhất thế giới có thể cung cấp chùm tia với năng lượng tương đương 2 petawatt, trong một phần nghìn tỷ giây - gần bằng mức tiêu thụ năng lượng trung bình của toàn thế giới.

Tia laser gồm các photon có bước sóng cụ thể, được xếp thành hàng với cùng bước sóng

Photon được phản xạ qua lại dọc theo chiều dài của tinh thể

Gương tráng bạc một phần

#### 4 Ánh sáng được khuếch đại

Mỗi lần một photon kích thích sự giải phóng hai photon, ánh sáng được khuếch đại. "Laser" chính là viết tắt của "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" (khuếch đại ánh sáng bằng phát xạ kích thích). Ánh sáng sẽ bật lên xuống trong ống.

#### 5 Bắn ra tia laser

Một chiếc gương tráng bạc một phần cho phép một số photon thoát khỏi tinh thể dưới dạng một chùm ánh sáng cố kết, mạnh mẽ.



# Ứng dụng quang học

Quang học là ngành nghiên cứu ánh sáng. Biểu hiện quang học của các chùm ánh sáng, như phản xạ và khúc xạ, có một số ứng dụng mạnh mẽ cho phép chúng ta nhìn xa hơn giới hạn của mắt người.

## Quang học trong thực tiễn

Mắt người chỉ có thể nhìn thấy các vật thể có đường kính lớn hơn 0,1 mm. Các dụng cụ quang học có thể được sử dụng để quan sát các vật thể nhỏ hơn mức đó – hoặc để xem chi tiết các vật thể ở cách ta rất xa. Dụng cụ quang học sẽ thu thập các chùm ánh sáng đến từ vật thể. Ánh sáng này tạo thành một hình ảnh mờ, nhưng nó quá nhỏ để nhìn rõ. Dụng cụ sẽ thu thập nhiều ánh sáng từ vật thể để làm cho hình ảnh sáng hơn, và sau đó phóng to nó qua thấu kính.

## Sợi quang học

Những dây cáp siêu nhanh này truyền tín hiệu dưới dạng các tia sáng được mã hóa bên trong các sợi thủy tinh linh hoạt. Ánh sáng truyền đi bằng cách phản chiếu lên bề mặt bên trong của sợi. Góc mà tia laser bắn vào kính đóng vai trò rất quan trọng: góc quá nhọn thì tia sẽ không phản xạ, mà sẽ khúc xạ ra khỏi sợi.




### CHÚ THÍCH

- Tín hiệu ánh sáng 1
- Tín hiệu ánh sáng 2


## Ghép kênh

Một sợi có thể mang một số tín hiệu khác nhau bằng cách sử dụng các laser màu khác nhau.



## GIAO THOA


Giống như tất cả các loại sóng, sóng ánh sáng sẽ giao thoa với nhau. Khi hai sóng ánh sáng gặp nhau, chúng kết hợp thành một. Nếu các bước sóng cùng pha – có cùng độ dài, với đỉnh và đáy di chuyển cùng nhau – chúng sẽ tạo ra một sóng mạnh hơn. Các sóng ngược pha sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Giao thoa cũng tạo ra các mẫu hình, chẳng hạn như các xoáy màu ta nhìn thấy trên dầu.



## ĐEO KÍNH CỎ LÀM CHO THỊ LỰC TỆ HƠN?


Thị lực kém là do cấu trúc của mắt và tính linh hoạt của thủy tinh thể. Đeo kính chẳng có tác dụng giải quyết những điều này – nhưng nó sẽ làm cho bạn nhìn rõ hơn.





## Phóng đại

Hầu hết các thấu kính được gắn trong kính hiển vi là thấu kính lồi (hội tụ) (xem trang 109), được sử dụng để tạo thành một phiên bản lớn hơn của mẫu vật. Nếu một vật được đặt ở giữa thấu kính và tiêu điểm của nó, các chùm sáng từ vật thể sẽ hội tụ ở phía bên kia của thấu kính. Tăng độ cong của thấu kính sẽ làm tăng độ dài tiêu cự và do đó, làm tăng mức độ phóng đại của thấu kính.






# Âm thanh

Tất cả các âm thanh đều truyền đến tai ta qua một môi trường – chẳng hạn như không khí – dưới dạng sóng (xem trang 102-103). Nhưng sóng âm không giống như sóng ánh sáng hay sóng vô tuyến. Chúng là những gợn sóng nén đi dọc từ nguồn.

## Sóng áp lực


Sóng âm thanh được tạo ra nhờ một cơ chế kéo dãn, chẳng hạn như trên một màng loa. Tín hiệu điện làm cho màng loa chuyển động tiến và lùi ở tốc độ cao, khiến nó đẩy không khí rồi sau đó kéo lại. Mỗi lần loa đẩy lại tạo ra một gợn sóng nén di chuyển trong không khí. Màng loa chuyển động càng nhiều trong mỗi chu kỳ, nó càng tạo ra nhiều áp lực – áp lực càng cao, các phân tử không khí càng bị nén và âm thanh càng lớn.

ÂM LƯỢNG LỚN



Các phân tử không khí nén chặt với nhau

Chênh lệch áp suất lớn hơn tạo ra một âm thanh lớn




BIÊN ĐỘ CAO

### Tiếng to hay nhỏ?


Âm thanh lớn nén các phân tử không khí chặt hơn, do đó các gợn sóng cách nhau xa hơn. Mật độ thay đổi của các phân tử không khí trong mỗi gợn sóng chính là biên độ – khoảng cách từ đỉnh đến đáy trên đồ thị sóng.

ÂM LƯỢNG NHỎ



Các phân tử không khí ít nén lại với nhau.

Chênh lệch áp suất nhỏ hơn tạo ra một âm thanh nhỏ



BIÊN ĐỘ THẤP

## Âm lượng lớn đến đâu?

Âm lượng được đo bằng decibel (dB), một đơn vị tăng theo cấp số nhân. Làm cho âm thanh to hơn 10 dB đồng nghĩa với làm cho nó mạnh hơn gấp 10 lần.

TIẾNG NÓI CHUYỆN



XE HƠI ĐI QUA



TIẾNG XE MÁY



BUỔI HÒA NHẠC



TIẾNG SÚNG



TIẾNG NỔ



ĐỒNG HỒ TÍCH TẮC

TIẾNG THÌ THẦM

CHUÔNG ĐIỆN THOẠI REO

GUITAR ACOUSTIC

85 dB là giới hạn an toàn

130 dB là ngưỡng đau  
15 phút tiếp xúc với âm thanh 100 dB có thể làm hỏng thính giác

Tiếng ồn duy trì ở mức 140 dB gây ra tổn hại ngay lập tức






## Hiệu ứng Doppler

Sóng âm truyền đi trong không khí với tốc độ vào khoảng 1.238 km/h. Quá là nhanh, nhưng thậm chí các sóng nhanh cũng bị ảnh hưởng bởi tốc độ nguồn của chúng. Nếu một chiếc xe lớn đang di chuyển về phía người nghe, những gợn áp lực của sóng âm sẽ ở gần nhau hơn, làm tăng tần số của sóng và cao độ của âm. Khi chiếc xe đi qua, những con sóng kéo dài ra, hạ thấp cao độ của chúng.

### Xe đua


Các sóng âm thanh nằm phía trước chiếc xe đua bị ép lại với nhau vì động cơ ồn ào của nó đến gần từng sóng thêm một chút trước khi phát đi sóng tiếp theo.

Nhiều sóng hơn trong mỗi giây tạo ra âm thanh cao hơn



## CAO ĐỘ

Cao độ của âm thanh có liên quan đến tần số sóng của nó: tần số càng cao thì cao độ càng cao. Được đo bằng hertz (Hz), tần số là số lượng đỉnh hoặc đáy sóng (hoặc chu kỳ sóng) truyền qua một điểm trong một giây.




## TẠI SAO KHÔNG AI NGHE THẤY KHI BẠN HẾT LÊN TRONG KHÔNG GIAN?

Âm thanh được truyền bởi sóng áp lực đi qua một môi trường, chẳng hạn như các phân tử không khí. Trong chân không vũ trụ, không có không khí.

## Siêu thanh

Nhiều máy bay phản lực di chuyển nhanh hơn tốc độ âm thanh, bay qua trước cả khi bất cứ ai nghe thấy tiếng chúng đến. Các sóng âm thanh bị nén đến mức chúng tạo ra một âm thanh cực lớn.



### 1 Tăng tốc

Khi máy bay siêu thanh tăng tốc từ tốc độ thấp, sóng âm có thể lan ra phía trước nó, nhưng chúng bị nén lại, ngày càng gần nhau hơn do Hiệu ứng Doppler.

### 2 Phá vỡ rào cản âm thanh

Tại vận tốc 1.238 km/h, máy bay sẽ phá vỡ rào cản âm thanh. Nó bắt kịp với các sóng âm thanh nén, khiến chúng hợp nhất thành một sóng xung kích duy nhất.

### 3 Tiếng nổ

Sóng xung kích lan ra phía sau máy bay theo dạng một hình nón mở rộng. Khi nó chạm đất, nó phát ra một tiếng nổ lớn, theo sau đường bay.

## TIẾNG CỦA CÁ VOI XANH CÓ THỂ CÓ ÂM LƯỢNG LỚN HƠN 180 DB






# Nhiệt

Các vật thể nóng có rất nhiều năng lượng nội tại, giúp các nguyên tử và phân tử của chúng chuyển động. Đó còn được gọi là năng lượng nhiệt (nhiệt năng). Một vật thể có nhiệt năng cao sẽ rất nóng, và nhiệt của nó sẽ lan truyền đến những nơi lạnh hơn, vốn có năng lượng nhiệt ít hơn.

## Chuyển động nhanh hơn

Khi vật liệu thu được nhiệt năng, các nguyên tử của nó chuyển động nhanh hơn. Vật liệu cho cảm giác nóng vì năng lượng nhiệt của nó tỏa ra môi trường xung quanh lạnh hơn.


## SỮA LẠNH



Trong các chất lạnh hơn, chẳng hạn như sữa lạnh, các nguyên tử không di chuyển nhiều.

## Chuyển giao năng lượng

Khi sữa lạnh được thêm vào cà phê nóng, một phần nhiệt lượng trong cà phê sẽ chuyển sang sữa - làm cho sữa ấm hơn và cà phê mát hơn.



Các nguyên tử trong cà phê di chuyển nhanh hơn khi được làm nóng và trải rộng ra.

## CÀ PHÊ NÓNG

## Đun nóng

Khi đun nóng, các nguyên tử trong chất rắn và chất lỏng dao động qua lại. Trong một chất khí, chúng bay quanh, va chạm với các nguyên tử khác. Khối lượng của vật thể vẫn giữ nguyên, nhưng không gian giữa các nguyên tử tăng lên và chất giãn nở.

## Nhiệt độ

Nhiệt độ là một chỉ số cho biết lượng nhiệt năng trong một chất. Nhiệt độ của một chất có liên quan đến năng lượng trung bình của các hạt trong chất đó. Một số hiện tượng tự nhiên sẽ xảy ra ở nhiệt độ nhất định - chẳng hạn nước sôi ở 100°C. Các mức nhiệt này được sử dụng như các điểm cố định để tạo ra một thang đo mà dựa vào đó ta có thể so sánh các nhiệt độ khác.

### Lửa từ củi gỗ

Một ngọn lửa gỗ được thông gió tốt sẽ đủ nóng để nấu chảy quặng thành kim loại nguyên chất.




### Khí thải máy bay phản lực

Lực đẩy của động cơ phản lực đến từ chuyển động nhanh của các phân tử khí tràn đầy năng lượng.



### Điểm nóng chảy của chì

Chì là kim loại đầu tiên được tinh chế do nhiệt độ nóng chảy tương đối thấp của nó.




### Nhiệt độ tối đa của bếp lò tại nhà

Nấu nướng kéo dài ở nhiệt độ này sẽ dần dần làm hỏng giá đỡ kim loại.



### Nước sôi

Điểm cố định trên của thang đo Celsius, được chọn vì việc lặp lại kết quả này là đơn giản.



### Nhiệt độ nóng nhất trên Trái Đất

Nhiệt độ này đã được ghi nhận vào năm 2005 trong một nghiên cứu vệ tinh về nhiệt độ bề mặt đất ở sa mạc Lut tại Iran.



600

873,15

1.112

400

673,15

752

327,5

600,7

621,5

250

523,15

482

100

373,15

212

70,7

343,85


159,3





## Nhiệt ẩn

Khi năng lượng nhiệt được thêm vào một chất, sự gia tăng chuyển động của các nguyên tử và phân tử cuối cùng sẽ phá vỡ các liên kết giữa chúng. Chất sẽ thay đổi trạng thái (xem trang 22-23) - ví dụ, sôi lên. Trong quá trình thay đổi này, nhiệt không làm cho chất nóng hơn. Thay vào đó, nhiệt năng sẽ hoạt động dưới dạng nhiệt ẩn.




## Nhiệt năng

### Hiệu ứng nhiệt ẩn

Thay vì tăng chuyển động của các nguyên tử và phân tử, năng lượng nhiệt ẩn được sử dụng để phá vỡ liên kết giữa chúng. Vì vậy, nhiệt độ sẽ không đổi trong khoảng thời gian ngắn mà chất thay đổi trạng thái, dù nhiệt năng vẫn được thêm vào. Một khi các liên kết bị phá vỡ, nhiệt độ sẽ tăng trở lại.

## NĂNG LƯỢNG VÀ NHIỆT ĐỘ

Một cây pháo bông cháy sáng ở khoảng 1.000 °C. Tuy nhiên, những tia lửa nóng mà pháo bắn ra sẽ không làm bỏng da người, trong khi bản thân ngọn pháo sáng thì đủ khả năng làm vậy. Dù tia lửa nhỏ có nhiệt độ cao, khối lượng thấp của nó, nghĩa là tổng năng lượng mà nó chứa, rất nhỏ và do đó hầu như vô hại.



## Nhiệt độ bình thường của cơ thể người

Đây ban đầu được chọn là điểm cố định trên cho thang đo Fahrenheit.

## Nước đóng băng

Điểm không của thang đo Celsius, tạo ra 100 độ giữa điểm đóng băng và điểm sôi của nước.

## Nhiệt độ lạnh nhất trên Trái Đất

Nhiệt độ này đã được đo ở phía đông Nam Cực vào năm 2010.

## Khí hóa lỏng

Hầu hết các khí trong không khí trở thành chất lỏng ở nhiệt độ này.

## Bên ngoài không gian

Nhiệt độ lạnh nhất trong không gian giữa các vì sao.


## Độ không tuyệt đối

Nhiệt độ thấp nhất về mặt lý thuyết, nhưng một vật thể không thể nào trở nên lạnh như vậy.

37°C

**NHIỆT ĐỘ NƯỚC SÔI Ở ĐỘ CAO 18.000 M**

**Thang đo nhiệt độ**  
Có ba thang đo nhiệt độ chính - Fahrenheit, Celsius, và Kelvin, được phát minh lần lượt vào các năm 1724, 1742 và 1848.





# Truyền nhiệt

Nhiệt có thể được truyền từ vật này sang vật khác bằng ba quá trình: dẫn nhiệt, đối lưu và bức xạ. Cách nhiệt di chuyển phụ thuộc vào cấu trúc nguyên tử của vật thể.

## Đối lưu

Nhiệt di chuyển qua chất lưu - chất lỏng và khí - bằng đối lưu. Quá trình này hoạt động theo nguyên tắc dòng chất lưu nóng ở trên cao và dòng chất lưu lạnh ở dưới thấp. Nhiệt làm cho các nguyên tử và phân tử trong chất lưu giãn ra, do đó thể tích của nó tăng lên và khối lượng riêng của nó giảm xuống. Điều này cho phép các chất lưu nóng nổi lên trên trong khi chất lưu lạnh hơn chìm xuống, và tạo ra một dòng đối lưu mang nhiệt năng cùng với nó.

Không khí ấm áp lan tỏa khắp phòng, tỏa nhiệt ra môi trường xung quanh


Không khí được bếp sưởi ấm bốc lên

Không khí mát hơn chìm xuống để nhường chỗ cho không khí ấm phía trên

### Sưởi ấm

Các vật dụng sưởi ấm, chẳng hạn như lò củi, sử dụng đối lưu để truyền nhiệt trong phòng. Các bộ tản nhiệt của một hệ thống sưởi ấm trung tâm cũng hoạt động tương tự.

Không khí chìm xuống được kéo lại gần bếp, nơi nó được sưởi ấm và sau đó bốc lên




## VẬT LIỆU NÀO DẪN NHIỆT TỐT NHẤT?

Kim cương được xem là chất dẫn nhiệt tốt nhất - nó hiệu quả hơn gấp đôi so với đồng và tốt hơn bốn lần so với nhôm.

Khi động năng truyền qua kim loại, nhiệt độ của nó tăng lên

Năng lượng chuyển động (động năng) được truyền sang các nguyên tử khác qua va chạm



Một nguồn nhiệt làm cho các nguyên tử di chuyển nhiều hơn



Các electron nhỏ, chuyển động tự do chảy giữa các nguyên tử, truyền năng lượng nhiệt qua kim loại

## Dẫn nhiệt

Chất rắn truyền nhiệt bằng cách dẫn. Các nguyên tử trong phần được làm nóng của chất rắn sẽ rung động cực nhiều và thường xuyên va chạm với các nguyên tử xung quanh. Những va chạm này truyền năng lượng chuyển động đến các nguyên tử gần đó, làm cho chúng ấm hơn. Quá trình này tiếp tục cho đến khi nhiệt đã lan ra toàn bộ vật liệu.






## BỨC XẠ HỒNG NGOẠI TRUYỀN ĐI VỚI TỐC ĐỘ ÁNH SÁNG VÀ CÓ THỂ DI CHUYỂN QUA CHÂN KHÔNG VU TRỤ



### VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT

Vật liệu cách nhiệt hoạt động bằng cách ngăn chặn sự truyền nhiệt. Chất khí như không khí là một chất dẫn nhiệt kém, vì vậy một số vật cách điện có chứa đầy các túi khí. Quần áo giữ ấm cho chúng ta bằng cách giữ không khí gần sát với cơ thể của ta. Nhiệt độ cơ thể không thể truyền qua không khí và do đó được giữ lại bên trong. Cửa sổ hai lớp bao gồm hai tấm kính được ngăn cách bởi một khoang được bơm khí trơ hoặc không khí bị mất nước vào trong điều kiện chân không. Những cửa sổ này cách nhiệt cực tốt vì chúng chặn cả bức xạ lẫn đối lưu.




### Bức xạ

Phương pháp truyền nhiệt thứ ba là bức xạ. Năng lượng nhiệt được mang theo trong một dạng bức xạ vô hình gọi là hồng ngoại – tên gọi này là bởi vì tần số của nó thấp hơn ánh sáng đỏ có thể nhìn thấy bằng mắt (nhưng cao hơn sóng vô tuyến). Tia hồng ngoại được phát ra bởi các vật nóng, nhưng có lẽ đáng chú ý nhất là Mặt Trời. Một vật thể có diện tích bề mặt lớn so với thể tích của nó sẽ tỏa nhiệt – và nguội đi – nhanh hơn nhiều so với một vật thể có diện tích bề mặt tương đối nhỏ.

### CÂN BẰNG NHIỆT

Khi hai vật thể tiếp xúc vật lý với nhau, nhiệt chuyển từ vật nóng sang vật lạnh và không bao giờ truyền theo chiều ngược lại. Nhiệt sẽ tiếp tục được truyền cho đến khi cả hai vật có cùng nhiệt độ. Trạng thái này được gọi là trạng thái cân bằng nhiệt, khi mà không xảy ra sự truyền nhiệt nữa.

Năng lượng nhiệt tỏa ra cho đến khi được phân bố đều





# Lực


Chuyển động được tạo ra khi một lực tác động lên một khối lượng. Các lực tác động lên vật thể theo cách khác nhau, tùy thuộc vào khối lượng của vật thể đó. Lực được đo bằng newton (N). Một lực 1 N sẽ làm tăng tốc một vật có khối lượng 1 kg lên 1 m/s trong một giây.

## TẠI SAO MỘT SỐ VẬT THỂ NẤY LẠI, CÒN SỐ KHÁC LẠI VỠ TÀN?

Các vật thể linh hoạt có thể biến dạng khi chúng đập vào một bề mặt, nhưng các vật thể giòn hầu như không thay đổi hình dạng khi có lực tác dụng lên và nhiều khả năng chúng sẽ vỡ thành từng mảnh.

## Truyền năng lượng

Khi hai vật thể va chạm, các nguyên tử của chúng xích lại gần nhau. Các electron tích điện âm xung quanh các nguyên tử đẩy nhau, vì vậy các vật thể không hợp nhất thành một mà tách nhau ra. Lực đẩy đó truyền năng lượng từ vật này sang vật khác, nhưng tổng lượng năng lượng vẫn được giữ nguyên. Bằng cách di chuyển năng lượng giữa các vật thể, lực tạo ra sự thay đổi hiện trạng, chẳng hạn như thay đổi chuyển động hoặc thay đổi hình dạng của các vật thể liên quan.




### Tăng tốc

Một lực tác dụng lên một quả bóng tennis làm cho nó tăng tốc, và thế là nó bắt đầu di chuyển và tăng tốc độ.

### Chậm lại

Một lực đẩy ngược hướng với chuyển động của quả bóng làm cho nó chậm lại.



### Thay đổi hướng

Cần phải có một lực tác động ở một góc khác với lực ban đầu thì quả bóng tennis mới thay đổi hướng.

### Thay đổi hình dạng

Quả bóng thay đổi hình dạng vì nó bị nén bởi hai lực đối kháng bằng nhau.

## Chuyển động ném xiên

Một quả bóng tennis, hay bất kỳ vật thể ném xiên nào khác, đều chuyển động theo một đường cong do sự kết hợp của các lực tác động lên quả bóng. Động năng của bóng được chuyển thành thế năng hấp dẫn (năng lượng dự trữ do vị trí thẳng đứng của nó) và sau đó chuyển hóa trở lại động năng khi nó rơi xuống.

### CHÚ THÍCH

→ Lực dọc

→ Lực ngang

→ Lực kết quả


→ Quỹ đạo bóng

→ Chuyển động đi lên và đi ngang bằng nhau nên quả bóng di chuyển ở góc 45°

→ Chuyển động đi lên giảm dần do lực kéo của trọng lực tác dụng lên quả bóng

→ Lực kết quả tạo thành đường chéo hình chữ nhật

→ Vợt áp dụng một lực đẩy vừa hướng thẳng đứng lên trên, chống lại trọng lực là lực kéo xuống, vừa đi ngang




**CÚ ĐÁNH TENNIS MẠNH NHẤT TRONG LỊCH SỬ CÓ TỐC ĐỘ LÀ 263,4 KM/H**






## Quán tính

Quán tính là một tính chất của vật chất nhằm chống lại sự thay đổi trạng thái chuyển động của nó, cho dù nó ở trạng thái nghỉ, hay đang di chuyển với tốc độ không đổi. Một lực bên ngoài là cần thiết để vượt qua quán tính. Khối lượng càng lớn, quán tính càng cao, vì vậy khối lượng lớn hơn đòi hỏi một lực lớn hơn để thay đổi trạng thái chuyển động của nó.



### Chuyển động đều

Rỏ và bóng đang di chuyển với cùng tốc độ theo cùng một hướng. Chỉ có một lực mới có thể thay đổi chuyển động của chúng.




### Dịch chuyển quán tính

Một lực (từ rào chắn) ngăn rỏ di chuyển, nhưng lực này hầu như không ảnh hưởng đến các quả bóng, nên quán tính của chúng vẫn giữ cho chúng di chuyển.



Quả bóng hết động năng, lúc này được thay thế bằng thế năng hấp dẫn; bóng không di chuyển lên hoặc xuống mà chỉ đi ngang



Trọng lực đảo ngược hướng chuyển động thẳng đứng, nhưng chuyển động ngang vẫn tiếp tục theo cùng hướng


Trọng lực kéo quả bóng xuống với cùng một lực ở mọi giai đoạn quỹ đạo của nó

**TRỌNG LỰC**

Gia tốc của trọng lực làm cho quả bóng đi xuống xa hơn so với nó đi ngang

## Lực kết quả

Gần như luôn luôn có nhiều hơn một lực tác dụng lên một vật thể, đẩy nó theo các hướng khác nhau với các lượng khác nhau. Các lực riêng lẻ này kết hợp thành một lực kết quả (hợp lực) duy nhất. Lực kết quả được tính toán bằng định lý Pythagoras, với hai lực tác động được biểu thị bằng các cạnh ngắn của tam giác vuông và lực kết quả có kích thước tương đương với cạnh dài nhất, hay cạnh huyền.




Trọng lực cho phép quả bóng tiếp tục tăng tốc cho đến khi chạm đất




## TÚI KHÍ HOẠT ĐỘNG THẾ NÀO?

Quán tính của hành khách là một trong những mối nguy hiểm chính trong các vụ tai nạn xe hơi, vì cơ thể họ vẫn tiếp tục di chuyển khi xe đột ngột dừng lại. Túi khí khai thác quán tính để cảm nhận một vụ tai nạn sắp xảy ra và tự động thổi phồng, làm hành khách di chuyển chậm lại ở tốc độ an toàn hơn.



### TÚI KHÍ TRƯỚC KHI VA CHẠM



### TÚI KHÍ SAU KHI VA CHẠM



# Vận tốc và gia tốc

Vận tốc là tốc độ của một vật thể đang di chuyển theo một hướng cụ thể. Một sự thay đổi trong vận tốc của vật thể đòi hỏi có một lực tác dụng, và tốc độ thay đổi của vận tốc được đo bằng đại lượng gia tốc.

## Vận tốc

Tốc độ là thước đo khoảng cách theo thời gian – ví dụ, xe đi được bao xa trong một giờ. Vận tốc cũng đo tốc độ nhưng bao gồm hướng chuyển động. Xe hơi đi ngược chiều nhau có thể di chuyển với cùng tốc độ nhưng có vận tốc khác nhau. Mọi vật thể chuyển động đều có một vận tốc tương đối khi so sánh với các vật thể chuyển động khác, và vận tốc này khác với tốc độ thực tế của chúng.

### Không khác biệt

Hai chiếc xe này có cùng vận tốc, theo nghĩa cả về tốc độ và hướng đi của chúng. Do đó vận tốc tương đối của chúng bằng không, và chúng sẽ duy trì một khoảng cách cố định với nhau.



**XE ĐI VỚI TỐC ĐỘ**  
30 KM/H



**XE ĐI VỚI TỐC ĐỘ**  
30 KM/H

### Bắt kịp

Chiếc xe màu vàng đang di chuyển nhanh hơn 30 km/h so với chiếc xe màu xanh lá cây, vì vậy có thể nói nó có vận tốc tương đối là 30 km/h so với chiếc xe màu xanh lá cây.



**XE ĐI VỚI TỐC ĐỘ**  
60 KM/H



**XE ĐI VỚI TỐC ĐỘ**  
30 KM/H



**XE ĐI VỚI TỐC ĐỘ**  
30 KM/H



**XE ĐI VỚI TỐC ĐỘ**  
30 KM/H

### Ngược hướng

Hai chiếc xe đang đi cùng tốc độ nhưng ngược chiều nhau. Vận tốc tương đối của chúng đối với nhau đều là 60 km/h.

## Cả ba định luật cùng áp dụng


Hiện tượng phóng tên lửa cho thấy định luật Newton trong thực tế. Cần phải có một lực tác động để thay đổi trạng thái chuyển động của tên lửa đứng yên (định luật thứ nhất); gia tốc của tên lửa phụ thuộc vào khối lượng của nó và lực được cung cấp bằng cách đốt nhiên liệu (định luật thứ hai); và lực đẩy của các động cơ bị kháng lại bởi một lực có độ lớn bằng nó, nhưng theo chiều ngược lại: lực cản (định luật thứ ba).

## CHUYỂN ĐỘNG HƯỚNG LÊN

## ĐỊNH LUẬT NEWTON THỨ NHẤT

**Mọi vật thể sẽ đứng yên hoặc chuyển động đều theo một đường thẳng trừ phi có một lực bên ngoài tác động lên nó**

Định luật chuyển động đầu tiên mô tả một thuộc tính của vật thể: quán tính, đó là khả năng chống lại việc thay đổi trạng thái chuyển động của nó trừ phi buộc phải làm như vậy do tác động từ một lực bên ngoài (xem trang 120-121).



**TÀU CON  
THOI MẮT  
8,5 PHÚT ĐỂ  
TĂNG TỐC  
LÊN TỐC ĐỘ  
28.000 KM/H**




## Gia tốc

Gia tốc là sự thay đổi của vận tốc và được đo bằng đơn vị m/s trên giây ( $\text{m/s}^2$ ). Đi chậm lại cũng làm xuất hiện một gia tốc, nhưng là với vận tốc đang giảm. Gia tốc được tính bằng cách lấy vận tốc ban đầu trừ đi vận tốc cuối cùng, và chia kết quả này cho biến thiên thời gian.


### Tăng tốc

Nếu chiếc xe tăng gấp đôi tốc độ trong 1 phút, gia tốc của nó có thể được tính bằng cách tìm biến thiên vận tốc ( $6 \text{ m/s}$ ) và chia cho biến thiên thời gian (60 giây). Phép tính này cho kết quả  $0,1 \text{ m/s}$  trên giây, hay  $0,1 \text{ m/s}^2$ .




### Đổi hướng

Một sự thay đổi hướng, chẳng hạn như rẽ, cũng làm thay đổi vận tốc. Bởi phải cần đến một lực để làm điều đó, rẽ là một trường hợp xuất hiện gia tốc mặc dù tốc độ không thay đổi.



### Giảm tốc

Nếu chiếc xe này giảm một nửa tốc độ trong 1 phút, gia tốc của nó sẽ là  $-0,1 \text{ m/s}^2$ . Đây là một giá trị âm vì vận tốc cuối cùng ( $6 \text{ m/s}$ ) nhỏ hơn vận tốc ban đầu ( $12 \text{ m/s}$ ).



## LƯỒNG KHÍ SAU MỘT VẬT THỂ CHUYỂN ĐỘNG

Khi một vật thể di chuyển trong không khí, nó đẩy không khí ra khỏi đường đi của mình. Không khí bị đẩy lùi tạo ra lực cản. Hiệu ứng cản có thể được giảm bớt bằng cách di chuyển vào luồng khí phía sau một vật thể chuyển động, nơi mà lực cản giảm. Điều này cho phép một chiếc xe theo sau đi với cùng một vận tốc của xe đi trước nó, nhưng sử dụng ít nhiên liệu hơn.

Xe đi sau không phải chịu nhiều lực cản bằng



## Gia tốc của vật thể phụ thuộc vào khối lượng của vật thể và lực tác dụng lên nó

Lực tác dụng lên vật càng lớn thì gia tốc của nó càng lớn. Điều này được thể hiện bằng công thức:  
 $\text{lực} = \text{khối lượng} \times \text{gia tốc}$ .

## Mọi hành động trong tự nhiên đều có một lực và một phản lực với độ lớn bằng nhau

Thuật ngữ "hành động" có nghĩa là lực được áp dụng, và "phản lực" là một lực tương đương nhưng theo hướng ngược lại. Định luật này cho thấy một lực không tự tồn tại mà là sự tương tác giữa hai đối tượng.

## Các định luật chuyển động

Tất cả các chuyển động được điều chỉnh bởi ba định luật biểu thị mối quan hệ giữa khối lượng của một vật thể, các lực tác dụng lên nó và gia tốc sinh ra. Các định luật về chuyển động được Isaac Newton công bố năm 1687. Dù chúng đủ chính xác trong hầu hết các trường hợp ứng dụng, vào năm 1905, Albert Einstein đã đưa ra giả thuyết nổi tiếng rằng các định luật Newton sẽ không còn chính xác khi vật thể đạt đến tốc độ ánh sáng (xem trang 140-141).






# Máy cơ

Máy cơ đơn giản là thiết bị biến một loại lực thành loại khác. Có sáu máy cơ đơn giản, một vài trong số đó còn chẳng giống máy móc chút nào.

## Sáu máy cơ đơn giản


Giống như hầu hết các thiết bị cơ khí, xe đạp là sự kết hợp của các máy cơ đơn giản. Một số, chẳng hạn như cơ cấu ròng rọc xích và đòn bẩy phanh, có chức năng cơ học rõ ràng. Những bộ phận khác có tính năng ít rõ ràng hơn, vì chúng được sử dụng để điều chỉnh, sửa chữa hoặc thậm chí để khiến cho việc đạp xe lên dốc dễ dàng hơn. Nhìn chung, đạp xe và bảo dưỡng xe đạp sử dụng tất cả sáu máy đơn giản: đòn bẩy, ròng rọc, bánh xe và trục quay, đinh ốc, nêm, và mặt phẳng nghiêng.

## ỐC VÍT TRÊN KHÔNG LÀ TÊN LEONARDO DA VINCI ĐẶT CHO THIẾT KẾ TRỤC THĂNG BAN ĐẦU CỦA ÔNG



### ĐINH ỐC


Ốc vít siết chặt vào rãnh đỉnh



Siết chặt ốc vít giữ chắc yên xe có thể biến đổi rất nhiều vòng quay thành một lượng nhỏ lực nên rất mạnh. Bộ phận này thực chất là một cái nêm dài hình xoắn ốc.

### NÊM

Khi sử dụng một bộ móc lốp để tách nó khỏi bánh xe là ta đang sử dụng nguyên tắc nêm. Một lực đẩy được biến thành một lực tách mạnh hơn, hoạt động trên một khoảng cách ngắn hơn.




Nêm tách lốp khỏi vành

Vành bánh xe được sử dụng làm điểm tựa

### RÒNG RỌC

Bánh xe nhỏ (líp) quay nhanh hơn



Xích xe đạp về cơ bản là một hệ thống ròng rọc - một bánh xe (đĩa) dẫn động bánh còn lại (líp) bằng cách kéo xích. Kích thước tương đối của các bánh xe giúp xác định tốc độ và công suất tương đối của chúng.

### BÁNH XE VÀ TRỤC QUAY

Vành bánh xe di chuyển nhanh hơn

Một bánh xe quay trên một trục cố định, vượt qua ma sát (xem trang 126-127) bằng cách hoạt động như một đòn bẩy. Nó chuyển đổi rất nhiều chuyển động vành thành một chuyển động quay nhỏ nhưng mạnh mẽ ở trục xe.

Trục di chuyển chậm








## Lợi thế cơ học

Tất cả các máy đều áp dụng nguyên tắc lợi thế cơ học – một biện pháp giúp khuếch đại lực. Điều này có nghĩa là chúng cho phép bạn chuyển đổi một chuyển động lớn thành một chuyển động nhỏ hơn với công suất lớn hơn, như đòn bẩy làm bật nắp của một hộp sơn. Nhưng nó cũng có thể hoạt động theo chiều ngược lại, chẳng hạn như khi một người câu cá dùng sức mạnh tác động vào cán cần câu để quãng dây câu qua một vòng cung rộng. Chuyển động nhiều hơn cho công suất ít hơn, và ngược lại.


Đi được khoảng cách ngắn hơn nhưng tạo ra nhiều công suất hơn



### Đĩa số nhỏ

Trên một chiếc xe đạp, đĩa số nhỏ hơn giúp biến chuyển động xoay của bàn đạp thành nhiều năng lượng hơn để leo dốc, đổi lại tốc độ sẽ chậm đi.

Khoảng cách đi được gấp đôi nhưng công suất ít hơn




### Đĩa số lớn

Chuyển sang đĩa số lớn hơn khi lên đến đỉnh đồi làm tăng tốc độ.

## CHÚ THÍCH

→ Lực vào    → Tải trọng (lực ra)    ● Điểm tựa

## ĐÒN BẰY



Phanh xe đạp được vận hành bởi một đòn bẩy xoay quanh một điểm tựa. Đòn bẩy phóng đại một lực nhỏ thành một lực lớn hơn, bởi vì lực ban đầu tác động ở một khoảng cách lớn hơn. Kéo phanh làm siết chặt một dây cáp, khiến cặp má phanh kẹp vào vành bánh xe.

## MẶT PHẪNG NGHIÊNG


Khoảng cách ngắn hơn lại tốn nhiều công hơn



Đi xe đạp thẳng lên tường là điều không thể. Một mặt phẳng nghiêng hoặc đường dốc sẽ giúp giải quyết vấn đề bằng cách tăng khoảng cách người đi xe đạp phải đạp.


## Phân loại đòn bẩy

Có ba loại đòn bẩy, tùy thuộc vào vị trí của tải và lực vào so với điểm tựa. Chúng có thể được chọn để làm tăng sức mạnh hoặc chuyển động, theo các hướng khác nhau.




### Đòn bẩy loại I

Tải trọng và lực vào nằm ở hai phía đối diện của điểm tựa. Ví dụ có thể kể đến là kéo và kim.



### Đòn bẩy loại II

Tải trọng nằm giữa lực vào và điểm tựa. Một ví dụ về đòn bẩy loại II là kẹp hạt dẻ.



### Đòn bẩy loại III

Lực được áp dụng giữa tải và điểm tựa, chẳng hạn như một cái kẹp gấp hoặc nhíp.

## Tỷ số truyền

Năng lượng dưới dạng lực quay, hay mô men xoắn, thường được truyền qua các bánh răng khớp vào với nhau. Nếu bánh răng lớn có số răng gấp ba lần bánh răng nhỏ, nó sẽ làm cho bánh răng nhỏ quay nhanh gấp ba lần. Nhiều bánh răng ghép với nhau tạo thành bộ truyền động bánh răng.

Bánh răng nhỏ quay nhanh hơn

## BÁNH RĂNG CHỦ ĐỘNG

### Tỷ số truyền

Bánh răng lớn điều khiển bánh răng nhỏ sẽ làm tăng tốc. Ngược lại, bánh răng nhỏ điều khiển bánh răng lớn sẽ cho công suất lớn.




# Ma sát

Ma sát là một lực đối kháng xảy ra khi hai vật hoặc chất cọ xát vào nhau, do ma sát là lực đẩy ngược hướng chuyển động. Khi một vật chuyển động qua chất lỏng hoặc khí, nó gây ra một dạng ma sát gọi là lực cản.

## Lực đối kháng

Ma sát được tạo ra khi bề mặt của hai vật liệu gặp nhau. Ở cấp độ hiển vi, các bề mặt không bao giờ là nhẵn, và các vết nứt nhỏ sẽ sượt vào nhau khi các bề mặt di chuyển ngược chiều nhau. Mỗi vết sượt tạo một lực khá nhỏ, nhưng cùng nhau, chúng cộng lại thành một lực đối kháng làm chậm hoặc dừng chuyển động. Khi hai bề mặt di chuyển cùng nhau, ma sát giữa chúng chuyển đổi động năng thành nhiệt năng.

Độ nhám có nghĩa là hai bề mặt không thể dễ dàng di chuyển qua nhau




### Chà xát

Ma sát có liên quan đến độ nhám của bề mặt. Sự tiếp xúc gần giữa các bề mặt do trọng lượng của một vật áp xuống vật kia gây ra.

Lớp nước

### BÓNG KHÚC CÔN CẦU




### Trượt nhẹ nhàng

Nước đá rất trơn trượt bởi vì có một lớp mỏng nước lỏng tách khối đá ra khỏi các bề mặt khác, nên chúng tiếp xúc rất ít với nhau, và vì thế ma sát là khá nhỏ.

## BÔI TRƠN

Ma sát giữa các bộ phận chuyển động trong máy sẽ gây ra tác động khi các bộ phận cọ xát vào nhau, làm mòn lẫn nhau. Để giảm hiệu ứng này, các bộ phận của máy cơ học thường được phủ bằng chất bôi trơn gốc dầu. Việc này tạo ra một "hàng rào trơn trượt" giữa các bề mặt và đủ dính để bao phủ các bộ phận trong một thời gian dài.

Dầu bôi trơn tạo thành một rào cản vật lý giữa các bánh răng



### HAI BÁNH RĂNG

## TÀU ĐỆM TỪ LOẠI BỎ MA SÁT GIỮA TÀU VÀ ĐƯỜNG RAY BẰNG CÁCH CHO PHÉP NÂNG CÁC TOA TÀU LÊN

### Bám chặt vào đường

Bề mặt của lớp xe gồm rất nhiều các rãnh chống trượt. Những rãnh này khiến lớp xe nhám hơn và tiếp xúc được với nhiều phần của mặt đường gồ ghề. Rãnh trên bề mặt lớp cũng ép nước ra khỏi lớp xe. Độ bám dính và biến dạng giúp lớp xe bám đường, nhưng quá nhiều lực căng có thể làm biến dạng cao su ngoài khả năng đàn hồi của nó và khiến mặt lớp sẽ rách.






## Độ bám và lực kéo

Lốp xe hơi được thiết kế để bám vào đường, tạo ra lực ma sát lớn với bề mặt đường. Ma sát này tạo ra lực kéo cho bánh xe để chúng có thể bám xuống mặt đường mỗi khi rẽ/quay đầu, đẩy xe về phía trước. Nếu không có đủ độ bám, bánh xe sẽ quay và trượt đi.

## Tăng diện tích tiếp xúc


Trọng tải nặng ép lốp xe sát xuống đường nhiều hơn, làm tăng diện tích tiếp xúc và do đó làm tăng lực ma sát.

### TẢI TRỌNG THẲNG ĐỨNG NHỎ



Ít tiếp xúc với mặt đường


### TẢI TRỌNG THẲNG ĐỨNG LỚN



Tiếp xúc nhiều hơn với bề mặt

## SỬ DỤNG MA SÁT ĐỂ TẠO RA LỬA

Một vài cách phổ biến nhất để tạo ra lửa bằng cách tạo ma sát, chẳng hạn như cạ đá lửa trên một bề mặt cứng để tạo ra tia lửa. Để tạo lửa từ một cây khoan cần cung, phải di chuyển phần cần cung nhanh chóng qua trái và phải, khiến cho trục gỗ cứng nhọn của khoan xiết mạnh vào một rãnh chứa đầy mùn của trong bàn ma sát. Nhiệt do ma sát sẽ làm cho mùn của bốc cháy.



## Giảm lực cản

Lực cản là ma sát xuất hiện khi các vật thể di chuyển qua chất lưu như nước và không khí. Cánh máy bay và thân tàu được thiết kế để giảm lực cản. Một số loại thân tàu, chẳng hạn như của tàu ba thân, có giới hạn diện tích tiếp xúc với nước. Đầu cánh máy bay điều chỉnh luồng không khí hỗn loạn để giảm lực cản.

### Xoáy đầu cánh

Đầu cánh máy bay tạo ra các xoáy trong đường bay, làm giảm hiệu quả của nhiên liệu. Việc thêm vào đầu một cánh nhỏ làm giảm kích thước của đầu cánh và do đó làm giảm lực cản.

Thân phụ cung cấp sự ổn định



TÀU BA THÂN

### Hạn chế diện tích tiếp xúc với nước

Một tàu ba thân gồm ba thân tàu nhỏ, với tổng diện tích bề mặt tương đối nhỏ để giảm lực cản.


Thân tàu được nâng lên khỏi mặt nước




TÀU CÁNH NGẦM

### Nâng bề mặt tiếp xúc

Tàu cánh ngầm sử dụng các cánh ngầm phía dưới để nâng thân tàu lên trên hần mặt nước, giảm lực cản đi đáng kể.



ĐẦU CÁNH THƯỜNG



CÁNH NHỎ CẢI TIẾN

**HƯỚNG DI CHUYỂN**

**LỐP XE** ←

**MẶT ĐƯỜNG**

Liên kết phân tử hình thành

Liên kết phân tử bị phá vỡ

Bề mặt lốp cao su chứa các phân tử có liên kết hóa học dự phòng. Khi cao su tiếp xúc với đường, nó tạo thành các liên kết yếu với mặt đường, làm cho các vật liệu dính vào nhau trong tích tắc, trước khi tách ra khi các liên kết bị phá vỡ.

**BẮM DÍNH**

**HƯỚNG DI CHUYỂN**

**LỐP XE** ←

**MẶT ĐƯỜNG**

Cao su bị biến dạng bởi các đỉnh nhỏ trên mặt đường

Lốp cao su rất linh hoạt, mặc dù nó có hình dạng xác định nhờ không khí áp suất cao bên trong. Lốp xe sẽ biến dạng dưới trọng lượng của xe, bao quanh các mảng gỗ ghề trên đường. Nó tập trung trọng lượng của xe vào các mảng này, làm tăng độ bám.

**BIẾN DẠNG**

**HƯỚNG DI CHUYỂN**

**LỐP XE** ←

**MẶT ĐƯỜNG**

Cao su rách

Cao su có thể bị kéo dẫn và nén lại mà không bị thay đổi hoặc vỡ. Tuy nhiên, các lực mạnh vẫn có thể xé rách bề mặt lốp xe, làm giảm dần khả năng biến dạng của nó. Cuối cùng, ta vẫn cần thay thế lốp xe hoặc nó sẽ nổ tung.

**RÁCH**



# Lò xo và con lắc

Lò xo là một vật thể đàn hồi có thể trở về vị trí ban đầu sau khi nó bị nén hoặc kéo. Nó chịu tác động từ một lực gọi là lực đàn hồi, một khía cạnh quan trọng của dao động điều hòa đơn giản, trong đó một khối lượng di chuyển, hoặc dao động, xung quanh một điểm trung tâm. Đây là một điểm chung giữa chuyển động lò xo và chuyển động con lắc.


## LÒ XO CÓ Ở Đâu TRONG NHÀ CỦA CHÚNG TA?

Chúng ta sử dụng lò xo trong hàng trăm vật dụng hằng ngày mà chẳng hề nhận ra nó, từ nệm và đồng hồ đến công tắc đèn, máy hút bụi và bản lề cửa.

### CHÚ THÍCH

-  Trọng lực
-  Lực đàn hồi

**VỊ TRÍ BẮT ĐẦU  
VẬN TỐC = 0  
LỰC ĐÀN HỒI = TỐI ĐA**




Lực đàn hồi đã kéo ghế đủ dừng lại trong một khoảnh khắc trước khi nó di chuyển về phía trung tâm; tại vị trí này, vận tốc bằng không và lực đàn hồi ở mức tối đa

Dao động trong một chuyển động con lắc xoay quanh điểm trục trung tâm này

**ĐIỂM TRUNG TÂM**

Chiếc ghế đủ đang tăng tốc về phía trung tâm, tăng tốc nhanh hơn khi đến gần



### Chuyển động của con lắc

Trong trường hợp đu quay ở sân chơi, tương tự với bất kỳ con lắc nào, lực đàn hồi là kết hợp của trọng lực kéo xuống và lực căng của dây xích gắn ghế đu vào một điểm trung tâm. Một dao động đầy đủ tạo ra vận tốc trung bình bằng 0 vì vật sẽ trở về điểm cân bằng.


### Dao động

Một dao động là chuyển động lặp đi lặp lại xung quanh một điểm trung tâm. Vật dao động vì một lực – lực đàn hồi – kéo vật trở lại điểm trung tâm. Tại điểm này, hệ thống cân bằng. Ví dụ về dao động bao gồm một con lắc chuyển động và một vật được móc vào lò xo. Trong cả hai trường hợp, chuyển động gồm tăng tốc và giảm tốc đều đặn.

Tại điểm cân bằng, trọng lực và lực căng của ghế đu được cân bằng, do đó lực đàn hồi biến mất; ghế đu tiếp tục di chuyển sang phải

**TRỌNG LỰC**

**ĐIỂM CÂN BẰNG  
VẬN TỐC = TỐI ĐA  
LỰC ĐÀN HỒI = 0**









## Lực đàn hồi

Lò xo là một vật thể đặc biệt đàn hồi, có nghĩa là nó có thể thay đổi hình dạng tạm thời trước khi trở lại hình dạng ban đầu. Khi một khối lượng kéo nó, lò xo sẽ giãn ra. Phần giãn tạo ra một lực đàn hồi lên lò xo, kéo nó trở lại hình dạng ban đầu. Khi lực đàn hồi bằng với lực làm biến dạng lò xo, nó sẽ ngưng giãn.




### Trạng thái nghỉ

Khối lượng ở một đầu của lò xo không tác động lực lên nó. Đây được gọi là điểm cân bằng.




### Lực kéo

Di chuyển khối lượng tạo ra một lực đàn hồi tác động lên lò xo, kéo nó trở lại điểm cân bằng.



### Lực nén

Đẩy lò xo và thả ra khiến lò xo vượt quá điểm cân bằng, nhưng lực đàn hồi đã kéo nó trở lại.




VỊ TRÍ CAO NHẤT  
VẬN TỐC = 0  
LỰC ĐÀN HỒI = TỐI ĐA

**1.353 M**  
LÀ CHIỀU DÀI  
CỦA CON LẮC DÀI  
NHẤT THẾ GIỚI



## Biến dạng

Một số lực có thể làm thay đổi hình dạng của vật liệu. Đầu tiên, một lực kéo sẽ gây biến dạng đàn hồi. Khi lực được loại bỏ, một lực đàn hồi sẽ kéo nó trở lại hình dạng ban đầu. Nếu lực kéo tiếp tục tăng, vật liệu sẽ vượt quá giới hạn đàn hồi của nó, đến lúc ấy, bất kỳ sự thay đổi hình dạng nào cũng sẽ là vĩnh viễn.



## Mô đun Young

Các kỹ sư cần phải biết độ cứng của một chất để họ có thể tìm cách áp dụng nó trong ngành xây dựng. Độ đàn hồi của một chất được thể hiện bằng mô đun Young của nó, đại lượng biểu thị lực cần thiết để làm biến dạng nó. Mô đun Young được đo bằng pascal, đơn vị đo áp suất. Mô đun Young cao cho biết một vật liệu rất cứng và hầu như không thay đổi hình dạng khi kéo giãn. Giá trị thấp của đại lượng này cho thấy một chất có thể trải qua biến dạng đàn hồi lớn.

Chất liệu	Mô đun Young (pascal)
Cao su	0,01-0,1
Gỗ	11
Bê tông cường độ cao	30
Nhôm	69
Vàng	78
Thủy tinh	80
Men răng	83
Đồng	117
Thép không gỉ	215,3
Kim cương	1.050-1.210




# Áp suất

Áp suất là lực tác dụng lên một bề mặt chia cho diện tích bề mặt đó. Áp lực có thể tác dụng lên, hoặc gây ra bởi bất kỳ vật thể nào, bao gồm cả nước và không khí.



## Áp suất chất khí

Khí lực tác dụng, một khí sẽ được nén lại thành một thể tích nhỏ hơn. Các phân tử được ép chặt hơn vào với nhau, cho đến khi chúng ngừng hoạt động như các phân tử khí và biến thành chất lỏng. Đây là lý do tại sao một xi lanh khí điều áp chắc chắn có chứa chất lỏng. Giảm áp suất bằng cách mở van cho phép chất lỏng chuyển trở lại thành khí.



## NỒI ÁP SUẤT HOẠT ĐỘNG THE NÀO?

Ở áp suất khí quyển, nước sôi ở 100°C. Hơi nước tạo thành trong quá trình này thường thoát ra ngoài, nhưng nồi áp suất sẽ giữ nó lại, làm tăng áp suất. Điều này làm tăng điểm sôi của nước đồng thời làm tăng nhiệt độ, giúp nấu thức ăn nhanh hơn.






## Áp suất chất lỏng

Khác với chất khí, rất khó để nén chất lỏng thành một thể tích nhỏ hơn. Bất kỳ áp lực nào tác dụng lên một chất lỏng cũng sẽ truyền qua nó. Ví dụ, nếu một chất lỏng chảy trong một đường ống, áp lực ở một đầu sẽ được truyền đến tận đầu bên kia của ống. Áp suất tăng theo độ sâu do trọng lượng của nước bên trên nó, đó là lý do tại sao đập nước phải dày hơn ở phần đáy. Áp suất cũng bị ảnh hưởng bởi mật độ khối lượng (khối lượng riêng). Chất lỏng càng đặc, áp suất càng cao.


### Cái xô bị rò rỉ

Sự gia tăng áp suất theo độ sâu có thể được minh họa bằng tốc độ nước rò rỉ từ ba lỗ có kích thước giống hệt nhau trên một cái xô.



## THỦY LỰC HỌC

Khả năng gần như không thể bị nén của chất lỏng cho phép chúng truyền áp suất qua mạng lưới đường ống để vận hành máy móc. Bằng cách sử dụng một đường ống để liên kết một xi lanh bơm với một cơ cấu nâng có điện tích gấp đôi, lực tác dụng sẽ tăng gấp đôi, mặc dù áp suất vẫn giữ nguyên.



— 1.500 M

— 3.000 M

— 4.500 M

— 6.000 M

— 7.500 M

— 9.000 M

— 11.000 M



**ÁP SUẤT Ở VỰC THÂM CHALLENGER CAO GẤP 1.099 LẦN ÁP SUẤT Ở MỨC NƯỚC BIỂN**

**VỰC THÂM CHALLENGER, ĐIỂM SÂU NHẤT TRONG ĐẠI DƯƠNG**

**CÁ ỐC, HỌ CÁ LẶN SÂU NHẤT**

**702 ATM**

**ĐỘ SÂU TỐI ĐA CỦA TÀU NGẦM TỰ ĐỘNG**

**605 ATM**

**ĐỘNG VẬT CÓ VÚ CÓ KHẢ NĂNG LẶN SÂU NHẤT, CÁ VOI MỒM KHOẢM CUVIER**

**298 ATM**

**TÀN TÍCH CỦA TÀU TITANIC**

**363 ATM**

**1.099 ATM**

**NĂNG LƯỢNG VÀ LỰC**  
Áp suất

**130 / 131**






# Bay lượn

Công nghệ bay sử dụng hai nguyên tắc rất khác nhau. Bong bóng và khí cầu hoạt động dựa trên sự thật rằng không khí hoặc chất khí, như hydro và heli, khi nóng sẽ bay lên trên. Trong khi đó, tất cả các máy bay phụ thuộc vào lực nâng từ cánh hoặc cánh quạt.


## Nhẹ hơn không khí

Một quả bóng bay bình thường có thể bay lên bầu trời vì nó chứa đầy một loại khí nhẹ hơn không khí bên ngoài nó. Hầu hết các khí cầu có người lái bay lên bằng cách làm nóng không khí khiến nó nở ra; việc này làm cho không khí bớt đặc hơn và do đó nhẹ hơn không khí mát. Khí cầu thường chứa hydro hoặc heli. Heli cũng được sử dụng để thổi phồng bóng bay. Hydro nhẹ gấp đôi so với heli nhưng cực kỳ dễ cháy, còn heli thì không dễ cháy.





### Lực nâng trong khinh khí cầu

Khi không khí được làm nóng, các phân tử của nó di chuyển ra xa nhau, và khí giãn nở. Vì có số phân tử khí trong cùng một thể tích thấp hơn, không khí bên trong khinh khí cầu ít đặc hơn.



## Chuyến bay sử dụng nhiên liệu

Máy bay cánh cố định và máy bay trực thăng nặng hơn không khí. Chúng hoạt động bằng cách sử dụng chuyển động của các cánh hoặc cánh quạt được định hình đặc biệt để làm lệch hướng không khí, giảm áp suất phía trên chúng. Góc giữa cánh và luồng khí tới - góc tấn - là rất quan trọng. Để cất cánh, cánh tà sau phải được mở rộng để tăng góc tấn và độ cong của cánh, mang lại lực nâng tối đa có thể.



### 1 Chuẩn bị cất cánh

Một chiếc máy bay dựa vào chuyển động về phía trước để đẩy không khí trên đôi cánh của nó và tạo lực nâng để cất cánh. Nó sử dụng một động cơ mạnh mẽ để tăng tốc, trong khi các cánh tà sau có thể điều chỉnh giúp tăng lực nâng ở tốc độ thấp.

### 2 Nguyên lý Bernoulli

Áp suất thay đổi tùy thuộc vào chuyển động của môi trường - đây được gọi là Nguyên lý Bernoulli. Mặt trên của cánh có đường cong dài hơn mặt đáy, do đó không khí chảy nhanh hơn trên nó. Điều này làm giảm áp suất phía trên cánh, tạo thành lực nâng.



# CÓ KHOẢNG 9.250 MÁY BAY CHỜ KHÁCH ĐANG Ở TRÊN KHÔNG TẠI BẤT KỲ THỜI ĐIỂM NÀO



LỰC NÂNG

Cánh tà sau được sử dụng để tăng lực nâng khi cất cánh và tăng lực cản để làm chậm máy bay khi hạ cánh; khi bay trong không trung, chúng sẽ được thu lại

Cánh quạt đẩy máy bay về phía trước bằng cách đẩy một khối không khí về phía sau nó

LỰC ĐẨY

TRỌNG LỰC

## 3 Bay

Lực nâng do cánh cung cấp sẽ triệt tiêu trọng lực, nhưng chỉ khi lực đẩy từ động cơ giữ cho máy bay di chuyển đủ nhanh. Lực đẩy này cũng phải vượt qua lực cản tạo ra bởi chính lực nâng.

## ĐÂY LÀ MÁY BAY NẶNG NHẤT TỪNG CẤT CẢNH?

Máy bay chở hàng Antonov An-225 được sản xuất vào năm 1985. Nó có trọng lượng tối đa 640 tấn và được trang bị sáu động cơ phản lực.

## MÁY BAY TRỰC THĂNG CẤT CẢNH NHƯ THẾ NÀO?

Cánh quạt quay nhanh của máy bay trực thăng tạo ra lực nâng giữ nó trong không khí. Di chuyển bộ điều khiển, được gọi là cần, làm thay đổi góc của các cánh quạt, đẩy trực thăng lên không trung.

Nghiêng các tấm chắn cũng làm các cánh quạt chúc xuống, tăng góc tấn và tăng lực nâng

CẦN  
ĐIỀU  
KHIỂN

CHUYỂN ĐỘNG



Cuối cùng, lực nâng không cân bằng làm cho máy bay trực thăng nghiêng và bắt đầu cất cánh

Đầu tiên, phi công di chuyển cần điều khiển về phía trước để nghiêng các tấm chắn về phía trước

132 / 133

## Đường Kármán

Mật độ khí giảm dần theo độ cao. Điều này làm giảm lực cản, cho phép máy bay bay nhanh hơn, nhưng nó cũng buộc máy bay phải bay nhanh hơn để tạo lực nâng. Trên độ cao 100 km, được gọi là Đường Kármán, việc dùng lực nâng của khí để hỗ trợ máy bay là không thể. Đường Kármán được coi là ranh giới giữa khí quyển Trái Đất và không gian.

## TẦNG NHIỆT 80-600 km

### Vào quỹ đạo

Để tiếp tục bay phía trên đường Kármán, một vật thể phải di chuyển với vận tốc quỹ đạo - tốc độ mà lực ly tâm triệt tiêu trọng lực (xem trang 214-215).

29.000 km/h

## ĐƯỜNG KÁRMÁN 100 km

Tốc độ mà một chiếc máy bay cần phải duy trì để tiếp tục bay trên cao.

## TẦNG TRUNG LƯU 50-80 km

## TẦNG BÌNH LƯU 16-50 km

Tốc độ mà một máy bay thương mại cần phải duy trì để bay ở độ cao 12 km

## TẦNG ĐỐI LƯU 0-16 km

900 km/h





## TẠI SAO ARCHIMEDES LẠI HẾT LÊN “EUREKA”?

Ông phát hiện ra rằng các vật thể nặng hơn nước sẽ thay thế thể tích nước vừa bằng thể tích của chúng - phát hiện này rất hữu ích trong việc đo thể tích của các vật thể có hình dạng bất kỳ.

### Sự chìm

Một khối thép rắn có khối lượng riêng cao hơn tám lần so với nước. Khi một khối thép 5.000 tấn chìm xuống, nó thay thế một thể tích nước, nhưng lượng nước đó chỉ nặng khoảng 625 tấn. Trọng lượng của nước tác động một lực nổi nhỏ lên khối thép, nhưng nó không thể chống lại lực từ trọng lượng của thép, vì vậy khối thép vẫn tiếp tục chìm xuống.

Lực nổi là 625 tấn - không đủ để ngăn chặn khối thép khỏi chìm

### TRỌNG LƯỢNG




### LỰC NỔI

Khối thép nhỏ và đặc, không hề có túi khí bên trong

Khối thép chìm

Lực hướng xuống dưới là trọng lượng 5.000 tấn

### TRỌNG LƯỢNG



Không khí bên trong con tàu làm cho nó ít đặc hơn nước.

Nước tác dụng lên trọng lượng tàu một lực nổi tương đương 5.000 tấn

### Sự nổi

Một con tàu chở hàng bằng thép chứa đầy không khí bên trong, và do đó khối lượng riêng tổng thể của nó nhỏ hơn nước. Nó thay thế toàn bộ trọng lượng 5.000 tấn và nổi lên nhờ lực đẩy của 5.000 tấn nước trong đại dương.

# Lực nổi


Lực nổi là một lực hướng lên trên, do chất lỏng và chất khí tác động lên chất rắn. Tuy nhiên, lực nổi có liên hệ với khối lượng riêng. Nếu một vật thể quá đặc, lực nổi sẽ không đủ để ngăn chặn nó chìm xuống.

## Lực nổi là gì?

Khi được đặt trong chất lưu - chất lỏng hoặc chất khí - vật thể sẽ đẩy sang một bên, hoặc thay thế, một thể tích chất lưu bằng thể tích của chính nó. Nếu vật thể đặc hơn chất lưu, thể tích dịch chuyển sẽ có khối lượng nhỏ hơn khối lượng của chính vật thể, do đó vật thể sẽ chìm xuống. Nhưng một vật thể có khối lượng riêng thấp hơn chất lưu sẽ nổi, vì lực nổi sẽ cân bằng trọng lượng của nó.


## BONG BÓNG CÁ

Giống như tàu ngầm, một số loài cá nổi trong nước bằng cách giải phóng các khí hòa tan trong máu, qua các tuyến khí, vào bong bóng cá. Điều này làm tăng thể tích của bóng khí, làm cho cá bớt “đặc” hơn và khiến nó nổi lên. Nếu muốn chìm, khí được hòa tan vào trong máu một lần nữa, làm cho bóng khí co lại.



Bong bóng cá






## Trọng lượng và mật độ khối lượng


Khi hàng hóa được chất lên tàu, phần không gian phía trên của nó chứa đầy hàng hóa nặng hơn không khí và do đó mật độ khối lượng tổng thể của nó tăng lên. Mỗi khi có một món hàng được chất lên, con tàu lại chìm sâu hơn dưới nước, vì trọng lượng lớn hơn của nó sẽ đẩy nhiều nước hơn sang một bên, cho đến khi đạt được trạng thái cân bằng mới giữa trọng lượng và lực nổi. Mức nước cho tải trọng an toàn cao nhất – gọi là đường Plimsoll – thường được vẽ trên thân tàu.

## TẤT CẢ CÁC VẬT THỂ NỔI THAY THẾ MỘT THỂ TÍCH NƯỚC BẰNG THỂ TÍCH CỦA NÓ



## Tàu ngầm

Để lặn sâu và nổi lên theo ý muốn, các tàu ngầm kiểm soát mật độ khối lượng trung bình của chúng bằng cách sử dụng các thùng chứa khí nén. Miễn là có nguồn năng lượng, tàu ngầm có thể làm điều này vô thời hạn bởi vì khi nổi lên mặt nước, tàu ngầm có thể bơm không khí mới từ khí quyển và nén nó vào bể chứa để sẵn sàng cho lần nổi lên tiếp theo.



### 1 Trên mặt nước

Một tàu ngầm có một bể chứa trung tâm chứa khí nén. Các bể khác, được gọi là bể dẫn, nằm trong một lớp giống như một lớp "áo khoác" giữa vỏ bên trong và bên ngoài của tàu ngầm.

### 2 Lặn xuống

Để lặn xuống, một chiếc tàu ngầm chỉ cần cho nước chảy vào bể dẫn. Nước sẽ thay thế phần không khí không bị nén. Mật độ khối lượng tổng thể của tàu ngầm tăng lên, làm cho nó nặng hơn nước, do đó nó chìm.

### 3 Ở độ sâu nhất định

Tàu ngầm phải cân bằng lượng nước và không khí trong các bể để không bị chìm sâu hơn mức mong muốn.

### 4 Nổi lên

Để nổi lên, một tàu ngầm tăng lực nổi bằng cách giải phóng khí nén vào bể dẫn, đẩy nước ra ngoài. Mật độ khối lượng tổng thể của tàu ngầm giảm xuống thấp hơn nước và tàu nổi lên.




# Chân không

Chân không hoàn hảo là một vùng không gian trống rỗng, không chứa bất kỳ loại vật liệu nào. Điều này chưa bao giờ được quan sát thấy trong thực tế – ngay cả không gian bên ngoài vũ trụ cũng chứa một số vật chất nhất định, tạo ra một áp suất có thể đo được – vì vậy chân không trong thế giới thực được gọi là chân không một phần.

## Chân không là gì?

Từ thế kỷ 17, người ta đã có thể tạo ra một chân không bằng cách dùng máy bơm hút không khí ra khỏi vật chứa. Các thí nghiệm cho thấy lửa tắt và âm thanh không thể đi qua nó, bởi vì âm thanh cần một môi trường, như không khí, để truyền qua. Ánh sáng không cần môi trường nên có thể đi qua chân không.



### Ngọn lửa trong không khí

Một ngọn nến cháy bên trong một vật chứa đầy không khí. Oxy trong không khí phản ứng với sáp để giải phóng nhiệt và ánh sáng.


### Ngọn lửa tắt

Hút không khí ra để tạo chân không dẫn đến việc lửa tắt. Điều này là do quá trình đốt cháy cần có oxy.

Môi trường	Áp lực (pascal)	Số phân tử trên mỗi cm khối
Không khí chuẩn	101.325	$2,5 \times 10^{19}$
Máy hút bụi	Khoảng 80.000	$1 \times 10^{19}$
Tầng nhiệt của Trái Đất	$1-0,00000007$	$10^7-10^{14}$
Bề mặt Mặt Trăng	$1-0,0000000009$	400.000
Không gian liên hành tinh		11
Không gian liên thiên hà		0,000006

## BÌNH GIỮ NHIỆT CHÂN KHÔNG HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Một bình giữ nhiệt chân không sử dụng chân không để ngăn chất lỏng nóng nguội đi và ngăn chất lỏng lạnh nóng lên. Chất lỏng nằm trong ngăn chứa được bao quanh bởi chân không, ngăn chặn dòng đối lưu truyền nhiệt ra bên ngoài. Bình được mạ bạc ở cả hai mặt để phản xạ nhiệt trở lại bên trong và phản xạ nhiệt ra bên ngoài.





## Bên trong chân không

Vật liệu sẽ luôn lan ra để lấp đầy bất kỳ khoảng trống nào. Quá trình này là nền tảng cho việc tạo ra “vòi hút” trong một máy hút bụi, bởi vì không khí từ bên ngoài sẽ tràn vào chân không được tạo ra bên trong. Các phân tử trong vật liệu được đặt trong chân không, đặc biệt là phân tử chất lỏng, cũng sẽ phá vỡ các liên kết của chúng để tạo thành một loại khí lấp đầy khoảng trống rỗng đó.


### Không có lực cản

Các vật thể rơi trong chân không sẽ không gặp phải sức cản không khí, vốn sẽ làm chậm vận tốc rơi của chúng. Một cái búa và một chiếc lông vũ sẽ rơi ở các tốc độ khác nhau trong không khí, nhưng chúng lao thẳng xuống cùng lúc trong chân không.



### Chân không hoàn hảo

Khi tiếp xúc với chân không, các phân tử nước trở thành hơi, lấp đầy không gian. Rất ít trong số chúng chuyển trở lại thành chất lỏng.



### Chân không một phần

Nước bay hơi, làm tăng áp suất. Hệ thống đạt đến trạng thái cân bằng khi các phân tử nước di chuyển đều theo cả hai hướng.





## Tiếp xúc với chân không

Không gian vũ trụ là một khoảng chân không gần hoàn hảo. Phi hành gia đi bộ trong không gian không chỉ buộc phải mặc đồ bảo hộ để bảo vệ họ khỏi bức xạ, ánh sáng mặt trời và sự lạnh lẽo của không gian trống, mà còn để tạo ra một bầu không khí với áp suất xung quanh cơ thể. Nếu bộ đồ hoặc tấm che mặt bị hư hại, một cái chết tức khắc là điều gần như chắc chắn, nhưng nó sẽ không kịch tính như thường được mô tả trong phim khoa học viễn tưởng.




**GẤU NƯỚC LÀ LOẠI ĐỘNG VẬT CỰC NHỎ CÓ THỂ TỒN TẠI TRONG CHÂN KHÔNG VŨ TRỤ**

### Thiếu oxy nghiêm trọng

3


Trong chân không, oxy sẽ thoát ra khỏi máu, khiến các mô cơ thể bị thiếu hụt nguồn oxy.



### Khô kiệt nước

2


Bất kỳ loại nước nào tiếp xúc với chân không cũng sẽ bay hơi trong vài giây. Mắt cũng như niêm mạc miệng và mũi sẽ khô lại, sương giá bắt đầu hình thành trên da.



### Khí thoát ra nhanh chóng

1

Các khí bên trong phổi và ruột sẽ ào ra khỏi các lỗ trên cơ thể để tràn vào chân không, gây tổn thương cho các mô tế bào.



### Cái chết

4


Không có oxy trong não, phi hành gia sẽ bất tỉnh sau khoảng 15 giây. Não sẽ chết trong vòng 90 giây nếu không được cung cấp oxy.



### Cơ thể giãn nở

5


Cơ thể sẽ bắt đầu bị phá vỡ, giải phóng chất lỏng và khí làm nó phồng lên gấp đôi kích thước.



### Cơ thể đông lạnh

6

Sau vài giờ tiếp xúc với chân không, cơ thể sẽ nguội dần xuống dưới điểm đóng băng của nước và nó hoàn toàn trở thành chất rắn.






# Trọng lực

Chúng ta có thể xem trọng lực là một lực hấp dẫn. Nó kéo các vật thể rơi xuống đất và giữ Trái Đất trong một quỹ đạo quay quanh Mặt Trời. Isaac Newton lần đầu tiên mô tả lực hấp dẫn bằng toán học vào thế kỷ 17.


## Đặc điểm của trọng lực

Trọng lực là một lực hấp dẫn kéo vật chất lại với nhau. Như được trình bày trong định luật vạn vật hấp dẫn của Newton, cường độ của lực hấp dẫn phụ thuộc vào hai yếu tố: khối lượng của các vật thể có liên quan và khoảng cách giữa chúng. Trọng lực là lực yếu nhất trong bốn lực cơ bản của tự nhiên (xem trang 27). Tuy nhiên, các khối lượng siêu lớn như sao và thiên hà vẫn tạo ra một lực hấp dẫn lớn đủ khả năng hoạt động trên một khoảng cách dài.



### Trọng lực và khối lượng

Giả sử khoảng cách (D) giữa hai vật giữ nguyên, trọng lực (F) tỷ lệ thuận với khối lượng (M) của chúng. Nhân đôi khối lượng của một vật (2M) làm nhân đôi lực hút (2F) giữa các vật. Nhân đôi khối lượng của cả hai vật làm tăng lực kéo gấp bốn (4F).



### Trọng lực và khoảng cách

Trọng lực tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách (D) giữa hai vật thể, giả sử khối lượng của các vật vẫn giữ nguyên. Nhân đôi khoảng cách (2D) làm giảm lực hấp dẫn gấp bốn ( $\frac{1}{4}F$ ). Giảm một nửa khoảng cách ( $\frac{1}{2}D$ ) làm lực hấp dẫn tăng gấp bốn (4F).

## Vận tốc cuối

Trọng lực làm cho các vật đang rơi xuống tăng tốc, đạt tới vận tốc lớn hơn khi chúng gần mặt đất hơn. Tuy nhiên, các vật rơi trong một thời gian dài sẽ đạt vận tốc tối đa, hoặc vận tốc cuối. Điều này xảy ra khi lực kéo của trọng lực bằng với lực cản hướng lên của không khí.



## LỰC G LÀ GÌ?

Lực G là một sự thay đổi trong chuyển động của vật thể, có thể khiến một người cảm thấy nặng nề hơn khi họ tăng tốc. Trọng lực khi một người đứng trên mặt đất là 1 g (với g là gia tốc trọng trường).



## TĂNG TỐC

0 1 2 3 4 5 6 7 8




## Trọng lực và sức cản không khí


Người nhảy dù tăng tốc ở mức 9,8 m/s trên giây - gia tốc của tất cả các vật rơi. Khi anh tăng tốc, lực cản không khí tác dụng lên cơ thể anh cũng tăng lên.



## BÓNG NHẸ



## BÓNG NẶNG



## Khối lượng và trọng lượng



Khi mô tả các vật thể trên Trái Đất, khối lượng và trọng lượng là các thuật ngữ có thể hoán đổi cho nhau. Tuy nhiên, khối lượng là một thước đo độc lập để xác định chất liệu và năng lượng trong một vật thể, trong khi đó trọng lượng là lực tác dụng lên một khối lượng bởi trường hấp dẫn của Trái Đất.

## Hạ cánh đồng thời

Một quả bóng nhẹ và một quả bóng nặng rơi (tăng tốc) với cùng tốc độ. Trọng lực tác dụng trên quả bóng nặng lớn hơn, bởi vì lực này tỷ lệ thuận với khối lượng. Lực lớn hơn này khiến quả bóng nặng tăng tốc nhanh bằng quả bóng nhẹ.

## CÂN NẶNG CỦA CHÚNG TA THAY ĐỔI THẾ NÀO TRÊN CÁC HÀNH TINH KHÁC?

Mặc dù khối lượng vật thể vẫn giữ nguyên, trọng lượng của nó phụ thuộc vào lực hấp dẫn, thay đổi từ hành tinh này sang hành tinh khác. Trên các hành tinh nhỏ hơn, một người sẽ nhẹ hơn so với khi ở trên Trái Đất, nhưng họ sẽ nặng hơn nhiều khi ở trên các hành tinh lớn hơn, như Sao Mộc.





# Thuyết tương đối hẹp

Năm 1905, Albert Einstein đã đề xuất một cách hiểu mang tính cách mạng về cách thức chuyển động, không gian và thời gian có liên hệ với nhau. Ông gọi đó là thuyết tương đối hẹp (thuyết tương đối đặc biệt) và mục đích của nó là giải quyết câu hỏi lớn nhất đối với ngành vật lý thời bấy giờ – mâu thuẫn giữa cách mà ánh sáng và vật thể di chuyển trong không gian.

## Các định luật mâu thuẫn

Định luật về chuyển động nói rằng vận tốc của mọi vật thể đều là tương đối so với chuyển động của các vật thể khác. Tuy nhiên, theo quy luật của điện từ học, ánh sáng truyền đi với tốc độ cố định. Ánh sáng luôn đến mắt một người quan sát ở tốc độ nhất định, cho dù nguồn sáng là tĩnh, di chuyển về phía người quan sát, hay di chuyển ra xa người ấy.

### CHÙM ÁNH SÁNG

Tốc độ ánh sáng là không đổi đối với cả ba người quan sát

Vận tốc tương đối của các xe là khác nhau đối với một người đứng yên và hai người lái xe



50 km/h

#### Câu hỏi cần phải trả lời

Hai xe hơi chuyển động có vận tốc tương đối phụ thuộc vào vị trí của người quan sát. Vậy tại sao vận tốc ánh sáng lại không thay đổi theo vận tốc của người quan sát?




60 km/h

## CO NGẮN CHIỀU DÀI

Tương tự việc chậm lại trong thời gian, không gian xung quanh một vật thể chuyển động cũng co lại. Ta không thể đo lường được sự co lại này bởi vì các thiết bị đo cũng sẽ co lại theo cùng một lượng. Khi vật thể tiến gần đến tốc độ ánh sáng, không gian bị co lại theo điểm nhìn của người quan sát và thời gian giãn ra cực đại, vật thể dường như ngừng di chuyển hoàn toàn.


TIỆM CẬN TỐC ĐỘ ÁNH SÁNG



Quả bóng đứng yên có dạng hình tròn đều



Khi được quan sát bởi một người đứng yên, quả bóng co lại theo hướng di chuyển khi nó tiến gần hơn đến tốc độ ánh sáng



## Thời gian giãn nở

Einstein đã giải thích mâu thuẫn giữa vận tốc ánh sáng và vận tốc của các vật thể khác bằng cách đưa ra giả thuyết rằng: khi một vật thể di chuyển nhanh hơn trong không gian, nó cũng di chuyển chậm hơn theo thời gian. Điều này có nghĩa là thời gian trôi qua với tốc độ khác nhau đối với người quan sát di chuyển ở vận tốc khác nhau. Đối với người quan sát đứng yên, thời gian di chuyển nhanh hơn so với người quan sát di chuyển gần với tốc độ ánh sáng.

### Giải thích tốc độ không đổi của ánh sáng

Bên trong một con tàu vũ trụ di chuyển với tốc độ gần bằng ánh sáng, một phi hành gia sử dụng đồng hồ để đo tốc độ ánh sáng sẽ thấy rằng ánh sáng truyền đi một khoảng cách tương đối ngắn trong một thời gian ngắn. Đối với một người quan sát đứng yên, ánh sáng di chuyển một khoảng cách xa hơn trong một thời gian dài hơn. Nhưng cả hai nhà quan sát đều đo được rằng ánh sáng di chuyển với cùng tốc độ.

Phi hành gia ở trong cùng một con tàu vũ trụ với ánh sáng truyền đi theo cùng một cách

Chùm tia đi từ trần xuống sàn theo một đường thẳng đứng

Sử dụng đồng hồ có độ chính xác cao, một phi hành gia đo thời gian cần thiết để một chùm ánh sáng truyền từ trần xuống sàn tàu vũ trụ của anh ta

ĐIỂM NHÌN CỦA PHI HÀNH GIA





## Khối lượng và năng lượng

Khi Einstein suy nghĩ về cách ánh sáng luôn truyền đi với một tốc độ cố định, ông cũng đồng thời kiểm tra bản chất của khối lượng và năng lượng. Ông nhận ra rằng khối lượng và năng lượng tỷ lệ thuận với nhau theo phương trình nổi tiếng  $E = mc^2$ , trong đó  $E$  là năng lượng,  $m$  là khối lượng và  $c$  là tốc độ ánh sáng. Thêm năng lượng cho một vật thể đứng yên có thể làm cho nó di chuyển. Vì năng lượng và khối lượng có liên hệ tỷ lệ thuận với nhau, chuyển động làm cho vật thể trở nên nặng hơn so với khi nó đứng yên. Ở tốc độ thấp, hiệu ứng này không đáng kể, nhưng ở tốc độ gần với tốc độ ánh sáng, một vật thể có khối lượng tiệm cận mức vô hạn.

$$E = mc^2$$

Năng lượng bị khóa vào vật chất dưới dạng khối lượng là rất lớn – trong các vụ nổ hạt nhân, một lượng nhỏ khối lượng được chuyển đổi thành một lượng cực lớn năng lượng dưới dạng nhiệt và ánh sáng


Khối lượng là một thuộc tính của vật chất, mô tả khả năng chống lại sự thay đổi trong chuyển động của nó; khối lượng càng lớn, năng lượng có thể được giải phóng càng nhiều

Ánh sáng được mang theo bởi các hạt không có khối lượng, và do đó nó di chuyển với tốc độ nhanh nhất có thể – tốc độ ánh sáng

### KHÁI NIỆM “THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP” ĐƯỢC ĐỀ CẬP LẦN ĐẦU TIÊN VÀO KHI NÀO?

Einstein chỉ mô tả lý thuyết của mình theo cách này 10 năm sau khi công trình của ông được xuất bản, để phân biệt với thuyết tương đối rộng của ông. Bài báo ban đầu có tên gọi “Về điện động lực của các vật thể chuyển động”.


### TÀU DI CHUYỂN GẦN TỐC ĐỘ ÁNH SÁNG



#### Nhận thức về chuyển động từ bên ngoài


Hoạt động bên trong tàu vũ trụ tăng tốc sẽ hiện lên khác trong mắt của một người quan sát từ một khung tham chiếu khác, chẳng hạn như bề mặt Trái Đất. Đối với người quan sát trên Trái Đất, chùm ánh sáng vạch ra một đường chéo thay vì đường thẳng đứng.

#### ĐIỂM NHÌN CỦA NGƯỜI QUAN SÁT TỪ TRÁI ĐẤT



Đồng hồ trong khung tham chiếu di chuyển chậm hơn so với đồng hồ trong khung tham chiếu đứng yên

CÁC KẾT QUẢ ĐO  
TỐC ĐỘ ÁNH SÁNG BAN  
ĐẦU, ĐƯỢC THỰC HIỆN  
VÀO THẾ  
KỶ 17, THẤP  
HƠN CON SỐ  
CHÍNH XÁC



KHOẢNG 26%



# Thuyết tương đối rộng

Lực hấp dẫn, theo định nghĩa của Isaac Newton vào năm 1687, dường như không tương thích với thuyết tương đối hẹp của Albert Einstein. Vì vậy, vào năm 1916, Einstein đã thống nhất lực hấp dẫn và những ý tưởng tương đối của ông về không gian và thời gian trong thuyết tương đối rộng.


## Không-thời gian

Thuyết tương đối hẹp mô tả cách các đối tượng trải nghiệm không gian và thời gian khác nhau, tùy thuộc vào chuyển động của chúng. Một hàm ý quan trọng của thuyết tương đối hẹp là không gian và thời gian luôn luôn liên kết với nhau. Thuyết tương đối rộng mô tả chúng trong một hệ liên tục bốn chiều được gọi là không-thời gian, bị các vật thể lớn làm cho biến dạng. Khối lượng và năng lượng tỷ lệ thuận với nhau, và sự cong vênh mà chúng gây ra trong không-thời gian tạo ra các hiệu ứng của lực hấp dẫn, chẳng hạn, giúp Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.

## THUYẾT TƯƠNG ĐỐI ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG MINH NHƯ THẾ NÀO?

Năm 1919, nhà thiên văn học Arthur Eddington đã quan sát thấy ánh sao bị lệch trong khi nhật thực toàn phần. Điều này đã chứng minh những tác động của không-thời gian bị biến dạng và khiến Einstein trở nên nổi tiếng thế giới.

## THUYẾT TƯƠNG ĐỐI RỘNG GIẢI THÍCH CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC HÀNH TINH QUANH MẶT TRỜI








## Nguyên lý tương đương


Để hiểu được lực hấp dẫn, Einstein đã tưởng tượng mình đứng trong một thang máy và tự hỏi liệu lực giữ cho ông đứng trên sàn là lực hấp dẫn đang kéo xuống, hay tác động của quán tính khi thang máy di chuyển lên trên. Nếu nhìn từ bên trong, không có cách giải thích nào hợp lý cả. Đây được gọi là nguyên lý tương đương. Từ ý tưởng này, ông bắt đầu hình dung mình là một người quan sát trong một khung tham chiếu tĩnh đang quan sát Vũ trụ chuyển động xung quanh mình.

## Thí nghiệm thang máy Einstein

Einstein đã mở rộng thử nghiệm thang máy của mình bằng cách tưởng tượng một chùm ánh sáng sẽ trông như thế nào đối với một người bên trong thang máy ở ba tình huống khác nhau. Người bên trong không thể mô tả đầy đủ chuyển động của thang máy nhưng có thể quan sát biểu hiện của chùm sáng. Thí nghiệm cho thấy rằng khi di chuyển rất nhanh hoặc chịu tác động mạnh mẽ của lực hấp dẫn, không gian - và chùm ánh sáng - trở thành cong.




## VỊ TRÍ THỰC TẾ CỦA NGÔI SAO



## ĐIỀU HƯỚNG GPS

Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) là minh họa cho tác động của các lý thuyết tương đối của Einstein. Các vệ tinh GPS gửi tín hiệu về vị trí của chúng và thời gian chính xác, dữ liệu được hệ thống định vị vệ tinh sử dụng để tính toán vị trí của chúng. Tuy nhiên, vì chúng di chuyển với tốc độ lớn, các đồng hồ vệ tinh trên tàu chạy chậm hơn so với trên Trái Đất, do đó, GPS cũng cần cân nhắc cả tính tương đối này.






# Sóng hấp dẫn

Thuyết tương đối rộng dự đoán rằng các vật thể chuyển động trong không gian tạo ra những gợn sóng trong không-thời gian gọi là sóng hấp dẫn. Năm 2015, những con sóng này đã được phát hiện lần đầu tiên.

## Sóng hấp dẫn là gì?


Vật chất tăng tốc trong không gian theo những cách nhất định tạo ra sóng hấp dẫn. Các sự kiện tương tác hấp dẫn lớn nhất tạo ra các sóng có tần số thấp và chu kỳ sóng lớn. Ví dụ, sóng từ Vụ Nổ Lớn được cho là dài hàng triệu năm ánh sáng. Sóng hấp dẫn là một cách để hình dung Vũ trụ mà không dựa vào ánh sáng. Chúng có thể tiết lộ những thứ hiện vẫn vô hình trước mắt ta, chẳng hạn như chính xác thì điều gì xảy ra bên trong một lỗ đen.




## Sóng hấp dẫn hình thành như thế nào?

Các sóng hấp dẫn đầu tiên phát hiện bởi LIGO được tạo ra bởi các sóng truyền tới Trái Đất từ hai lỗ đen va chạm cách chúng ta gần 1,3 tỷ năm ánh sáng. Hai lỗ đen được kéo lại với nhau bởi lực hấp dẫn lẫn nhau giữa chúng.

Lỗ đen có khối lượng gấp 20 lần Mặt Trời nhưng lấp đầy một không gian nhỏ hơn rất nhiều.



Các lỗ đen di chuyển cực nhanh co kéo không-thời gian thành những gợn sóng dữ dội



Khối lượng của mỗi lỗ đen liên tục làm cong không gian mà nó di chuyển qua

### 1 Va chạm lỗ đen

Hai lỗ đen bị kéo vào nhau do lực hấp dẫn. Các dao động thông thường được phát hiện bởi LIGO chỉ ra rằng quỹ đạo của các lỗ đen là những vòng tròn gần như hoàn hảo và chúng quay quanh nhau với tốc độ hơn 15 lần/giây.


### 2 Tốc độ quỹ đạo tăng nhanh

Khi các lỗ đen đến gần nhau hơn, quỹ đạo xoắn ốc của chúng ngày càng nhỏ hơn và cả hai đều tăng tốc tới gần với tốc độ ánh sáng. Toàn bộ khối lượng này chuyển động với tốc độ lớn như vậy sẽ tạo ra sóng hấp dẫn mạnh mẽ lan rộng khắp mọi hướng.

## LỖ SÂU ĐỤC

Vào thập niên 1930, Albert Einstein và Nathan Rosen đã mô tả cách mà không-thời gian có thể bị biến dạng để hai vị trí xa nhau có thể được liên kết bằng một lối tắt. Một "cây cầu" như vậy, hay lỗ sâu đục, sẽ tạo ra lối tắt cho các hành trình dài, nhưng chúng ta vẫn chưa tìm thấy bằng chứng cho sự tồn tại của chúng.

Miếng lỗ dẫn đến một nơi khác trong không-thời gian





Không gian cong trở lại chính nó





## Cách LIGO phát hiện sóng



LIGO, hay Đài Quan trắc Sóng hấp dẫn bằng Giao thoa kế Laser, phát hiện sóng hấp dẫn nhờ tác động của chúng lên các chùm tia laser bắn vào hai ống dài 4 km. Một chùm tia truyền đi với bước sóng dài gấp rưỡi so với tia còn lại. Điều này có nghĩa là khi các chùm tia gặp nhau, chúng triệt tiêu lẫn nhau, làm cho ánh sáng biến mất. Một sóng hấp dẫn làm thay đổi khoảng cách không gian giữa các tia laser, vì vậy khi các chùm tia gặp nhau, chúng tạo ra tín hiệu là ánh sáng nhấp nháy.





# Lý thuyết dây

Lý thuyết dây là một nỗ lực để giải quyết các bài toán lớn nhất trong ngành vật lý, chẳng hạn như lực hấp dẫn hoạt động thế nào ở quy mô cực kỳ nhỏ. Nó đề xuất rằng tất cả các hạt là các "dây" một chiều, và là cấu phần của một khung phổ quát.




## Dây không phải hạt

Ta không thể quan sát trực tiếp các hạt hạ nguyên tử. Hiểu biết của con người về các hạt này đến từ việc quan sát ảnh hưởng của chúng. Lý thuyết dây đề xuất rằng các hạt thực sự là các dây rung nhỏ. Mỗi hạt cơ bản, chẳng hạn như electron hoặc quark, có một rung động đặc biệt, tạo thành nhiều đặc tính của nó, chẳng hạn như khối lượng, điện tích và động lượng. Chưa có ai tìm ra được cách kiểm chứng lý thuyết dây; hiện tại, nó vẫn là một hệ thống toán học dường như phù hợp với hành vi của các hạt lượng tử.

### Các sợi năng lượng

Theo lý thuyết dây, các hạt cơ bản, chẳng hạn như electron hoặc quark, hạt tạo nên các proton, là các dây hoặc các sợi năng lượng, mỗi hạt có rung động riêng biệt.



## Hấp dẫn lượng tử


Thuyết hấp dẫn lượng tử có mục tiêu nhằm liên kết thuyết tương đối rộng, mô tả lực hấp dẫn của các cấu trúc khổng lồ như các hành tinh, với cơ học lượng tử, cho thấy ba lực cơ bản còn lại hoạt động như thế nào ở quy mô nguyên tử. Các hiệu ứng của hấp dẫn lượng tử có thể xuất hiện ở quy mô được đo bằng một đơn vị khoảng cách gọi là độ dài Planck.

### Độ dài Planck

Không thể xác định vị trí của hai đối tượng cách nhau dưới một độ dài Planck, vì thế đại lượng này trở thành đơn vị đo khoảng cách nhỏ nhất có ý nghĩa vật lý.

## TẠI SAO CẦN PHẢI CÓ MỘT LÝ THUYẾT VẠN VẬT?

Vũ trụ tuân theo một loạt các quy tắc hoạt động ở cả quy mô nhỏ nhất lẫn lớn nhất. Chúng phải được liên kết theo cách nào đó, và một lý thuyết vạn vật sẽ giúp lý giải điều này.









Đa chiều

Các nhà lý thuyết dây cho rằng các dây không chỉ dao động theo ba chiều có thể nhìn thấy (chiều dài, chiều rộng và chiều cao/sâu) mà còn rung trong ít nhất bảy chiều khác bị ẩn khỏi chúng ta. Các chiều không gian này được đặt tên là “compact”, chỉ xuất hiện ở quy mô hạ nguyên tử nhỏ nhất. Không gian compact có thể ở xung quanh chúng ta và là cách giải thích các hiện tượng bí ẩn như vật chất tối và năng lượng tối (xem trang 206-207).



Nếu một quả cầu 3D đi qua một thế giới 2D, nó sẽ chỉ xuất hiện dưới dạng mặt cắt 2D



Đối với người quan sát 2D, các mặt cắt của hình cầu sẽ xuất hiện dưới dạng các vòng tròn đồng tâm khi mỗi phần của hình cầu đi qua bề mặt 2D

Hình dạng 3D trong thế giới 2D


Tưởng tượng một hình ba chiều được xem ở hai chiều giúp chúng ta hiểu các chiều không gian cao hơn. Chỉ có thể nhìn thấy các lát tròn của hình cầu 3D khi xem ở dạng 2D.

Điểm nhìn của một người quan sát 2D

Một sinh vật 2D, không thể nhìn trên hay dưới, sẽ nhìn thấy một quả cầu đang lớn lên và co lại khi nó di chuyển lên xuống. Biểu hiện kỳ lạ này xảy ra là do các chiều không gian vô hình.

Đa tạp Calabi-Yau

Theo một số nhà lý thuyết dây, các chiều không gian mà chúng ta không thể nhìn thấy có thể được cuộn lại trong một cấu trúc hình học gọi là đa tạp Calabi-Yau. Hình minh họa dưới đây cho thấy một giao điểm 2D của một đa tạp sáu chiều được gọi là Calabi-Yau bậc năm.



Đa tạp được chia thành 25 vùng hoặc “mảnh”, mỗi vùng được thể hiện bằng một màu khác nhau

TRONG MỘT BẢN CỦA  
LÝ THUYẾT DÂY, CÓ TỚI 10  
CHIỀU TRONG KHÔNG GIAN

Siêu hạt

Một số dạng của lý thuyết dây đề xuất rằng vật chất chỉ là sự rung động năng lượng ở mức thấp nhất, và có những dây khác dao động ở các quãng cao hơn, như hòa âm trong âm nhạc. Các rung động cao hơn đại diện cho các siêu hạt (sparticle – hạt siêu đối xứng). Mỗi hạt này, về mặt lý thuyết, có liên hệ với một hạt cơ bản thông thường. Một số nhà lý thuyết dây dự đoán rằng các siêu hạt có thể có khối lượng lớn hơn tới 1.000 lần so với các hạt đối xứng tương ứng của chúng.

CÁC HẠT VẬT CHẤT VÀ CÁC SIÊU HẠT CỦA CHÚNG		CÁC HẠT LỰC VÀ CÁC SIÊU HẠT CỦA CHÚNG	
Hạt	Siêu hạt	Hạt	Siêu hạt
Quark	Squark	Graviton	Gravitino
Neutrino	Sneutrino	W boson	Wino
Electron	Selectron	Z°	Zino
Muon	Smuon	Photon	Photino
Tau	Stau	Gluon	Gluino
		Hạt Higgs	Higgsino







# SỰ SỐNG



# Sự sống là gì?


Sự sống là điều phức tạp nhất trong vũ trụ. Các khối phân tử xây dựng sự sống và sự kết hợp giữa các thành phần của nó phức tạp hơn so với bất kỳ máy tính nào. Ta cần phải phân tích sinh học một sinh vật theo các chức năng cơ bản của nó để hiểu rõ và trân trọng sự sống.

## Dấu hiệu của sự sống


Hàng triệu loài sinh vật có chung một tập hợp các đặc điểm: đặc điểm của sự sống. Chỉ khi tất cả những đặc điểm này kết hợp với nhau, thì một vật mới được gọi là sống. Một sinh vật tiêu thụ thực phẩm, hô hấp để giải phóng năng lượng, và bài tiết chất thải. Nó di chuyển, cảm nhận môi trường xung quanh, tăng trưởng và sinh sản. Những vật không sống có thể có một hoặc hai trong số các đặc điểm này, nhưng không bao giờ chúng sở hữu bộ đặc điểm hoàn chỉnh.

## Xây dựng sự phức tạp

Các hóa chất phức tạp tạo nên sự sống được xây dựng từ một khung các nguyên tử carbon và nằm trong số những phân tử lớn nhất được biết đến cho tới nay. Các chuỗi ADN hoặc cellulose có thể dài tới vài centimet. Thực vật tạo ra các phân tử hữu cơ từ các thành phần đơn giản, chẳng hạn như carbon dioxide và nước. Động vật tổng hợp chúng bằng cách ăn thức ăn - là sinh vật khác hoặc chất thải của chúng. Những phân tử thực phẩm này hoạt động đồng thời như nhiên liệu và vật liệu xây dựng.




**MỘT TRONG SỐ CÁC SINH VẬT SỐNG ĐƠN GIẢN NHẤT LÀ VI KHUẨN GÂY VIÊM PHỔI, CHÚNG CHỈ CÓ 687 GIEN**



### Phân tử thực phẩm

Một phân tử glucose được tạo thành từ 24 nguyên tử và là một trong những phân tử đơn giản nhất được sử dụng làm thực phẩm. Giống như trong các phân tử sinh học khác, các nguyên tử carbon tạo thành khung của nó.



### Sơ đồ Venn về sự sống

Mặc dù có sự khác biệt đáng kinh ngạc giữa các sinh vật, bảy chức năng chung cơ bản dưới đây đều được chia sẻ bởi các sinh vật sống khác nhau như vi khuẩn, thực vật và động vật.





**DINH DƯỠNG**

Sự sống cần một nguồn cung cấp năng lượng và nguyên liệu thô liên tục. Nhiều sinh vật cần phải thu nhận chúng dưới dạng các phân tử thực phẩm hữu cơ, chẳng hạn như protein và carbohydrat.

**DI CHUYỂN**

Từ dòng chất lỏng và các thành phần chảy đều trong các tế bào siêu nhỏ, đến sự co rút mạnh mẽ của cơ bắp động vật, tất cả các sinh vật đều có thể di chuyển theo một mức độ nào đó.

**SINH VẬT SỐNG**

Trùng roi xanh - một sinh vật nguyên sinh đơn bào siêu nhỏ sống trong ao - có thể quang hợp như thực vật, đồng thời tiêu thụ thức ăn như một động vật.

Phần lớn thực phẩm hữu cơ của một sinh vật bị phá vỡ trong các phản ứng hóa học tương đương với việc đốt cháy nhiên liệu trong động cơ. Hoạt động hô hấp giải phóng năng lượng cơ thể sử dụng.

**HÔ HẤP**

**Động cơ đốt trong**

Bằng cách tiếp nhận và đốt cháy nhiên liệu để tạo ra chuyển động, đồng thời "bài tiết" khói thải, một động cơ có tới bốn trong số bảy dấu hiệu của sự sống. Nhưng nó thiếu tính nhạy cảm, sự tăng trưởng và sinh sản.

**SỰ SỐNG CÓ NHẤT THIẾT PHẢI DỰA TRÊN CARBON?**


Các cây bút khoa học viễn tưởng đã suy đoán rằng silic có thể trở thành một phương tiện sinh học thay thế. Tuy nhiên, carbon là nguyên tố duy nhất có khả năng kết hợp với rất nhiều loại nguyên tử khác để tạo thành các phân tử phức tạp - và, từ đó, tạo nên sự sống.

**BÀI TIẾT**

Các phản ứng hóa học liên tục trong các tế bào của một sinh vật tạo ra các chất thải, chẳng hạn như carbon dioxide. Bài tiết là cách chất thải từ quá trình trao đổi chất này được loại bỏ khỏi cơ thể.

**TRAO ĐỔI CHẤT LÀ GÌ?**

Vô số phản ứng hóa học - được gọi là trao đổi chất - giúp duy trì sự sống. Các phân tử được thay đổi trong chuỗi phản ứng này, mỗi bước được điều khiển bởi một chất xúc tác protein cụ thể gọi là enzyme. Sự trao đổi chất độc đáo của mỗi sinh vật phụ thuộc vào bộ enzyme xác định trong chỉ thị di truyền ADN của chúng.





# Phân loại sinh vật sống

Con người chúng ta luôn tìm cách phân loại mọi thứ để có thể hiểu về thế giới. Và khi nói đến việc tổ chức sự đa dạng của sự sống, phân loại khoa học hiện đại có thêm một mục tiêu thứ hai – để lập biểu đồ sự tương đồng về thể chất lẫn di truyền giữa các loài, theo cách phản ánh mối quan hệ tiến hóa của chúng.


## Cây sự sống

Sự tương đồng giữa các sinh vật khác nhau, như vi khuẩn và động vật, đặc biệt là trong tế bào và gen của chúng, là bằng chứng mạnh mẽ cho thấy rằng tất cả sự sống bắt nguồn từ một tổ tiên duy nhất. Trải qua hàng tỷ năm, những sinh vật sống đã tiến hóa thành một “cây phá hệ” to lớn. Các nhà khoa học phân loại chúng trong một loạt các nhóm ngày càng nhỏ hơn, phản ánh cách các cành đã tách ra khỏi các chi lớn hơn trong quá trình tiến hóa. Những cành lâu đời nhất trên cây đánh dấu nền tảng của các giới sinh vật, trong khi các nhánh cây ngoài cùng là hàng triệu loài đã từng sinh sống.

## MỘT MUỖNG CÀ PHÊ ĐẤT CÓ THỂ CHỨA HƠN 100.000 LOÀI VI SINH VẬT

### TÊN KHOA HỌC

Mỗi loài đều có một tên khoa học riêng. Điều này tạo ra tính rõ ràng - điều hiếm thấy ở các tên gọi phổ biến như cây thạch thảo hoặc cây thạch nam (cả hai đều đề cập đến cùng một loài, *Erica arborea*). Tên khoa học thường có tính mô tả (*arborea* có nghĩa là “giống như cây”) và luôn có hai phần. Phần thứ nhất, chẳng hạn như *Erica*, xác định một nhóm các loài liên quan, gọi là chi. Khi kết hợp với phần thứ hai (*Erica cinerea* hay *Erica arborea*), tên giúp xác định loài.




**Erica  
cinerea**



**Erica  
arborea**



**Rhododendron  
arboreum**



### LUCA

Tổ tiên chung của muôn loài (Last Universal Common Ancestor) – tổ tiên giả định của tất cả sự sống trên Trái Đất



### GIỚI VI KHUẨN

Các sinh vật đơn bào đơn giản nhất




### GIỚI CỔ KHUẨN

Các sinh vật bề ngoài tương tự vi khuẩn, nhưng bộ gen rất khác



### GIỚI ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH

Các sinh vật đơn bào bao gồm trùng amíp và họ hàng của chúng



### GIỚI SẮC KHUẨN


Tảo diệp lục a và c, trùng lông, trùng lỗ và họ hàng; chủ yếu là các loài đơn bào



### GIỚI ĐỘNG VẬT



### GIỚI NẤM



### GIỚI THỰC VẬT VÀ TẢO

Tất cả các sinh vật có diệp lục a và b





## Nhóm tự nhiên và không tự nhiên

Nhiều sinh vật chia sẻ những đặc điểm chung chỉ vì trùng hợp ngẫu nhiên trong tiến hóa. Chim và côn trùng tiến hóa cách theo các cách riêng biệt, vì vậy sẽ không chính xác nếu ta nhóm chúng thành "động vật biết bay". Các nhóm tự nhiên, hoặc các nhánh, bao gồm tất cả các hậu duệ của một tổ tiên chung - một chạc ba trên cây sự sống. Động vật có vú và chim là hai nhánh. Các nhóm động vật mà chúng ta gọi là cá và động vật không xương sống thì không phải nhánh, bởi vì chúng không bao gồm tất cả con cháu. Chẳng hạn, nhóm "cá" không bao gồm các con cháu của chúng là các loài động vật có xương sống trên cạn.

### Nhóm trong nhóm

Nếu phân loại nghiêm túc đúng theo mức độ liên quan, hệ thống của chúng ta phải phản ánh rằng chim là hậu duệ của khủng long chân thú - những con khủng long đứng thẳng, gồm cả loài *Tyrannosaurus*. Điều này có nghĩa là chúng được phân loại là một nhóm cấp dưới của khủng long, lồng trong các loài bò sát.

### KHỦNG LONG, CHIM, VÀ BÒ SÁT HIỆN ĐẠI



**Động vật có vú**



**Thần lằn và rắn**



**Rùa**



**Cá sấu**

**ĐỘNG VẬT CÓ MÀNG ỒI**  
Tất cả các động vật mà trứng có màng chống thấm, hay màng ối



**CHIM**



**Khủng long hông thần lằn**



**Khủng long chân thú có liên quan đến chim**



**Khủng long hông chim**

### KHỦNG LONG VÀ CHIM



**ĐỘNG VẬT LƯỖNG CỤ**

### ĐỘNG VẬT TỬ CHI

Động vật có xương sống, sống trên cạn - tất cả đều có nguồn gốc từ một tổ tiên bốn chân

## ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG



**Ngành Thân lỗ**



**Ngành Thích ty bào, bao gồm hải quỳ và sứa**



**Động vật miệng nguyên sinh, bao gồm động vật chân đốt, động vật thân mềm và hầu hết các loại giun**



**Động vật miệng thứ sinh không có xương sống, gồm sao biển và họ hàng**

### Động vật không xương sống là một nhóm không tự nhiên

Ngoài việc không có xương sống, động vật không xương sống có rất ít điểm chung với nhau. Một số đơn giản, số khác phức tạp. Hơn thế nữa, nhóm này cũng chưa đầy đủ, bởi vì nó không bao gồm các loài động vật có xương sống thuộc nhóm Động vật miệng thứ sinh.

## CÁ



**Cá không xương (cá mùt đã và lươn nhơn)**



**Cá mập, cá đuối, và họ hàng**



**Cá xương vây tia**



**Cá xương vây thùy, bao gồm cả cá phổi**


### Cá là một nhóm không tự nhiên

Tất cả các loài cá đều có chung một tổ tiên, nhưng một nhóm (cá xương vây thùy) đã sinh ra các động vật tứ chi, không phải là cá. Vì vậy, giống như động vật không xương sống, cá không tạo thành một nhánh. Tuy nhiên, khác với động vật không xương sống, độ phức tạp của các loài cá là tương tự nhau và chúng chia sẻ nhiều đặc điểm độc đáo, vì vậy chúng tạo ra một nhóm phi nhánh được gọi là một bậc.



# Virus

Virus là phiên bản sống động của một ổ đĩa sao chép. Không thực sự sống, những tác nhân truyền nhiễm này – chỉ là các gói gen nhỏ – phá hoại các tế bào sống nhằm phân tán bản sao của chúng thông qua vật chủ. Một số virus ít có tác hại, nhưng số khác thì đứng sau những căn bệnh đáng sợ nhất trên Trái Đất.



## Các loại virus

Virus có hình dạng khác nhau nhưng có cùng các thành phần thiết yếu: một cụm gen được bọc trong một lớp vỏ protein. Một số có thành phần cơ sở là ADN. Số khác lại có ARN – phân tử làm chất trung gian để tạo ra protein trong tế bào (xem trang 158-159). Đáng chú ý nhất, một số gen virus liên quan nhiều đến các vật chủ của chúng hơn là đến các gen virus khác – bằng chứng cho thấy virus thực sự có thể là các mảnh gen biến đổi đã thoát ra khỏi nhiễm sắc thể của vật chủ.

Virus bám vào màng tế bào

Protein (hình tam giác màu cam và hình cầu màu xanh) tạo nên lớp vỏ virus

## “Vòng đời” của virus

Tất cả các virus đều là ký sinh trùng, lây truyền qua đường tiếp xúc, qua không khí hoặc trong thực phẩm bị nhiễm virus. Chúng không phải là những sinh vật sống thực sự (xem trang 150-151), một phần là do chúng phải dựa vào cơ chế hoạt động bên trong của một tế bào để sao chép. Giống như các sinh vật sống mà chúng sử dụng làm vật chủ, hành vi của virus được mã hóa trong gen của chúng – giúp chúng lây nhiễm vào cơ thể vật chủ theo cách nhằm tối đa hóa sự nhân lên. Mỗi loại virus có tác hại riêng: từ những cơn cảm lạnh thông thường gây bởi rhinovirus, cho đến sự sụp đổ hoàn toàn của hệ thống miễn dịch do Ebola.

### Virus gắn vào 1

Các phân tử trên lớp vỏ virus khóa vào các phân tử cụ thể trên màng tế bào vật chủ. Từ đó cho phép virus gắn vào tế bào – và giải thích tại sao virus lại có thể tấn công một số loại mô và loài nhất định mà không phải mô và loài khác.

Virus xâm nhập màng tế bào

### 2 Virus xâm nhập tế bào

Nhiều virus xâm nhập vào tế bào qua một “bong bóng” được tạo ra từ màng tế bào của vật chủ. Bong bóng bao phủ xung quanh virus, rồi mở rộng vào bên trong để kéo virus vào bên trong tế bào.

### Vỏ virus tách ra 3

Không còn cần thiết nữa, vỏ virus sẽ tách ra để giải phóng vật liệu di truyền của nó vào tế bào của vật chủ.

Những gen này được tạo ra từ ARN (màu cam), nhưng trong các virus khác, chúng có thể được tạo ra từ ADN

Bong bóng chứa đầy chất lỏng gọi là túi


Lưới nội chất hạt mang ribosome

Ribosome – các hạt thực hiện tổng hợp protein

Hạt nhân chứa ADN của tế bào chủ


NHÂN TẾ BÀO





## 7 Hạt virus mới được giải phóng

Các hạt virus thoát ra khỏi tế bào và sẵn sàng lây nhiễm sang các tế bào khác, hoặc phân tán đến một vật chủ mới. Việc này có thể làm vỡ màng tế bào, do đó cũng giết chết tế bào của vật chủ.



## 6 Virus mới được tạo ra


Các hạt virus mới được tạo nên từ các khối protein mà ribosome sản sinh, và ARN được sao chép bên trong tế bào của vật chủ.

## 5 Virus phá hoại bộ máy sản xuất protein của vật chủ

ARN của virus liên kết với các hạt tạo protein của tế bào, được gọi là ribosome, bám vào bề mặt của lưới nội chất hạt. Trong khi đó, ribosome vô tình tạo ra protein mà virus cần để tạo ra virus mới.

## 4 Gien virus được sao chép

Vật liệu di truyền của virus tạo ra nhiều bản sao giống hệt nhau. Virus ARN mang enzyme riêng của chúng để tạo ra ADN trước, hoặc đơn giản hơn là sao chép trực tiếp. Mặc dù không được minh họa trong hình, các virus ADN đi thẳng vào nhân tế bào của vật chủ nơi chúng tự chèn vào ADN của vật chủ.




MÀNG TẾ BÀO

**ĐẬU MÙA LÀ BỆNH  
TRUYỀN NHIỄM DUY  
NHẤT ĐÃ ĐƯỢC  
LOẠI BỎ BẰNG  
CÁCH TIÊM PHÒNG**

## Chống lại virus


Khi đối mặt với một cuộc tấn công của virus, cơ thể sẽ huy động các tế bào bạch cầu trong hệ thống miễn dịch. Một số giải phóng protein được gọi là kháng thể, liên kết với virus và vô hiệu hóa chúng. Những bạch cầu khác, gọi là "tế bào tiêu diệt", sẽ hủy diệt các tế bào đã bị nhiễm bệnh. Virus không thể được điều trị bằng kháng sinh, vốn dĩ chỉ có tác động trên vi sinh vật, chẳng hạn như vi khuẩn. Tuy nhiên, ở tuyến đầu của việc chống lại virus là các loại vaccine, kích thích hệ thống miễn dịch hoạt động bằng một loại nhiễm trùng "giả".



## VIRUS VỚI MỤC ĐÍCH TỐT

Virus có thể được biến đổi gien để mang thuốc đến các tế bào cụ thể, từ đó góp phần giúp chữa trị ung thư. Virus ADN cũng có thể chuyển gien "khỏe mạnh" vào các tế bào nhờ kỹ thuật liệu pháp gien (như được minh họa ở đây). Các loại virus khác thậm chí còn có khả năng chống lại vi khuẩn gây bệnh, đưa ra giải pháp thay thế cho kháng sinh trong điều trị nhiễm trùng.

Virus chèn gien vào ADN của tế bào





# Tế bào

Gần như mọi bộ phận của bất kỳ cơ thể sinh vật nào cũng bao gồm các đơn vị sống gọi là tế bào. Các tế bào xử lý thức ăn và năng lượng, cảm nhận môi trường xung quanh, phát triển và tự hồi phục – tất cả trong một không gian nhỏ hơn năm lần so với một dấu chấm trên giấy.

## Các tế bào hoạt động thế nào?

Một tế bào chứa đầy các cấu trúc nhỏ gọi là bào quan. Giống như các cơ quan trong cơ thể, mỗi bào quan thực hiện một hoặc nhiều nhiệm vụ chuyên môn quan trọng đối với hoạt động của tế bào. Tất cả các tế bào thu thập nguyên liệu từ môi trường xung quanh để tạo ra vô số các chất phức tạp.

Ribosome gắn trên lưới nội chất hạt, khiến nó sần sùi

Hạt nhân lưu trữ ADN, hoạt động như một thư viện hướng dẫn tạo ra protein

Hạch nhân giúp tạo ra ribosome

TẾ BÀO THỰC VẬT

THÀNH TẾ BÀO

TY THỂ

TÚI

THỂ GOLGI

THÀNH TẾ BÀO

### 1 Sản xuất protein

Hầu hết các chất mà tế bào cần là các protein cụ thể, được tạo ra theo chỉ thị di truyền (xem trang 158-159) tại các vị trí được gọi là ribosome, gắn trên bề mặt phức tạp của một bào quan gọi là lưới nội chất hạt.

### 2 Đóng gói

Các protein di chuyển trong các túi – các bong bóng tế bào nhỏ trôi tới thể Golgi. Bào quan này hoạt động như một bưu điện di động, đóng gói và dán nhãn các protein, xác định nơi chúng được gửi đến tiếp theo.

### 3 Vận chuyển


Thể Golgi đặt các protein vào các túi khác nhau tùy thuộc vào nhãn của chúng. Các túi sẽ lên đường vận chuyển, và những túi được định là ra bên ngoài sẽ hòa với màng tế bào và giải phóng các protein bên ngoài.

Ty thể cung cấp năng lượng cho tất cả các quá trình của tế bào

Túi chứa vật liệu như protein

Thể Golgi chuẩn bị, sắp xếp và phân phối protein và các phân tử khác

Túi giải phóng protein



MỖI MM VUÔNG  
TRÊN BỀ MẶT LÁ  
CÓ THỂ CHỨA ĐẾN

800.000 LỤC LẠP





Lưới nội chất hạt là nơi tạo ra protein; thành phẩm được vận chuyển giữa các màng phức tạp của nó

Lưới nội chất trơn tạo ra và vận chuyển chất béo, acid béo và cholesterol trong tế bào

## TẾ BÀO SỐNG ĐƯỢC BAO LÂU?

Tùy vào chức năng của chúng. Các tế bào da động vật tồn tại khoảng một vài tuần trước khi rơi ra, nhưng các tế bào bạch cầu liên quan đến phòng vệ lâu dài có thể sống tới một năm hoặc hơn.

## KHÔNG BÀO

Không bào lưu trữ nước, chất dinh dưỡng, và đôi khi còn chứa cả độc tố bảo vệ cây

Lục lạp là nơi diễn ra quang hợp (xem trang 168-169)

Bào tương là dịch lỏng nơi xảy ra nhiều phản ứng hóa học tế bào

Màng tế bào kiểm soát những gì đi vào và ra khỏi tế bào

Tiêu thể chứa các enzyme tiêu hóa có khả năng tiêu diệt kẻ xâm lược hoặc các chất không mong muốn

## LỤC LẠP

## TIÊU THỂ


## MÀNG TẾ BÀO

## Sự đa dạng của các tế bào

Tế bào động vật khác với tế bào thực vật. Không bị ràng buộc và không được hỗ trợ bởi một thành tế bào, các tế bào động vật không thể phát triển lớn như tế bào thực vật. Nhưng, giống như những tế bào thực vật, chúng có hình dạng khác nhau tùy thuộc vào chức năng. Bởi vì động vật cần nhiều năng lượng hơn thực vật, tế bào của chúng có nhiều ty thể hơn. Nhưng chúng luôn thiếu lục lạp để quang hợp, vì động vật tiêu thụ, chứ không phải sản xuất, thức ăn của chúng.


### Các tế bào động vật khác nhau

Các tế bào da phẳng có thể tạo thành dạng một tấm, nhưng vì chúng không phải bận rộn tạo ra protein nên chúng có ít ty thể. Ngược lại, tế bào bạch cầu có nhiều ty thể, giúp nó có thể phản ứng cực nhanh trong các hoạt động bảo vệ cơ thể.



Ít ty thể và túi  
Hạt nhân chứa ADN

### TẾ BÀO DA



Nhiều ty thể và túi


### Tế bào vi khuẩn

Tế bào vi khuẩn hoàn toàn không giống với tế bào động vật và thực vật. Vi khuẩn đã tiến hóa từ rất lâu trước khi động vật, thực vật, hoặc thậm chí là tảo đơn bào xuất hiện. Chúng có thành tế bào nhưng không có nhân để chứa ADN của chúng.

### BẠCH CẦU

ADN trong một vòng lặp lỏng lẻo

Thành tế bào khiến cho hình dạng tế bào chắc hơn, giống như tế bào thực vật




### VI KHUẨN

## TẠO RA NHIỀU TẾ BÀO HƠN

Các tế bào trong một cơ thể đa bào phải tự nhân đôi nhiều lần để cơ thể phát triển hoặc tự tái tạo. Quá trình sao chép này, được gọi là nguyên phân, là không dễ dàng, vì mỗi tế bào phải có bản sao bộ gen riêng - chỉ thị ADN đầy đủ cho cơ thể. Đầu tiên, ADN sẽ được sao chép đầy đủ trước khi tế bào phân tách thành các tế bào con.

### TẾ BÀO Ở NGUYÊN PHÂN






# Cách thức hoạt động của gen

ADN chứa các thông tin được mã hóa kiểm soát sự tăng trưởng và tồn tại của các sinh vật sống. Chỉ thị của nó được chuyển hóa thành các protein cụ thể mà một sinh vật cần. Một đoạn ADN chứa mã tạo protein được gọi là gen.

## Tạo nên protein


Hàng trăm loại protein tham gia vào các quá trình sống của tế bào. Nhiều trong số chúng là các enzyme giúp tăng tốc, hoặc xúc tác, phản ứng hóa học; trong khi số khác giúp di chuyển vật liệu qua màng tế bào hoặc thực hiện các nhiệm vụ quan trọng khác. Tất cả đều được thực hiện theo chỉ thị của gen. Mỗi gen phải được sao chép vào một phân tử gọi là ARN, có vai trò mang các chỉ thị từ nhân đến bộ máy tạo protein trong tế bào.

Phân tử ADN dài cuộn trong nhân




## Mọi chuyện bắt đầu ở đâu

DNA quá dài và cồng kềnh đến mức nó chỉ có thể ở yên trong nhân. Tuy nhiên, các protein lại được tạo ra trong bào tương, do đó các bản sao của gen phải được gửi đi dưới dạng ARN thông tin.




### 1 Cấu trúc ADN

Phân tử ADN là một chuỗi xoắn kép bao gồm hai mạch xoắn. Bốn đơn vị hóa học, được gọi là nucleobase, kết hợp giữa hai mạch theo nguyên tắc bổ sung: adenine với thymine, và guanine với cytosine.



### 2 ADN tháo xoắn

Chỉ thị di truyền được mã hóa trong trình tự nucleotide dọc theo một mạch. Các phần được gọi là gen chứa mã cho các protein cụ thể sẽ lộ ra khi chuỗi xoắn kép mở ra ở những điểm phù hợp.



### 3 Tổng hợp ARN từ khuôn ADN

Một mạch ARN được xây dựng dọc theo mạch khuôn của gen, chuỗi nucleobase của nó bổ sung cho chuỗi nucleobase của gen. Uracil trong ARN được sử dụng để ghép với adenine, thay vì thymine.






## MÃ DI TRUYỀN - MỘT NGÔN NGỮ PHỔ QUÁT

Mỗi loại sinh vật có một bộ gen riêng, nhưng cách thức trình tự nucleotide được chuyển thành các acid amin là tương tự trong tất cả các sinh vật, từ vi khuẩn cho đến thực vật và động vật: một bộ ba nucleobase luôn chuyển thành cùng một acid amin. Ví dụ, mã AAA tạo ra acid amin lysine, AAC là mã cho asparagine, và cứ thế.




**CỨ MỖI GIÂY LẠI CÓ THÊM 50 NUCLEOBASE KHI ADN ĐƯỢC SAO CHÉP TRONG MỘT TẾ BÀO NGƯỜI**




### 4 Gen rời khỏi nhân

Chuỗi ARN thông tin (mARN) đã hoàn thành - hết như một tấm gương phản chiếu của gen - tách ra và di chuyển vào bào tương. Ở đó, nó thu hút các phân tử ARN vận chuyển (tARN) cụ thể.



### 5 Phiên mã thành acid amin

Các phân tử tARN nhận ra và dính vào các chuỗi cụ thể trên mARN. Mỗi tARN mang theo một acid amin cụ thể, tham gia vào một chuỗi lớn dần. Theo cách này, trình tự nucleotide được phiên mã thành các acid amin.



### 6 Acid amin xếp thành protein

Trình tự cụ thể của các acid amin, được quyết định bởi thứ tự các nucleobase trong gen, kiểm soát cách thức mà chuỗi cuộn xếp thành một phân tử protein phức tạp. Cách thức protein cuộn lại quyết định hình dạng và chức năng của nó.




# Sinh sản

Khi sự sống tạo ra sự sống, các sinh vật tìm ra những cách khác nhau để truyền lại bộ gen của mình, với số lượng lớn nhất có thể, từ thế hệ này sang thế hệ tiếp theo. Một số sinh vật sống đơn giản là phân mảnh, nhưng đối với đa số sinh vật hữu tính, sinh sản tạo nên đa dạng di truyền.

## Sinh sản vô tính

Tất cả các sinh vật sẽ sao chép ADN của chúng khi các tế bào phân chia. Ở một số loài, việc sao chép toàn bộ cơ thể của sinh vật cũng chỉ đơn giản là sao chép một lần (xem trang 186-187). Sinh sản vô tính – không thụ tinh – tạo ra con cái giống hệt nhau, dễ mắc bệnh và gặp khủng hoảng sinh thái như nhau. Nhưng sự đơn giản khiến nó trở nên lý tưởng để sinh sôi nảy nở nhanh chóng.




## Sinh sản mọc chồi

Những động vật đơn giản, như hải quỳ, có thể nảy mầm con mới từ cơ thể mẹ.

Chồi tách ra và phát triển thành cá thể trưởng thành

Từ thành cơ thể tạo ra một chồi con




## Trình sản

Một vài động vật lại trải qua quá trình trình sản. Trứng rệp có thể phát triển thành con bên trong cơ thể mẹ mà không cần thụ tinh.



## Sinh sản sinh dưỡng

Sự phát triển phân nhánh của nhiều loài cây khiến chúng trở nên phù hợp với hình thức sinh sản sinh dưỡng từ thân bò hoặc chồi bên.




## Chiến lược sinh sản

Có những cách tương phản nhau để “đầu tư” cho thế hệ tiếp theo. Một số sinh vật sinh ra vô số con cái để bù đắp cho thực tế rằng mỗi con có cơ hội sống sót rất mong manh. Trong khi các loài khác ít sinh sôi nảy nở hơn, nhưng chúng lại là những bậc cha mẹ tận tụy đến mức mỗi con đều phát triển khỏe mạnh nhờ sự chăm sóc mà nó nhận được.

### Nhiều con

Ếch có thể đẻ ra hàng trăm quả trứng trong một lần sinh sản – và sẽ tiếp tục làm như vậy qua từng năm. Nhưng hầu hết con của nó bất lực trước kẻ săn mồi.



### Ít con


Thần ưng California – một loài chim săn mồi – bắt đầu sinh sản khi nó được tám tuổi và chỉ đẻ tối đa một quả trứng mỗi năm.




## RÀO CẢN SINH SẢN

Các loài khác nhau hiếm khi giao phối vì các rào cản sinh sản ngăn chặn điều đó. Chim chỉ đáp lại những khúc hát tán tỉnh của con cùng loài. Hổ và sư tử được chia tách do địa lý và môi trường sống. Các giống lai tự nhiên vẫn thỉnh thoảng xuất hiện, nhưng không thể tồn tại lâu, vì khả năng sinh sản của chúng thường rất kém. Tuy nhiên, trong điều kiện nuôi nhốt, các rào cản tự nhiên bị phá vỡ và các giống lai như sư hổ có nhiều khả năng xuất hiện hơn.

**SƯ HỔ – LOÀI LAI GIỮA CHA LÀ SƯ TỬ VÀ MẸ LÀ HỔ**







### 1 Bộ phận sinh sản

Tế bào sinh dục (trứng và tinh trùng) được sản xuất từ một loại phân chia tế bào gọi là giảm phân. Quá trình này làm giảm một nửa số lượng nhiễm sắc thể, đồng thời xáo trộn các gen.

### 2 Giao phối (thụ tinh)


Các sinh vật thường sản xuất nhiều tế bào sinh dục đực nhỏ, di động, và ít trứng hơn, kích thước lớn hơn. Một khi các tế bào sinh dục này hợp nhất, tế bào con là một hỗn hợp di truyền của cha và mẹ.

### 3 Kết hợp mới

Thụ tinh phục hồi tính xoắn kép của gen, nhưng cũng tạo ra gen mới, khác biệt về di truyền. Kết hợp di truyền mới này sẽ được sao chép trong mọi tế bào cơ thể ở con.


### Thụ phấn ở thực vật

Thực vật có hạt giống chuyển các tế bào sinh dục đực, trong hạt phấn hoa, đến các cơ quan sinh dục cái. Mỗi hạt phấn này mào ra một ống siêu nhỏ để đưa tế bào đực đến một quả trứng nằm sâu bên trong bông hoa.




### Giao phối ở động vật

Tinh trùng sử dụng một cái đuôi hình roi để bơi đến trứng. Ở nhiều động vật thủy sinh, sự thụ tinh xảy ra ở vùng nước xung quanh. Trên đất liền, tinh trùng phải xâm nhập vào cơ thể của con cái, vì vậy thụ tinh diễn ra bên trong cơ thể.



**CÁ MẶT TRẮNG ĐỂ 300 TRIỆU TRỨNG CÙNG MỘT LÚC - NHIỀU HƠN BẤT KỲ ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG NÀO KHÁC**





# Truyền gen

Con cái thừa hưởng các đặc điểm từ bố mẹ chúng, bởi vì những đặc điểm đó bị ảnh hưởng bởi gen trong các tế bào (xem trang 158-159). Các gen được sao chép bất cứ khi nào các tế bào phân chia, và những gen mang trong trứng và tinh trùng sẽ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ tiếp theo. Khi thụ tinh, gen khác nhau từ bố và mẹ gặp nhau. Sự kết hợp giữa các biến thể gen chính là cơ sở của di truyền.

## Di truyền cơ bản

Các kiểu di truyền đơn giản nhất liên quan đến mối quan hệ rõ ràng giữa một gen và một tính trạng. Ví dụ, màu lông hổ được kiểm soát bởi một gen duy nhất. Biến thể bình thường của gen này cho một lớp lông màu cam; một phiên bản đột biến hiếm hơn cho màu trắng. Mỗi tế bào cơ thể có ít nhất hai bản sao của mỗi loại gen. Nhưng vì biến thể gen màu cam luôn được ưu tiên, nên hai bản sao của gen màu trắng phải đi cùng nhau thì chúng mới có hiệu lực. Chỉ khi đó gen màu trắng mới được biểu hiện thành lớp lông màu trắng.

### 1 Thông tin di truyền của bố mẹ

Ở đây, cả bố và mẹ đều có sự kết hợp di truyền giống hệt nhau về gen màu lông: một gen màu cam và một gen màu trắng. Nhưng ngoài ra vẫn có nhiều gen khác có thể khác nhau giữa bố và mẹ.

## HỔ TRẮNG KHÔNG PHẢI LÀ MỘT LOÀI - GẦN NHƯ TẤT CẢ CHÚNG ĐỀU LÀ HỔ BENGAL VÀ ĐỀU CÓ THỂ GIAO PHỐI VỚI BẠN TÌNH CÓ LÔNG MÀU CAM



Nhiễm sắc thể với gen biến thể lông trắng

Nhiễm sắc thể với gen lông cam bình thường

HỔ BENGAL ĐƯỢC

HỔ BENGAL CÁI

## SINH RA ĐỂ CHẠY?

Một số đặc điểm, chẳng hạn như nhóm máu, được xác định hoàn toàn bởi gen. Nhưng các đặc điểm khác chịu ảnh hưởng từ cả di truyền lẫn môi trường. Các gen ảnh hưởng đến màu da và khối lượng cơ bắp, nhưng chúng chỉ đơn thuần đặt ra các giới hạn xung quanh một phạm vi biến đổi tiềm năng. Tác động môi trường giúp xác định kết quả: tẩm nắng có thể làm cho da sẫm màu hơn, và tập luyện thể thao có thể giúp phát triển cơ bắp để chạy.



TRƯỚC KHI TẬP LUYỆN

SAU KHI TẬP LUYỆN






## 2 Tế bào sinh dục

Sự hình thành các tế bào sinh dục - tinh trùng hoặc trứng - liên quan đến một loại phân chia tế bào phân tách từng cặp nhiễm sắc thể, từ đó cũng phân tách các cặp gen. Điều đó có nghĩa là một nửa số tinh trùng hoặc trứng sẽ mang biến thể gen màu cam và nửa còn lại mang biến thể màu trắng.

## 3 Kết quả di truyền

Chúng ta không thể dự đoán tinh trùng nào sẽ hợp nhất với trứng nào. Nhưng tỷ lệ cố định của các gen màu cam và trắng trong các tế bào sinh dục có nghĩa là ở đây chỉ có 25% cơ hội là hai biến thể gen màu trắng kết hợp với nhau để tạo thành kiểu hình lông trắng.




## Biến đổi đều

Không phải tất cả các đặc điểm được kế thừa đều tuân theo tỷ lệ cố định đơn giản mà chúng ta thấy trong trường hợp màu lông hổ. Trong thực tế, hầu hết các đặc điểm là kết quả của nhiều gen tương tác với nhau. Ví dụ, chiều cao của con người bị ảnh hưởng bởi nhiều gen chỉ phối sự phát triển của xương và cơ bắp, tạo ra con cái trung gian với mô hình biến đổi đều hơn.

## Con bạn sẽ cao bao nhiêu?

Chiều cao của con bạn không chỉ bị ảnh hưởng bởi nhiều gen tương tác mà còn do các yếu tố khác, chẳng hạn như chế độ ăn uống, ảnh hưởng. Nhìn chung, nếu cha mẹ cao thì con cái cũng thường cao hơn, nhưng chúng ta không thể dự đoán chiều cao thực tế của chúng.



## NHỮNG THAY ĐỔI TRONG SUỐT CUỘC ĐỜI CHA MẸ CÓ THỂ ĐƯỢC TRUYỀN LẠI KHÔNG?

Cái gọi là hiệu ứng biểu sinh (ngoại di truyền) xảy ra khi hóa chất gắn vào ADN trong dòng đời của sinh vật làm thay đổi cách đọc gen. Đôi khi, những thay đổi này có thể được truyền lại cho đời con.



# Sự sống bắt đầu như thế nào?


Chúng ta có lẽ sẽ chẳng bao giờ chắc chắn được rằng làm thế nào các sinh vật sống lại xuất hiện từ vật chất không sống. Nhưng manh mối về sự kiện quan trọng này đang nằm trong các tảng đá xung quanh ta, và trong cả các nguyên liệu thô trong các sinh vật còn tồn tại đến ngày nay. Chúng hàm ý rằng điều kiện hàng tỷ năm trước có thể đã thúc đẩy một dây chuyền lắp ráp các phân tử ngày càng phức tạp dẫn đến sự hình thành các tế bào đầu tiên.

## Thành phần của sự sống

Khi sự sống xuất hiện trên Trái Đất, thế giới vẫn còn là một nơi hỗn độn và đầy mối đe dọa, rất khác so với ngày nay. Địa hình núi lửa nằm bên dưới bầu khí quyển chỉ toàn khí độc, không thể lọc được tia mặt trời bỏng giãy. Các thí nghiệm cho thấy trong điều kiện năng lượng cao này, những hóa chất đơn giản như carbon dioxide, methan, nước và amonia có thể kết hợp để tạo thành các phân tử hữu cơ đầu tiên. Khi các khối xây dựng sự sống ngưng tụ trong các đại dương đầu tiên, ta thậm chí có thể nói rằng: sự xuất hiện của các sinh vật sống không chỉ là tình cờ mà là không thể tránh khỏi.

## “Nồi xúp nguyên thủy”


Hơn 4 tỷ năm trước, lớp vỏ Trái Đất là vô cùng nóng và không ổn định, thường xuyên bị các tiểu hành tinh bắn phá và luôn trong tình trạng hỗn loạn do phun trào núi lửa. Nhưng nước lỏng vẫn tồn tại ở một số nơi, tạo thành những đại dương và biển sơ khai – ngôi nhà đầu tiên cho sự sống.



- 1** Khí quyển ban đầu không có oxy, nhưng chứa hỗn hợp phức tạp các loại khí khác. Carbon dioxide, amonia và nhiều chất khác là những nguồn cung chính các nguyên tố của sự sống: carbon, hydro, oxy và nitơ.




**NĂNG LƯỢNG ĐẦU VÀO  
(ĐỊA NHIỆT VÀ SẤM SÉT)**



## TIA LỬA THIẾT YẾU

Năm 1952, Stanley Miller và Harold Urey từ Đại học Chicago đã thử nghiệm ý tưởng rằng các phân tử hữu cơ phức tạp có thể hình thành từ các vật liệu vô cơ đơn giản. Bằng cách cung cấp năng lượng cho một hỗn hợp vô cơ bằng tia lửa mô phỏng sét, họ đã tái tạo các điều kiện của Trái Đất thuở ban đầu và tạo nên các acid amin đơn giản – các khối xây dựng protein sinh học.

Các phân tử phức tạp ngưng tụ ở phía bên của bình



Nước đun sôi, methan, amonia và hydro

Nhiệt

Các phân tử được thu thập ở đây để phân tích

**THÍ NGHIỆM MILLER-UREY**





**TRÁI ĐẤT  
HIỆN 4,54  
TỶ NĂM**

**TUỔI VÀ LỊCH SỬ SỰ  
SỐNG CÓ THỂ ĐÃ  
BẮT ĐẦU TỪ 4,28 TỶ  
NĂM TRƯỚC**

### Sự sống từ phi sự sống

Chỉ riêng các phân tử hữu cơ đơn giản nhất là không đủ để tạo ra các tế bào. Các phân tử hữu cơ nhỏ phải liên kết với nhau thành các phân tử lớn hơn, chẳng hạn như protein và ADN. Trong trường hợp không có bất kỳ sinh vật nào tồn tại từ trước đó, các phân tử lớn sẽ tồn tại đủ lâu để được đóng gói, một cách tình cờ, trong màng dầu. Người ta cho rằng các lỗ thông hơi núi lửa dưới biển sâu – mà cho đến ngày nay vẫn rất giàu các khoáng chất có khả năng xúc tác cho phản ứng hóa học – có thể đã hoạt động giống như các “trại ươm giống” để tạo ra các tế bào nguyên sinh đầu tiên theo cách này.

**TẠI SAO  
KHÔNG CÓ SỰ SỐNG  
Ở NƠI KHÁC TRONG HỆ  
MẶT TRỜI CỦA CHÚNG TA?**

Chỉ có các điều kiện trên Trái Đất (gồm một bề mặt rắn với các đại dương nước lỏng) là “phù hợp nhất” cho sự sống – điều này đôi khi còn được gọi là Hiệu ứng Goldilocks.

#### TẾ BÀO

6

Các tế bào thực sự đầu tiên là một tập hợp các thành phần hóa học, gồm bộ sao chép và chất xúc tác, nhằm duy trì các phản ứng hóa học phụ thuộc lẫn nhau – nói cách khác, chúng trở thành vật chủ cho sự “trao đổi chất” đầu tiên.

#### TẠO MÀNG

Viên

Tấm

5

Một số phân tử hữu cơ dạng dầu, đáng chú ý là phospholipid, kết tụ thành màng một cách tự nhiên. Những màng này tồn tại dưới dạng các tấm, hoặc chúng có thể tự động bọc lại thành các viên hình cầu, để chứa đựng và cô đặc các thành phần của sự sống bên trong.

#### SAO CHÉP

ARN

4

Sự sống sinh ra sự sống, vì một số polyme có thể tự sao chép. Ngày nay, chuỗi xoắn kép của ADN là bộ sao chép chính, nhưng những sinh vật sống đầu tiên có thể đã sử dụng ARN mạch đơn có thể sao chép một cách đơn giản hơn.

#### POLYME HỮU CƠ

Chuỗi đường

Phospholipid

Peptide

3

Các phân tử lớn hơn, chẳng hạn như protein, ADN và lipid (chất béo), được tổng hợp thành các polyme – chuỗi các phân tử nhỏ hơn. Quá trình hình thành polyme có thể đã được xúc tác (tăng cường) ở những nơi giàu khoáng sản, như các đại dương sâu.



# Vạn vật tiến hóa ra sao?

Các sinh vật đa dạng từ cây sồi, con người, đến dừa cạn đều có bộ gen rất giống nhau, đến nỗi một kết luận khoa học sâu rộng là điều không thể tránh khỏi – rằng muôn loài, giống như một cây phá hệ khổng lồ, đều có nguồn gốc từ một tổ tiên chung duy nhất. Sự tiến hóa qua vô số thế hệ cũng tựa như những nhánh cây mang lại tính đa dạng cho sự sống.

## Trường hợp rùa khổng lồ Galápagos

Sự sống tiến hóa theo những cách rất đặc biệt khi bị cô lập trên các hòn đảo xa xôi. Phân tích ADN cho thấy những con rùa khổng lồ ở Galápagos có liên hệ họ hàng rất gần với rùa trên đất liền – và trong vài triệu năm, các dạng biến thể đa dạng đã xuất hiện từ một đợt “nhập cư” duy nhất.

### CHÚNG TA CÓ THỂ THẤY TIẾN HÓA XẢY RA KHÔNG?


Tiến hóa là một quá trình chậm, nhưng các quần thể sinh vật sinh sản nhanh trong phòng thí nghiệm, như ruồi giấm, đã tạo ra các chủng không thể giao phối với nhau. Những chủng này có thể coi là các loài mới.

#### 1 Biến thể

Bất kỳ quần thể tự nhiên nào cũng có sự khác biệt gây ra bởi đột biến ngẫu nhiên – lỗi trong sao chép ADN. Từng gen hiếm khi đột biến, nhưng đột biến là điều không thể tránh khỏi và được tích lũy qua thời gian dài. Chúng dẫn đến sự thay đổi về kích thước, hình dạng và màu sắc trong quần thể rùa. Biến thể này cung cấp nguyên liệu thô cho tiến hóa.

#### 2 Phân tán

Rùa Nam Mỹ, những con rùa lớn nhất thế giới – hiện đã tuyệt chủng – có lẽ chính là tổ tiên của rùa Galápagos khổng lồ ngày nay. Sau khi trôi từ bờ biển phía Tây của Nam Mỹ, theo dòng hải lưu Humboldt của Thái Bình Dương, chúng đã đến quần đảo Galápagos.



#### 3

### QUẦN ĐẢO GALÁPAGOS

#### 3 Cô lập

Khi lên bờ, những con rùa nhanh chóng bị cô lập và bắt đầu tiến hóa tách biệt với những con rùa khác trên đất liền. Những cá thể thích nghi được với môi trường sống khắc nghiệt đã có thể sống sót trên đất Galápagos khô cằn và lan khắp quần đảo. Ở những nơi khô nhất, những con rùa có “mai yên ngựa” có thể lặn mò lên các thảm thực vật cao hơn, do đó – theo thời gian – chúng trở thành loài chiếm ưu thế.

Hòn đảo lớn nhất, với môi trường sống đa dạng, có nhiều hơn một loài rùa

#### CHÚ THÍCH

- Môi trường sống ẩm ướt
- Môi trường sống khô ráo
- Môi trường sống khô cằn



Quần thể rùa đất liền tổ tiên



Rùa khổng lồ có mai tròn



Rùa khổng lồ có mai yên ngựa

San Cristobal có lẽ là hòn đảo đầu tiên mà rùa đến sống






## Kẻ thích nghi nhất mới có thể tồn tại

Biến thể di truyền có thể tạo ra khác biệt giữa sự sống và cái chết. Một loài côn trùng ăn lá với vỏ ngoài xanh lá cây có thể ẩn mình khỏi những loài ăn côn trùng, nhưng đột biến màu sắc có thể làm mất khả năng ngụy trang của nó. Những con màu xanh có nhiều khả năng sống sót và sinh sản, trong khi các màu khác thì không. Quá trình “chọn lọc tự nhiên” này là bản chất cho lý thuyết nổi tiếng của Darwin, trong đó giải thích rằng các loài tiến hóa vì một số biến thể thích nghi tốt hơn và chúng tồn tại đủ lâu để sinh ra nhiều con cái hơn. Điều ấy đã truyền cảm hứng cho nhà tư tưởng thời Victoria, Herbert Spencer, đặt ra cụm “Kẻ thích nghi nhất mới có thể tồn tại”.


### Lựa chọn của động vật săn mồi

Sâu bướm màu xanh được ngụy trang khỏi mắt động vật săn mồi. Những con đột biến màu xám và nâu bị lộ khỏi nền lá xanh và bị “đào thải” khỏi quần thể.



## Loài mới từ loài cũ

Chọn lọc tự nhiên không tự nó làm cho quần thể phân chia thành các loài mới. Để hình thành loài mới, các quần thể phải được ngăn chặn khỏi sự lai giống, bằng cách chia cách địa lý, như rìa Galápagos, hoặc bởi các rào cản hành vi hoặc rào cản sinh học, thường phát triển khi các quần thể bị tách ra. Bất cứ điều gì làm phân chia quần thể và cho sự tiến hóa đủ thời gian để tạo ra phân lập sinh sản đều có thể giúp các loài mới xuất hiện.




### Loài mới có thể hình thành như thế nào

Chọn lọc tự nhiên dẫn đến những con bướm tiến hóa khác nhau ở hai bên sườn của một dãy núi. Sau khoảng thời gian đủ lâu, sự khác biệt giữa chúng có thể lớn đến mức chúng không còn có thể giao phối.

Các quần thể đã trở thành loài mới – chúng không giao phối với nhau, ngay cả khi ở chung một nơi

## TIẾN HÓA LỚN

Những thay đổi nhỏ trong một vài thế hệ sẽ tích lũy thành biến đổi lớn qua hàng triệu năm, do đó các loài bị chia tách có thể tạo ra các nhóm sinh vật hoàn toàn mới. Đây là sự tiến hóa trên quy mô lớn, được gọi là tiến hóa lớn, và hồ sơ hóa thạch của các dạng tuyệt chủng giúp minh họa rằng từ cùng một tổ tiên chung có thể tạo nên các sinh vật rất khác biệt, như cây gỗ đỏ và hoa hướng dương.



**MỘT GIEN CÓ THỂ ĐỘT BIẾN VỚI TỶ LỆ CỰC HIẾM, CHỈ 1 TRONG 1 TRIỆU TINH TRÙNG HOẶC TRỨNG**






# Cách thực vật cung cấp nhiên liệu cho thế giới

Quá trình quang hợp tạo ra các loại đường mang lại sự sống trong các phần màu xanh lá của thực vật giúp duy trì tất cả các chuỗi thức ăn trên hành tinh. Hàng tỷ tấm pin mặt trời siêu nhỏ trong tế bào thực vật khai thác ánh sáng mặt trời để chế biến nên thức ăn từ các thành phần đơn giản nhất: nước và carbon dioxide.

Khí khổng là một trong những lỗ trên lá nhận carbon dioxide

NHẢ OXY

NHẬN CARBON DIOXIDE



## Các nhà máy của quang hợp

Lục lạp tập trung trong các tế bào ở mặt trên của lá, nơi chúng được xếp theo góc để thu được càng nhiều ánh sáng càng tốt. Có hàng chục lục lạp trên mỗi tế bào và hàng tỷ trong một chiếc lá.

MẶT TRỜI

## TẠI SAO DIỆP LỤC CÓ MÀU XANH?

Diệp lục hấp thụ các bước sóng ánh sáng đỏ và lam, sử dụng năng lượng trong ánh sáng này để quang hợp. Năng lượng của ánh sáng lục không được sử dụng và bị phản xạ trở lại - vào mắt chúng ta.

Năng lượng ánh sáng từ Mặt Trời được chuyển đổi nhờ quá trình quang hợp thành năng lượng hóa học trong đường

## Quá trình hóa học

Hơn 90% các phân tử thực phẩm hữu cơ tạo thành từ các nguyên tố carbon, hydro và oxy. Khí thực vật tạo ra thức ăn, carbon dioxide được hấp thụ từ không khí sẽ cung cấp carbon và oxy; nước được hấp thụ từ đất cung cấp hydro. Đầu tiên, năng lượng ánh sáng được hấp thụ bởi sắc tố diệp lục màu xanh lá cây sẽ phân tách hydro năng lượng cao từ nước. Tiếp theo, hydro kết hợp với carbon dioxide để tạo thành đường. Toàn bộ quá trình xảy ra trong các hạt gọi là lục lạp.

Thân cây chứa các mạch siêu nhỏ vận chuyển đường

ÁNH SÁNG ĐI VÀO LỤC LẠP

Các chồng thylakoid xếp như bánh kếp

## Bộ máy chế biến thực phẩm

Các bộ phận hoạt động của lục lạp bao gồm các ngăn màng, được gọi là thylakoid, lơ lửng trong một chất lỏng gọi là chất nền. Diệp lục liên kết với thylakoid, trong khi các enzyme thức đẩy phản ứng.



## 1 Ánh sáng mặt trời tách nước

Cấu trúc hình đĩa của thylakoid được bao phủ bằng một cụm các phân tử diệp lục và các enzyme cần thiết để chiết xuất hydro từ nước. Điều này có nghĩa là năng lượng trong ánh sáng mặt trời được truyền một cách hiệu quả sang cho hydro.

## Tạo sinh khối

**3** Một số glucose được “đốt cháy” để giải phóng năng lượng (xem trang 172-173), số khác được sử dụng trong các quá trình trao đổi chất để tạo ra nhiều chất như dầu, protein và lignin gỗ. Phần còn lại được xây dựng thành các chuỗi đường dài, chẳng hạn như tinh bột - kho năng lượng của thực vật - và cellulose dạng sợi, một vật liệu xây dựng.

Chuối đường, chẳng hạn như cellulose, được xây dựng để tạo thành các cấu trúc của cây

# ENZYME

**TRONG LÀ**

**GIÚP CHUYỂN ĐỔI CARBON  
DIOXIDE THÀNH THỨC ĂN  
LÀ LOẠI PROTEIN DỒI  
DÀO NHẤT THẾ GIỚI**



Glucose được chuyển đổi thành một loại đường hai khối gọi là sucrose, trước khi được đưa đi qua thân cây

Phân tử nước được hấp thụ carbon dioxide đi vào

Các phân tử oxy —  
phụ phẩm được giải  
phóng vào không khí  
thông qua khí khổng  
(lỗ trên lá)

## Sản xuất đường

Các hydro giàu năng lượng truyền đến chất nền. Tại đây, enzyme thêm hydro vào carbon dioxide để tạo ra đường, glucose.

## Hình thành tất cả các loại thực phẩm

Cũng như carbon, hydro và oxy, các nguyên tố khác cũng cần thiết để giữ cho các tế bào sống và hoạt động. Thực vật thu được những nguyên tố này bằng cách hấp thụ các khoáng chất (các ion hòa tan) trong đất qua rễ của nó. Nitơ, ví dụ (dưới dạng nitrat), được sử dụng để sản xuất acid amin – khối xây dựng nên protein. Phosphor giúp tạo ra ADN, vật liệu di truyền của tế bào.

# Calci

## Ion calci

**Ion**

Nitro

Ion  
phosphat

## Phosphor

Kali

Ion kali

Ion  
magnesi

## Magnesi

Ion  
sulphat

Lưu huỳnh

## Ion kali

huzar




# Thực vật phát triển như thế nào?

Vòng đời của thực vật được điều chỉnh một cách khéo léo bởi các chất kiểm soát mọi khía cạnh trong sự phát triển của chúng, từ sự nảy mầm của hạt giống đến sự nở của hoa. Những chất điều hòa tăng trưởng này được sản sinh với số lượng rất nhỏ, nhưng chúng ảnh hưởng sâu sắc đến hình dạng cuối cùng của một cây trưởng thành.

## VÂN GỖ

Tốc độ tăng trưởng của cây có thể thay đổi tùy theo nhiệt độ và lượng mưa. Tăng trưởng nhanh hơn vào mùa hè, nhưng gần như ngừng lại vào mùa đông. Những thay đổi đột ngột này tạo nên các vòng (vân) quen thuộc chạy trong một thân cây. Ngay cả ở vùng nhiệt đới, có ít hoặc không có mùa đông làm chậm sự tăng trưởng, cây vẫn thường phát triển nhanh hơn trong mùa mưa, nếu có mùa này, vì vậy chúng tạo ra những vân giống như cây ở những vùng ôn đới. Nếu cây nhiệt đới phát triển ổn định và liên tục, sẽ không có vân nào xuất hiện.



Mỗi vòng màu nhạt đánh dấu một mùa hè phát triển nhanh, vòng già nhất ở trung tâm

**MẶT CẮT NGANG CỦA THÂN CÂY**

## Kích thích tăng trưởng

Trong mỗi giai đoạn cuộc đời của thực vật, các chất điều hòa tăng trưởng khác nhau đảm bảo rằng cây sẽ phát triển nhịp nhàng ổn định. Chúng được sản sinh bởi các tế bào trong chồi, rễ hoặc lá, và từ đó thẩm qua các mô, rồi được đưa đến các bộ phận khác của cây trong dòng nhựa chảy. Kết quả có thể phụ thuộc vào sự cân bằng giữa hai hoặc nhiều chất điều hòa. Một số chất có thể chống lại nhau, trong khi những chất khác lại tăng cường lẫn nhau. Thậm chí, cùng một chất có thể có tác dụng trái ngược ở các bộ phận khác nhau của cây.

### CHÚ THÍCH



Nước



Gibberellin



Auxin



Cytokinin



Florigen

### 1 Hạt nảy mầm

Nước được hấp thụ bởi một hạt giống kích thích phôi của nó tạo ra chất điều hòa sinh trưởng gọi là gibberellin. Chất này kích hoạt một loại enzyme phá vỡ tinh bột - nguồn dự trữ năng lượng của hạt giống - thành đường, cung cấp năng lượng cho sự tăng trưởng.

HẠT GIỐNG

PHÔI

RỄ CHỒI

Gibberellin trong phôi kích thích sự nảy mầm

Nước được hấp thụ từ đất

### 2 Auxin giúp chồi phát triển

Đỉnh chồi của cây sản sinh một chất điều hòa được gọi là auxin. Chất này làm suy yếu các thành tế bào để tế bào có thể phát triển rộng hơn, giúp cho chồi mọc lên. Một số auxin còn đi xuống tận rễ.


Một số auxin đi xuống dọc trong các ống nhựa cây đang phát triển để kích thích rễ phân nhánh

Cytokinin kích thích sự phân chia tế bào, mở rộng rễ

### 3 Phát triển chồi ngọn

Auxin được tạo ra liên tục trong đỉnh chồi, nơi ảnh hưởng kéo dài của nó ngăn không cho cây phát triển các nhánh bên. Điều này giúp một cây non cao vượt qua tán của các cây lân cận. Trong khi đó, cytokinin điều tiết làm cho rễ dài ra.

Gibberellin được sản sinh trong các vùng tăng trưởng, chẳng hạn như rễ và đỉnh chồi










# Hô hấp

Muốn tiếp tục tồn tại, sự sống cần năng lượng. Năng lượng được sử dụng sâu bên trong các tế bào, nơi mà các cỗ máy rất nhỏ của sự sống chăm chỉ chế biến thức ăn, phát triển vật liệu mới, và phản ứng trước những thay đổi. Phản ứng hóa học – gọi chung là hô hấp – tạo ra năng lượng này trong một loạt các bước liên quan đến sự phân tách thực phẩm.

## Cung cấp nhiên liệu cho các tế bào


Thực tế tất cả các dạng sống – từ vi khuẩn đến cây cối – đều lấy nguồn năng lượng của chúng bằng cách phân tách glucose. Cách hiệu quả nhất để làm điều này là tách ra hoàn toàn, nghĩa là mỗi nguyên tử glucose gồm sáu carbon sẽ được tách thành sáu phân tử carbon dioxide. Nhưng quá trình này cần oxy – giống như việc đốt cháy bất kỳ nhiên liệu nào. Động vật chuyển glucose và oxy cho các tế bào trong hệ thống tuần hoàn máu của chúng. Khi glucose và oxy đã vào trong tế bào, một chuỗi các phản ứng bắt đầu trong tế bào chất và kết thúc ở ty thể – nhà máy năng lượng của tế bào. Toàn bộ quá trình nhằm giải phóng năng lượng tối đa có thể.



### 1 Vận chuyển nhiên liệu

Động vật lớn cần các mạch máu để cung cấp nguyên liệu đến tế bào: oxy có thể đến từ phổi hoặc mang, còn glucose từ ruột. Thực vật và vi khuẩn hấp thụ các yếu tố cần thiết trực tiếp từ môi trường xung quanh, nhưng thực vật tạo ra glucose bên trong tế bào của chúng bằng cách quang hợp.

Glucose được mạch máu mang theo







#### 4 Xử lý chất thải

Các phản ứng ty thể giải phóng carbon dioxide và nước. Một phần nước này có thể được sử dụng, nhưng carbon dioxide độc hại sẽ được mang đi trong máu.

SÁU PHÂN TỬ CARBON DIOXIDE

SÁU PHÂN TỬ NƯỚC

Nước có thể được sử dụng trong cơ thể, hoặc thải ra qua mồ hôi hoặc nước tiểu

GIẢI PHÓNG NĂNG LƯỢNG  
PYRUVATE

Năng lượng được giải phóng bằng cách tách pyruvate chiếm 95% năng lượng từ glucose ban đầu

#### CÂY CÓ HÍT VÀO CO<sub>2</sub> KHÔNG?

Không - trong ánh sáng mặt trời, thực vật hấp thụ carbon dioxide để tạo ra đường, nhưng hoạt động đó không phải là thở. Thực vật cũng hô hấp giống như động vật, lấy oxy và giải phóng CO<sub>2</sub>. Quá trình này mới tương tự như thở.

CÂY ĐƯỢC MỌC TRONG Bùn KHÔNG CÓ KHÔNG KHÍ VÌ VẬY RỄ CỦA CHÚNG MỌC NGƯỢC LÊN ĐỂ LẤY OXY



#### Năng lượng đi về đâu?

Tất cả các sinh vật sử dụng năng lượng để duy trì các chức năng tế bào: việc trao đổi chất cơ bản của chúng. Nhưng các chức năng khác cũng cần năng lượng, như di chuyển, tăng trưởng và sinh sản. Động vật sử dụng năng lượng tương đối nhiều so với thực vật khi di chuyển, vì sự cơ cơ đòi hỏi năng lượng. Động vật máu nóng có nhu cầu năng lượng cao nhất. Việc duy trì nhiệt độ cơ thể cao chiếm tỷ lệ khá lớn trong nhu cầu năng lượng cao này.

#### CHÚ THÍCH

- Trao đổi chất
- Sinh sản
- Tạo nhiệt cơ thể
- Tăng trưởng
- Di chuyển



#### Thực vật

Mặc dù thực vật sử dụng năng lượng ánh sáng để tạo ra dinh dưỡng trong quá trình quang hợp, chúng vẫn phải hô hấp để giải phóng năng lượng nhằm cung cấp cho các quá trình sống còn thiết yếu.



#### Rắn máu lạnh

Giống như ở các động vật khác, phần lớn năng lượng mà rắn sử dụng là cho di chuyển. Tuy nhiên, năng lượng hô hấp không được sử dụng để sưởi ấm cơ thể của rắn - chúng dựa vào Mặt Trời để làm điều này.




#### Chuột máu nóng đã trưởng thành

Các động vật máu nóng nhỏ thường mất nhiều nhiệt hơn, theo tỷ lệ cơ thể, vì vậy chúng sử dụng phần lớn nhất trong năng lượng của mình cho hệ thống sưởi ấm trung tâm của cơ thể.

#### TRAO ĐỔI KHÍ

Trái với cách hiểu phổ biến, hô hấp không có cùng nghĩa với thở. Hô hấp giải phóng năng lượng xảy ra trong tất cả các tế bào của sinh vật, nhưng thở là sự chuyển động của phổi ở động vật có phổi. Về mặt kỹ thuật, quá trình thở được gọi là thông khí, hơi thở giúp đưa nguồn cung cấp oxy tươi vào máu và loại bỏ carbon dioxide.





# Chu trình carbon

Các nguyên tử carbon được các quá trình sinh học và vật lý di chuyển qua không khí, đại dương, đất liền và trong cơ thể của các sinh vật sống. Các nguồn dự trữ carbon được gọi là các “bể chứa carbon” và – carbon di chuyển giữa chúng ở nhiều tốc độ khác nhau.


## Cân bằng tự nhiên

Mỗi năm, quá trình quang hợp tập trung đưa carbon vào thực vật và tảo bằng cách chuyển đổi carbon dioxide ( $\text{CO}_2$ ) từ không khí thành dinh dưỡng. Hô hấp và cháy tự nhiên đẩy carbon trở lại không khí với số lượng gần bằng như vậy. Một quá trình chuyển đổi chậm hơn nhiều, trải qua hàng triệu năm, đưa carbon vào các tầng đá. Nhưng khi con người đốt nhiên liệu hóa thạch, việc giải phóng  $\text{CO}_2$  từ mặt đất được tăng tốc nhanh chóng, làm tăng thêm 8,2 tỷ tấn carbon được thải ra mỗi năm.

### CHÚ THÍCH

Một số phần của chu trình carbon xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, trong khi các phần khác có thể phải mất đến hàng triệu năm.

- Chậm (hàng triệu năm)
- Nhanh, tự nhiên (trong cuộc đời của chúng ta)
- Nhanh, nhân tạo (trong cuộc đời của chúng ta)








## Cô lập carbon

Sự cháy và hô hấp do hoạt động của con người giải phóng 208,2 tỷ tấn  $\text{CO}_2$  vào khí quyển mỗi năm. Quang hợp hấp thụ 204 tỷ tấn – do đó, còn thừa lại 4,2 tỷ tấn. Sự gia tăng của  $\text{CO}_2$  – một trong số các khí nhà kính (xem trang 245) – gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu (xem trang 246-47). Công nghệ hiện đại cung cấp một số cách để các ngành công nghiệp cô lập, hay giữ lại carbon, thay vì thải nó vào khí quyển.




## ĐẠI DƯƠNG BỊ ACID HÓA

Nồng độ  $\text{CO}_2$  trong khí quyển càng tăng, càng nhiều  $\text{CO}_2$  hòa tan vào đại dương để phản ứng với nước, tạo ra càng nhiều acid carbonic. Tính từ năm 1750, nồng độ acid của đại dương đã gia tăng 30%, gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với sinh vật biển, làm ăn mòn vỏ động vật và giết chết các rạn san hô đá.



**VỎ KHỎE**



**VỎ BỊ ĂN MÒN**



# Sự lão hóa

Giống như bất cứ thứ gì có nhiều bộ phận cùng hoạt động, một sinh vật sống cũng sẽ dần bộc lộ dấu hiệu của tuổi tác. Các sinh vật sống có thể tự kiểm tra và sửa chữa bản thân, nhưng theo thời gian, cơ thể chúng sẽ bắt đầu gặp trục trặc.

## Lão hóa là gì?

Sự suy giảm chức năng sinh học theo độ tuổi có thể bắt nguồn từ tính chất suy yếu của tế bào, nhiễm sắc thể, và gen. Các tế bào của sinh vật đa bào liên tục phân chia để tạo thành các tế bào mới và thường bắt đầu thoái hóa sau 50 lần phân chia, do đó việc sản sinh các tế bào mới dần suy giảm và sau cùng thì dừng lại hoàn toàn. Điều này có liên quan đến việc cấu trúc di truyền ngày càng không ổn định, cuối cùng khiến cho các tế bào – và do đó là toàn bộ cơ thể – gặp trục trặc. Các ảnh hưởng của lão hóa bao gồm nhiều hiện tượng thoái hóa, từ việc chậm sửa chữa tế bào sau chấn thương, đến sa sút trí tuệ.

TẾ BÀO CỦA MỘT SINH VẬT TRẺ

NHÂN

NHIỄM SẮC THỂ

Telomere có độ dài đầy đủ khi sự sống mới bắt đầu

## Nhiễm sắc thể trẻ

Khi các tế bào phân chia, ADN nhân bản chính nó, sao chép mã thông tin di truyền. Các phần không mã hóa, được gọi là telomere, cung cấp một “đầu mút” – cơ chế bảo vệ nằm ở hai đầu của nhiễm sắc thể. Nhiễm sắc thể ở sinh vật trẻ có telomere dài.

Đột biến bắt đầu xuất hiện


Telomere bắt đầu ngắn đi liên tục

MỘT TRONG NHỮNG SINH VẬT CỔ XUA NHẤT TRÊN TRÁI ĐẤT LÀ MỘT CÂY THÔNG BRISTLEcone ĐƯỢC ƯỚC TÍNH ĐÃ SỐNG HƠN 5.000 NĂM

## KEM CHỐNG LÃO HÓA HOẠT ĐỘNG RA SAO?

Da nhăn nheo là do mất đi các sợi protein. Các loại kem chống lão hóa có chứa chất chống oxy hóa và các khối xây dựng protein giúp tăng sản sinh các loại sợi này, nhờ vậy nó giúp da săn chắc hơn.





## LÀM CHẬM LÃO HÓA

Có một số loại thuốc thử nghiệm đã được chứng minh là có tác dụng chống lại hoặc sửa chữa tổn thương ADN. Ngoài ra, trong tương lai, liệu pháp gen (xem trang 182-183) có thể được sử dụng để khởi động lại các tế bào già nua. Tuy nhiên, những nỗ lực để làm chậm lão hóa hoặc thậm chí đảo ngược nó vẫn chưa được chứng minh và còn gây nhiều tranh cãi. Thay đổi lối sống, chẳng hạn như tập thể dục thường xuyên và có chế độ ăn uống lành mạnh, vẫn là cách tốt nhất để giảm nguy cơ các rối loạn thoái hóa xảy ra ở tuổi già - và do đó kéo dài tuổi thọ.



Thuốc



Liệu pháp gen



Chế độ ăn uống



Tập thể dục



# Bộ gen

Thông tin di truyền của một sinh vật sống được chứa trong các phân tử ADN, một bộ ADN hoàn chỉnh được gọi là bộ gen. Phân tích bộ gen trong phòng thí nghiệm cho phép chúng ta nghiên cứu một số gen nhất định, hiểu cách chúng hoạt động và thậm chí tạo ra một “vân tay ADN” độc nhất cho một cá nhân.

## ADN được tổ chức ra sao?

ADN chứa các phân tử được gọi là gen, cung cấp thông tin để tạo protein (xem trang 158-159). Các phân tử ADN bên trong vi khuẩn trôi tự do trong bào tương, nhưng các sinh vật có tế bào phức tạp hơn – như thực vật và động vật – có nhiều chuỗi ADN cực dài, cuộn lại bên trong nhân tế bào. Trong quá trình phân chia tế bào, chúng cuộn chặt hơn, tạo thành nhiễm sắc thể, để ngăn chúng khỏi bị rối vào nhau.

Một nhiễm sắc thể gồm các sợi ADN xoắn chặt vào nhau


Các cặp nhiễm sắc thể chứa các loại gen giống nhau

TẾ BÀO

NHÂN

### Bộ gen người

Bộ gen người hoàn chỉnh được tạo thành từ 23 cặp nhiễm sắc thể.



## ADN rác



Các gen thường được phân tách bằng các đoạn ADN dài không chứa mã tạo protein. Một số trong nhóm ADN không mã hóa này kiểm soát việc các gen được “bật” hay “tắt”, giúp tế bào tập trung thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Ngoài ra, ADN ở động vật và thực vật còn chứa các chuỗi không mã hóa trong gen. Được gọi là intron, các phần này sẽ được xóa khỏi mã trước khi protein được tạo ra. Intron có thể giúp nối các phần mã hóa khác nhau của một gen, để một gen có thể tạo ra các sản phẩm protein khác nhau. Tuy nhiên, một số ADN, cho dù nằm giữa các gen hoặc nằm trong gen, lại không có mục đích rõ ràng. Có tên gọi phổ biến là ADN rác, nhóm này có thể đã mất chức năng trong quá trình tiến hóa.





## Nhận dạng ADN

Trình tự các nucleobase hóa học trong một ADN riêng lẻ (xem trang 158-159) mang tính duy nhất – ngoại trừ các cặp song sinh cùng trứng. Điều này có nghĩa là ADN là một công cụ đáng gờm để so sánh mẫu máu, nước bọt, tinh dịch hoặc vật liệu sinh học khác. Kỹ thuật nhận dạng ADN – hoặc vân tay ADN – so sánh các phần lặp lại của ADN được gọi là các trình tự lặp lại ngắn (STR) vốn có độ dài khác nhau giữa các cá nhân.



Như trong các gen khác, chỉ có một phần nhỏ của gen 3 tham gia mã hóa protein

### GIEN 3


Intron trong gen có thể kiểm soát khi nào thì gen hoạt động, hoặc nó có thể chứa những ADN “rác” vô dụng

**NẾU ADN TRONG MỘT TẾ BÀO NGƯỜI ĐƯỢC MỞ XOẺ, NÓ SẼ KÉO DÀI ĐẾN HƠN 2 M**



## DỰ ÁN BẢN ĐỒ GIEN NGƯỜI

Năm 2003, Dự án Bản đồ Gen Người đã hoàn thành – đây là một nỗ lực hợp tác quốc tế của các nhà nghiên cứu bắt đầu vào năm 1990, nhằm tìm cách ghi lại chuỗi 3 tỷ khối xây dựng ADN của con người, các nucleobase. Mặc dù trình tự gen cụ thể là khác nhau giữa các cá nhân, dự án đã xuất bản một chuỗi trung bình nhờ một số nhà hiến tặng ẩn danh. Nó mở đường cho sự hiểu biết lớn hơn về gen của con người nói chung.





# Kỹ thuật di truyền


Thông tin di truyền được liên kết chặt chẽ với “danh tính” của một sinh vật sống, đến nỗi việc chúng ta có thể điều khiển nó quả là thành tựu đáng kinh ngạc. Nhưng khoa học ngày nay đã có thể biến đổi thông tin di truyền để thay đổi đặc điểm, vì lợi ích của y học và nhiều lĩnh vực khác.

## Viết lại dữ liệu di truyền



Kỹ thuật di truyền liên quan đến việc thay đổi cấu trúc di truyền của một sinh vật sống bằng cách thêm vào, loại bỏ hoặc thay đổi gen. Vì gen là các phần mã hóa protein của ADN (xem trang 158), việc thay đổi chúng theo những cách chính xác làm thay đổi khả năng tạo protein của chúng, dẫn đến thay đổi các đặc điểm trong một sinh vật. Các gen mục tiêu có thể được cắt từ nhiễm sắc thể (xem trang 178) hoặc sao chép từ vật liệu di truyền gọi là ARN (xem trang 158-159). Mỗi bước được điều khiển bởi một chất xúc tác hóa học cụ thể gọi là enzyme.

### Chế tạo insulin

Mã di truyền để sản xuất insulin có thể được chiết xuất từ tế bào người và đưa vào vi khuẩn, sau đó chúng có thể được sử dụng làm nhà máy sống để cung cấp insulin giúp điều trị cho bệnh nhân tiểu đường. Mã được lấy từ các bản sao ARN của tế bào, vốn dễ chiết xuất hơn ADN, và cũng đã được chỉnh sửa để loại bỏ các phần không mã hóa của chúng (xem trang 179).



**CÁ BIẾN ĐỔI GEN CÓ KHẢ NĂNG PHÁT SÁNG TRONG BÓNG TỐI HIỆN ĐƯỢC BÁN LÀM THÚ CUNG TẠI MỸ**







## Tại sao chúng ta muốn thay đổi gen?

Kỹ thuật di truyền có thể cực kỳ hữu ích. Ngoài việc sử dụng vi khuẩn để sản xuất hàng loạt các protein quan trọng về mặt y tế, thực vật và động vật có thể có được các đặc điểm mong muốn về mặt nông nghiệp, trong khi liệu pháp gen có khả năng điều trị các rối loạn di truyền.

### VÍ DỤ VỀ KỸ THUẬT DI TRUYỀN



**Sản phẩm y tế:** Không giống như protein có nguồn gốc từ động vật, những protein được tạo ra bởi các vi khuẩn biến đổi gen có thể được sản xuất hàng loạt.



**Thực vật và động vật biến đổi gen (GM):** Thực vật và động vật có thể được sửa đổi gen để cải thiện giá trị dinh dưỡng của chúng, hoặc tăng sức chống chịu với hạn hán, bệnh tật và sâu bệnh.



**Liệu pháp gen (xem trang 182-183):** Các tế bào mang một rối loạn di truyền có thể tạm thời được đưa vào hoạt động bình thường bằng cách chèn vào một gen hoạt động.


## CHÈN GEN CÓ NÊN ĐƯỢC THỰC HIỆN RỘNG RÃI?

Việc đưa các loài thực vật có gen ngoại lai vào môi trường làm dấy lên lo ngại rằng chúng có thể lan rộng ra khỏi tầm kiểm soát, và trở thành “siêu cỏ dại” trong tự nhiên. Cây trồng biến đổi gen thậm chí có thể vô tình thụ phấn cho cây dại, từ đó phát triển thành cây cỏ nông nghiệp gây hại. “Dòng gen” di chuyển giữa các thực vật biến đổi gen và thực vật không biến đổi gen đã được ghi nhận, nhưng vẫn chưa có sự đồng thuận khoa học về tiềm năng tác động lên môi trường của nó.



### 4 Chuẩn bị chèn

Các vòng ADN được gọi là plasmid (xuất hiện tự nhiên bên trong vi khuẩn) được cắt mở ra bằng một loại enzyme đặc biệt. Phần sợi đơn nhỏ ra ở đầu cắt có một trình tự nucleotide cụ thể.




Plasmid với gen insulin được đưa vào vi khuẩn

Insulin được sản xuất bởi vi khuẩn



### 5 Chèn gen

Các đầu sợi đơn được gắn vào ADN chứa gen. Những phần nhỏ ra ở ADN này bổ sung cho đầu sợi trên plasmid, vì vậy chúng đã sẵn sàng để ghép nối. Đoạn nối được dán lại bằng một enzyme khác để tạo ra các plasmid chứa gen insulin.



### 6 Sản xuất insulin

Vi khuẩn bây giờ đã có plasmid biến đổi gen chứa gen tạo insulin. Các plasmid này sao chép được khi vi khuẩn sinh sản. Các vi khuẩn tạo ra insulin, có thể được tách ra và tinh chế từ nuôi cấy.




# Liệu pháp gen

Một số loại bệnh đòi hỏi cách tiếp cận đặc biệt phức tạp để điều trị cho bệnh nhân – sử dụng ADN làm thuốc. Liệu pháp gen cung cấp cho các tế bào thông tin di truyền để thay đổi hành vi của chúng nhằm chữa trị một căn bệnh.


## Liệu pháp gen hoạt động như thế nào?

Gen là các phần của ADN chứa chỉ thị để hướng dẫn tế bào tạo ra các loại protein cụ thể. Bằng cách chèn một gen vào một tế bào, liệu pháp gen có thể bù đắp cho việc ADN bị lỗi không tạo ra protein hoạt động, hoặc thúc đẩy một nhiệm vụ mới nhằm chống lại bệnh tật. Kỹ thuật này có thể có tác dụng đối với các bệnh gây ra bởi một gen duy nhất (chẳng hạn như u xơ nang), nhưng vô dụng với các bệnh gây ra bởi tác động kết hợp của nhiều gen. Gen chữa bệnh được đưa vào trong tế bào nhờ một hạt gọi là vector, có thể là một virus bị vô hiệu hóa hoặc một giọt dầu nhờn tên là liposome.



### 1 U xơ nang

Những người mắc bệnh u xơ nang có tế bào phổi bệnh với các gen rối loạn chức năng giữ vai trò mã hóa đóng các protein kênh. Điều này có nghĩa là chất nhầy lót trong đường thở của họ quá đặc, gây khó thở.



## CÁC NGHIÊN CỨU LIỆU PHÁP GEN HIỆN ĐANG NHẪM VÀO MỘT SỐ LOẠI UNG THƯ NHẤT ĐỊNH



### LIỆU PHÁP GEN CÓ LÀ MỘT PHƯƠNG PHÁP CHỮA TRỊ VĨNH VIỄN?

Các tế bào chứa gen điều trị có thể phân chia, nhưng cuối cùng chúng sẽ chết và được thay thế bằng các tế bào bị bệnh, vì vậy các liệu pháp hiện tại chỉ điều trị trong thời gian ngắn và bệnh nhân vẫn cần điều trị nhiều lần.





### LIPOSOME MANG GIEN MỚI



### GIEN MỚI

Liposome kết nối  
với màng tế bào, giải  
phóng gen mới

Gen mới di chuyển  
đến nhân tế bào

Chloride đi  
qua protein  
kênh

Chất nhầy hấp  
thụ nước, làm  
cho nó loãng và  
dễ chảy hơn

### CHẤT NHẦY CHẢY LOÃNG

### PROTEIN KÊNH MỚI

Protein kênh  
mới có thể  
mở, cho phép  
chloride đi qua

Các acid amin được  
mã hóa bởi gen mới  
tạo ra các protein kênh  
hoạt động

## 2 Gen được thêm vào


Được đưa vào cơ thể qua ống hít, liposome mang các protein kênh hoạt động - gen protein quét qua đường thở và được hấp thụ vào các tế bào của lớp lót. Tại đây, chúng kết hợp với các ADN khác bên trong hạt nhân tế bào.

## 3 Gen phục hồi chức năng

Các gen mới hướng dẫn các tế bào tạo ra các protein kênh hoạt động, cho phép chloride tan vào chất nhầy. Chất nhầy nhiễm muối hấp thụ nước từ các tế bào và do đó trở nên loãng hơn - làm cho việc thở dễ dàng hơn.


### Giết chết các tế bào cụ thể

Các "gen tự sát" đặc biệt nhắm vào các tế bào bị bệnh có thể khiến các tế bào này tự tiêu hủy, hoặc đánh dấu chúng là mục tiêu mà hệ thống miễn dịch cần tấn công.



## GIEN MỚI CÓ THỂ ĐƯỢC DI TRUYỀN?

Liệu pháp gen truyền thống - được gọi là liệu pháp gen tế bào sinh dưỡng - chèn gen vào các tế bào cơ thể không liên quan đến việc sản xuất trứng hoặc tinh trùng. Khi các tế bào này nhân lên, các gen được sao chép sẽ ở lại trong các mô bệnh và không được truyền sang con cái. Liệu pháp gen dòng mầm - bị phản đối rộng rãi vì lý do phi đạo đức - sẽ thêm gen vào tinh trùng hoặc trứng để gen có thể được di truyền.





# Tế bào gốc


Cơ thể động vật được tạo thành từ các tế bào chuyên biệt cho từng nhiệm vụ như vận chuyển oxy, hoặc tạo xung thần kinh. Từ khi trong phôi đến tuổi trưởng thành, chỉ có một ngân hàng nhỏ gồm các tế bào sáng lập không mang tính biệt hóa, được gọi là tế bào gốc, là duy trì khả năng sáng tạo đa dạng này – một tiềm năng có thể được sử dụng để chữa bệnh.

## Phân loại tế bào gốc

Chẳng mấy ngạc nhiên khi phôi thai chính là nơi có các tế bào có tiềm năng lớn nhất để hình thành các mô khác nhau. Một quả bóng nhỏ các tế bào phôi sẽ dần phát triển thành tất cả các bộ phận của cơ thể. Nhưng khi các bộ phận này trở nên biệt hóa, các tế bào của chúng cũng mất đi tính linh hoạt, vì chỉ tập trung vào các nhiệm vụ chuyên biệt. Chỉ một số bộ phận của cơ thể, chẳng hạn như tủy xương, là còn giữ lại các tế bào gốc, nhưng khả năng đa dạng hóa của chúng cũng khá hạn chế.

### KHÍA CẠNH ĐẠO ĐỨC CỦA VIỆC THU THẬP TẾ BÀO GỐC

Tế bào gốc phôi có tiềm năng lớn nhất trong trị liệu, nhưng nhiều người coi việc sử dụng phôi người là không thể chấp nhận được về mặt đạo đức, và hành động lấy tế bào gốc từ phôi là bất hợp pháp ở một số quốc gia. Tế bào gốc trưởng thành – chẳng hạn như từ tủy xương hoặc dây rốn – giúp giải quyết những lo ngại này, nhưng chúng có tiềm năng hạn chế và không hữu ích bằng trong việc nghiên cứu các phương pháp điều trị cho các bệnh bao gồm bệnh tiểu đường và bệnh Parkinson.




### Tế bào gốc phôi trong giai đoạn trước nhất

Khi nó vẫn còn là một quả bóng dạng rắn gọi là phôi dâu, phôi trong giai đoạn trước nhất có các tế bào với tiềm năng phát triển tối đa. Mỗi trong số các tế bào gốc gọi là “tế bào toàn năng” (totipotent) này có khả năng hình thành bất kỳ bộ phận nào của phôi; ở hầu hết các động vật có vú, nó còn bao gồm các màng mà cuối cùng sẽ hình thành nhau thai.

## Liệu pháp tế bào gốc



Tiềm năng của tế bào gốc có thể giúp phát triển các mô khỏe mạnh để điều trị bệnh. Chẳng hạn, ghép tủy xương dựa vào khả năng hình thành tế bào máu của tế bào gốc trưởng thành để điều trị các rối loạn về máu như bệnh bạch cầu. Liệu pháp tế bào gốc cũng có thể khôi phục các tế bào sản xuất insulin ở bệnh nhân tiểu đường. Việc điều trị thực nghiệm, thường là trên động vật, đang sử dụng tế bào gốc phôi, hoặc tế bào gốc trưởng thành được xử lý hóa học để tăng tiềm năng của chúng.







## TRONG MỘT THỬ NGHIỆM, 50% BỆNH NHÂN BỊ CHẤN THƯƠNG TỦY SỐNG THAM GIÁ TRỊ LIỆU TẾ BÀO GỐC ĐÃ HỒI PHỤC ĐƯỢC MỘT SỐ CHUYỂN ĐỘNG



### Tế bào gốc phôi trong giai đoạn đầu

Khi phôi chuyển sang giai đoạn tiếp theo – một khối tế bào rỗng gọi là phôi nang – bước đầu tiên của quá trình biệt hóa đã hoàn thành. Ở hầu hết các động vật có vú, lớp tế bào bên ngoài giúp hình thành nhau thai. Chỉ có khối tế bào bên trong, chứa các tế bào gốc “vạn năng” (pluripotent), mới có thể tạo thành các bộ phận của cơ thể phôi thai.

### Tế bào gốc trưởng thành

Các tế bào gốc cũng tồn tại trong bộ phận của cơ thể trưởng thành, nhưng chúng chỉ có thể phát triển thành một phạm vi hạn chế các loại tế bào, và được mô tả là “tế bào đa năng” (multipotent). Ví dụ, hầu hết tủy xương của cơ thể chứa các tế bào gốc đa năng vốn có thể biệt hóa thành các loại tế bào máu khác nhau.

### 3 Biệt hóa


Các tế bào gốc chuyển đổi thành các tế bào thần kinh: chúng phát triển các sợi dài có thể mang các xung thần kinh điện.



**TẾ BÀO THẦN KINH**

### 4 Chuyển vào cơ thể

Các tế bào được tiêm vào dịch lỏng xung quanh phần bị tổn thương của tủy sống, phần gồm các tế bào thần kinh.



### 5 Sửa chữa

Ở một số bệnh nhân, các tế bào thần kinh mới sẽ phát triển để sửa chữa phần bị tổn thương của tủy sống, với mục đích đảo ngược tình trạng tê liệt.



Các tế bào thần kinh được cấy ghép phát triển các sợi nối phần tủy sống bị phá vỡ



# Nhân bản

Bản sao là những sinh vật giống hệt nhau về mặt di truyền. Công nghệ có thể giúp nhân bản vô tính một cách nhân tạo, nhưng nó còn chứa đựng hàm nghĩa cho y học và hơn thế nữa.

## Nhân bản hoạt động ra sao?

Trọng tâm của việc nhân bản là ADN tự sao chép thúc đẩy sự phân chia tế bào và nhân giống bất kỳ sinh vật sống nào có thể sinh sản vô tính. Các kỹ thuật trong phòng thí nghiệm đã vượt xa điều này, với khả năng tác động lên các loại tế bào và mô chưa biệt hóa để tạo bản sao vô tính theo những cách không xảy ra trong tự nhiên.

### SONG SINH CÓ PHẢI LÀ BẢN SAO?


Có - song sinh cùng trứng có thể coi là bản sao. Sự kiện này phát sinh khi một trứng được thụ tinh tách thành hai tế bào riêng biệt bên trong bụng mẹ. Sau đó chúng phát triển thành phôi giống hệt nhau về mặt di truyền.

### NHÂN BẢN TỰ NHIÊN




#### Sinh sản vô tính ở vi khuẩn

Vi sinh vật, chẳng hạn như vi khuẩn, sinh sản vô tính bằng cách tự nhân bản chính mình. Ngay trước khi phân chia tế bào, ADN được sao chép. Các bản sao ADN giống hệt nhau sẽ đi đến từng tế bào.



#### Sinh sản vô tính ở thực vật


Hệ thống rễ ngầm được gọi là thân rễ có chứa các mô cần thiết để mọc lên những cây con mới giống hệt với cây mẹ. Cây dương lá rung có thể tạo ra những mảng bản sao vô tính lớn nhất trên hành tinh.



#### Nuôi cấy mô

Các bộ phận của cây có thể được kích thích để phát triển thành cây mới, nếu chúng được xử lý bằng các hóa chất gọi là chất điều hòa sinh trưởng. Cây nhỏ mọc lên trong một loại thạch vô trùng giàu dinh dưỡng, trước khi được chuyển vào đất.

### NHÂN BẢN NHÂN TẠO




#### Phân mảnh phôi

Các kỹ thuật nhân bản động vật thành công đầu tiên liên quan đến việc tách phôi. Nếu được thực hiện ở giai đoạn đủ sớm, các tế bào không biệt hóa ở phôi sẽ bảo toàn tiềm năng hình thành tất cả các bộ phận của cơ thể sinh vật.






# DÊ RỪNG PYRÉNÉE LÀ LOÀI ĐỘNG VẬT ĐẦU TIÊN ĐƯỢC HỒI SINH TỪ TUYỆT CHỦNG, NHƯNG NÓ ĐÃ CHẾT SAU 7 PHÚT




## HỒI SINH CÁC LOÀI TUYỆT CHỦNG?

Các mẫu vật được bảo tồn cung cấp triển vọng hấp dẫn là hồi sinh các loài tuyệt chủng. Tuy nhiên, ADN bị xuống cấp theo thời gian – điều này có nghĩa là ADN cũ thiếu các chỉ thị quan trọng để tạo ra một phôi thai khả thi. Các nhà khoa học thành công thu được trình tự nguyên vẹn đáng kể của DNA từ các mô đông lạnh của voi ma mút – nhưng nó vẫn quá hư hỏng và không đầy đủ để áp dụng phương pháp nhân bản. Các nhà khoa học đang lên kế hoạch ghép các gen của voi ma mút và voi châu Á (họ hàng gần nhất với voi ma mút) để tạo ra một phôi tạp chủng có thể được nuôi cấy trong tử cung nhân tạo. Tuy nhiên, điều này cũng làm dấy lên lo ngại về đạo đức.




VOI MA MÚT



### Chuyển nhân tế bào sinh dưỡng

Nhân bản có thể được tạo ra từ mô cơ thể (mô sinh dưỡng). Một tế bào trứng, được loại bỏ nhân của chính nó, tái lập trình nhân tế bào cơ thể với khả năng tạo ra một bản sao. Cừu Dolly đã được nhân bản bằng kỹ thuật này.









# VỮ TRỤ



# Sao

Một ngôi sao là một quả bóng khí phát sáng khổng lồ, xuất hiện khi các phản ứng hạt nhân đốt cháy lõi của nó. Những ngôi sao lớn nhất cháy sáng rực rỡ nhưng cũng mờ đi rất nhanh so với những ngôi sao nhỏ hơn, vốn đốt cháy nhiên liệu chậm hơn. Khối lượng của sao cũng quyết định bản chất cái chết của nó.

## Sự ra đời của một ngôi sao

Các ngôi sao phát sinh từ trong những đám mây bụi và khí liên sao đóng băng được gọi là tinh vân. Các khối khí vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, và nếu khối lượng riêng của chúng trở nên đủ lớn, chúng sẽ nổ tung bởi chính lực hấp dẫn của mình và giải phóng ra nhiệt. Nếu lượng nhiệt sinh ra đủ cho phản ứng nhiệt hạch hạt nhân (xem trang 193), một ngôi sao sẽ ra đời. Quá trình này có thể mất đến vài triệu năm.




## SAO SỐNG ĐƯỢC BAO LÂU?


Độ dài vòng đời của một ngôi sao phụ thuộc vào kích thước của nó. Những ngôi sao lớn nhất có thể tồn tại trong vài trăm nghìn năm, trong khi những ngôi sao nhỏ nhất có thể cháy tới hàng nghìn tỷ năm.

## Sự sống và cái chết của một ngôi sao

Hầu hết các tiền sao sẽ tiếp tục trở thành sao trung bình hoặc sao "dây chính", có khả năng duy trì sự ổn định nhờ vào cân bằng lực: áp lực bên ngoài từ luồng khí nóng nở rộng và lực hấp dẫn bên trong. Vòng đời của một ngôi sao phụ thuộc vào khối lượng của nó, và nó cũng sẽ thay đổi kích thước, nhiệt độ và màu sắc khi già đi. Một số ngôi sao biến mất, số khác lại nổ trong siêu tân tinh, cung cấp nguyên liệu hình thành các ngôi sao và hành tinh mới. Vì hầu hết các nguyên tố trong Vũ trụ được tạo ra bởi phản ứng hạt nhân trong các ngôi sao, có thể nói rằng thế giới của chúng ta được tạo nên từ bụi sao.







### “TÁI CHẾ” MỘT NGÔI SAO

Vụ Nổ Lớn chỉ tạo ra hydro, heli và một ít lithi. Gần như tất cả các nguyên tố nặng khác đều được tạo thành trong các ngôi sao hoặc trong các vụ nổ siêu tân tinh. Khi đó, siêu tân tinh sẽ phát ra các vật chất này, tạo nên các ngôi sao và hành tinh mới.

- 1 Các nguyên tố nặng được đưa vào đám mây phân tử, mà sau đó sẽ co sụp
- 2 Các khối khí co sụp dần nóng lên, tạo thành các tiền sao
- 3 Sao hình thành, với các phản ứng nhiệt hạch ổn định
- 4 Sao nổ phát ra vật liệu, bắt đầu lại chu kỳ




# Mặt Trời

Mặt Trời là ngôi sao gần chúng ta nhất. Nó là một sao lùn màu vàng – một ngôi sao có kích thước trung bình – và tạo ra năng lượng của nó nhờ phản ứng nhiệt hạch. Mặt Trời được ước tính là đã trải qua một nửa vòng đời của nó và sẽ tiếp tục ổn định trong khoảng 5 tỷ năm nữa.

## Bên trong và bên ngoài Mặt Trời

Mặt Trời bao gồm chủ yếu là khí hydro và khí heli ở trạng thái plasma, khối khí nóng đến mức các nguyên tử của nó bị mất electron và bị ion hóa (xem trang 20-21). Mặt Trời có sáu vùng: bên trong cùng là lõi trung tâm, nơi diễn ra phản ứng tổng hợp hạt nhân, bao quanh nó là các vùng bức xạ và đối lưu; bên ngoài là bề mặt có thể nhìn thấy, hay quang quyển, được bao quanh bởi sắc quyển, và vùng ngoài cùng nhất là vành nhật hoa.




LÕI

Phản ứng nhiệt hạch xảy ra trong lõi, nơi nhiệt độ đạt 15 triệu độ C, tạo ra toàn bộ lượng nhiệt và ánh sáng cho Mặt Trời

Trong vùng bức xạ, các photon nhảy từ hạt này sang hạt khác trước khi thoát ra ngoài

Nhiệt độ trong vùng đối lưu, nơi các bong bóng plasma nóng di chuyển lên trên, giảm xuống 1,5 triệu độ C



**CÁC NGUYÊN TỐ NẶNG 2%**

oxy, nitơ, carbon, neon, sắt và các chất khác

Vành nhật hoa, lớp ngoài cùng của Mặt Trời, mở rộng ra ngoài không gian

Các vết đen mặt trời là các vùng tương đối mát và tối của quang quyển gây ra bởi mật độ từ trường mặt trời, ức chế sự truyền nhiệt ra bên ngoài

**TRONG HỆ MẶT TRỜI, MẶT TRỜI LÀ VẬT THỂ CÓ HÌNH DÁNG GẦN NHẤT VỚI MỘT KHỐI CẦU HOÀN HẢO**







## Hoạt động của Mặt Trời và Trái Đất

Những thay đổi trong hoạt động trên bề mặt của Mặt Trời có thể được cảm nhận trên Trái Đất. Trên đường đến Trái Đất, các hạt trong sự giải phóng vật chất vành nhật hoa có thể xuyên qua vỏ tàu vũ trụ (gây nguy hiểm cho các phi hành gia), vô hiệu hóa các vệ tinh, và tạo ra dòng điện với cường độ cao trong lưới điện ở mặt đất. Hoạt động của vết đen mặt trời cũng ảnh hưởng đến khí hậu Trái Đất. Hoạt động mạnh của vết đen Mặt Trời dẫn đến tăng nhẹ bức xạ mặt trời. Thời điểm mà các vết đen Mặt Trời không xuất hiện cũng có liên quan đến những thời kỳ lạnh giá trong lịch sử Trái Đất.

Tai lửa mặt trời là một vòng plasma kéo dài ra ngoài không gian, mặc dù nó vẫn gắn liền với quang quyển

Vết lóa Mặt Trời là một cú nổ bức xạ dữ dội do sự giải phóng năng lượng từ tính liên quan đến các vết đen Mặt Trời


Sự giải phóng vật chất vành nhật hoa là sự giải phóng plasma lớn bất thường từ vành nhật hoa

Sắc quyển là một lớp mỏng thuộc khí quyển Mặt Trời - ta có thể thấy nó trong nhật thực toàn phần, trong hình dáng một vành đỏ quanh rìa của Mặt Trời

Bức xạ thoát ra khỏi quang quyển, nơi có nhiệt độ 5.500°C, xuất hiện trước chúng ta dưới dạng ánh sáng mặt trời

## NGUỒN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Khối lượng lớn của Mặt Trời tạo ra áp suất và nhiệt độ lớn ở lõi, nơi xảy ra phản ứng nhiệt hạch. Hạt nhân của các nguyên tử hydro, mỗi hạt gồm một proton duy nhất, hợp nhất với các hạt nhân hydro khác để tạo thành hạt nhân heli. Trong quá trình này, các hạt hạ nguyên tử và bức xạ khác được giải phóng - đồng thời cũng mang theo lượng năng lượng khổng lồ.



## PHẢN ỨNG TỔNG HỢP HẠT NHÂN TRONG MẶT TRỜI

Lỗ nhật hoa là các khu vực mà mật độ plasma thấp hơn, tương đối lạnh và tối

## ÁNH SÁNG MẶT TRỜI MẤT BAO LÂU ĐỂ ĐẾN TRÁI ĐẤT?

Có thể mất vài trăm nghìn năm để một photon di chuyển từ lõi Mặt Trời đến bề mặt của nó. Nhưng sau đó, chỉ mất tám phút để photon đến Trái Đất.



# Hệ Mặt Trời


Hệ Mặt Trời bao gồm Mặt Trời - ngôi sao địa phương của chúng ta - nằm ở vị trí trung tâm và tám hành tinh quay quanh nó. Nó cũng bao gồm hơn 170 mặt trăng, một số hành tinh lùn, tiểu hành tinh, sao chổi và các thiên thể khác.

## Hệ Mặt Trời hình thành như thế nào?

Hệ Mặt Trời của chúng ta xuất hiện khi một đám mây khí và bụi đóng băng gọi là tinh vân ngưng tụ và bắt đầu quay (xem trang 190). Mặt Trời hình thành tại vùng trung tâm nóng của đĩa quay này, trong khi các vật chất ở xa hơn trở thành các hành tinh và mặt trăng. Chỉ có vật chất đá mới chịu được sức nóng gần Mặt Trời, tạo thành các hành tinh ở vòng trong, trong khi vật chất khí đóng băng lắng xuống các khu vực phía ngoài đĩa quay để tạo thành các hành tinh vòng ngoài.



## KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA SAO THỎ THẤP ĐẾN MỨC HÀNH TINH NÀY SẼ TRÔI LỎNG TRONG NƯỚC



Bạn đang ở đây

### Vị trí của chúng ta trong Dải Ngân Hà

Hệ Mặt Trời của chúng ta thuộc về một nhánh bên trong của Dải Ngân Hà. Mặt Trời là một trong khoảng 100-400 tỷ ngôi sao của thiên hà này.

## HỆ MẶT TRỜI BAO NHIÊU TUỔI?

Hệ Mặt Trời có lẽ vào khoảng 4,6 tỷ năm tuổi. Tuổi này được ước tính bằng cách đo sự phân rã phóng xạ của vật liệu trong các thiên thạch rơi xuống Trái Đất.

### Sao Mộc

Hành tinh lớn nhất, Sao Mộc, là nơi có Vết Đỏ Lớn - một cơn bão 300 năm tuổi.

779 triệu km  
Cách Mặt Trời

### Mặt trăng Sao Mộc

Sao Mộc có 69 mặt trăng, trong đó mặt trăng lớn nhất, Ganymede, thậm chí còn lớn hơn Sao Thủy. Mặt trăng Europa được cho là có nước lỏng bên dưới bề mặt băng giá của nó.

Khoảng cách trung bình từ Mặt Trời  
228 triệu km

### Sao Hỏa

Trọng lực trên Hành Tinh Đỏ đóng băng băng khoảng một phần ba trọng lực Trái Đất.

Đường kính 6.792 km

150 triệu km  
Cách Mặt Trời

**Trái Đất**  
Hành tinh đặc nhất. Nước bao phủ 70% bề mặt của nó.

Đường kính 12.756 km

108 triệu km  
Cách Mặt Trời

### Sao Kim

Hành tinh nóng nhất, Sao Kim, quay chậm đến mức ngày của nó còn dài hơn năm của nó.

Đường kính 12.104 km

### Sao Thủy

Hành tinh nhỏ nhất, Sao Thủy, quay quanh Mặt Trời với tốc độ 47 km mỗi giây.

Đường kính 4.879 km

MẶT TRỜI







## CÁC HÀNH TINH LÙN


Các hành tinh lùn, như Sao Diêm Vương, có đủ lực hấp dẫn và khối lượng để tạo thành một khối cầu trực tiếp quay quanh Mặt Trời. Tuy nhiên, không giống như các hành tinh khác, chúng chưa có quỹ đạo rõ ràng, và vẫn chia sẻ nó với các tiểu hành tinh và sao chổi.



**SAO DIÊM VƯƠNG**

## Quỹ đạo hành tinh

Một hành tinh càng gần Mặt Trời, nó càng bị ảnh hưởng bởi lực hấp dẫn của Mặt Trời, tạo ra tốc độ quay quanh Mặt Trời lớn hơn. Sao Thủy, hành tinh gần nhất, có tốc độ nhanh nhất, trong khi Sao Hải Vương, hành tinh xa nhất, quay chậm nhất. Quỹ đạo của mỗi hành tinh là một hình elip, biến dạng đôi chút bởi các lực của các hành tinh tác động lên nhau.





# Vật chất trôi nổi trong không gian

Khi Hệ Mặt Trời hình thành, các mảnh đá và băng tạo nên nhiều thiên thể có kích cỡ khác nhau, trong đó những mảnh lớn nhất trở thành các hành tinh. Các mảnh còn lại trở thành thiên thạch, tiểu hành tinh và sao chổi, đôi khi rơi xuống Trái Đất.

## Thiên thạch

Các thiên thạch là "hạt" của tiểu hành tinh hoặc sao chổi. Những mảnh đá hoặc kim loại nhỏ này thường có kích thước bằng hạt cát hoặc đá cuội, nhưng đôi khi cũng đạt tới đường kính hơn một mét. Các thiên thạch rơi qua bầu khí quyển của một hành tinh, dần trở nên nóng sáng trong quá trình rơi đó, tạo thành hiện tượng có tên gọi là sao băng. Những mảnh còn sót lại và đến được mặt đất được gọi là vụn thạch. Khoảng 90 đến 95% sao băng bị đốt cháy hoàn toàn khi đi qua khí quyển Trái Đất. Độ sáng của chúng trên bầu trời có liên quan nhiều đến tốc độ hơn là kích thước của chúng.

Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS đôi khi phải thay đổi hướng để tránh các mảnh vỡ không gian. Một vụ va chạm tiềm ẩn được cho là nguy hiểm nếu xác suất xảy ra va chạm là 0,001% trở lên

## LIỆU CÓ THỂ NGĂN CHẶN MỘT CÚ VA CHẠM TÀN KHỐC?

Phủ lên sao chổi hoặc tiểu hành tinh một lớp bụi phấn hoặc bụi than có thể thay đổi cách ánh sáng mặt trời làm nóng nó và điều chỉnh quỹ đạo của nó. Cho phát nổ một chất nổ gần một thiên thể có thể thay đổi quỹ đạo của nó nhanh hơn.

TRẠM VŨ TRỤ QUỐC TẾ

Các thiên thạch chủ yếu phát sinh trong vành đai tiểu hành tinh và quay quanh Mặt Trời

TRÁI ĐẤT

THIÊN THẠCH

Khi sao băng rơi xuống, chúng trở nên nóng đến mức lớp ngoài bốc hơi

SAO BĂNG

VỠN THẠCH

Thiên thạch là sắt - thường là 90% - hoặc đá, được tạo thành từ oxy, silic, magnesi và các yếu tố khác

Vệ tinh hồng

Vanguard 1, mảnh vỡ không gian lâu đời nhất, theo tính toán có thể sẽ tiếp tục duy trì quỹ đạo trong hơn 200 năm





## Tiểu hành tinh

Các tiểu hành tinh là các thiên thể bằng đá hoặc kim loại quay quanh Mặt Trời, chủ yếu nằm giữa quỹ đạo của Sao Hỏa và Sao Mộc trong cái được gọi là vành đai tiểu hành tinh. Hầu hết có đường kính lên đến 1 km, nhưng một số - như hành tinh lùn lớn nhất, Ceres - có đường kính hơn 100 km và chúng có một lực hấp dẫn đáng kể. Nhưng lực hấp dẫn của Sao Mộc đã ngăn các tiểu hành tinh liên kết với nhau tạo thành các hành tinh.

TIỂU HÀNH TINH

Một hộp công cụ bị rơi trong một chuyến du hành không gian hiện vẫn còn được theo dõi

Găng tay không gian mà Ed White làm rơi trong chuyến đi bộ ra ngoài không gian đầu tiên của người Mỹ

Một vệ tinh thời tiết cũ đã bị phá hủy bởi một tên lửa của Trung Quốc vào năm 2007, khiến 3.000 mảnh vỡ văng vào quỹ đạo

## Rác vũ trụ


Hàng triệu vật thể nhân tạo, từ những mảnh sơn nhỏ cho đến những khối kim loại có kích thước bằng xe tải, đang trôi nổi xung quanh Hệ Mặt Trời, hầu hết đều quay quanh Trái Đất. Di chuyển với tốc độ cao và số lượng ngày càng tăng, rác vũ trụ là mối đe dọa lớn dần đối với các tàu vũ trụ có người lái như Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS. Ngoài ra còn có các tàu vũ trụ bỏ hoang trên các bề mặt của Sao Kim, Sao Hỏa và Mặt Trăng.

## Vành đai Kuiper và Đám mây Oort

Các vật thể băng giá trong Vành đai Kuiper, một dải thiên thể hình đĩa nằm xa hơn quỹ đạo Sao Hải Vương, đang được các hành tinh kéo vào trong để trở thành sao chổi. Trong khi đó, các vật thể trong Đám mây Oort, một đám mây hình cầu khổng lồ từ các mảnh vụn băng giá ở vùng ngoài của Hệ Mặt Trời, bị ảnh hưởng bởi lực hấp dẫn của các ngôi sao đi qua nó.

### Quỹ đạo sao chổi

Sao chổi được phân loại theo thời gian quỹ đạo của chúng xung quanh Mặt Trời. Sao chổi ngắn hạn mất ít hơn 200 năm để hoàn thành quỹ đạo và bắt nguồn từ Vành đai Kuiper. Sao chổi dài hạn mất hơn 200 năm để hoàn thành quỹ đạo và đến từ Đám mây Oort.



Sao Hải Vương

### Đuôi sao chổi

Sao chổi có hai đuôi - đuôi bụi và đuôi plasma - luôn hướng ra khỏi Mặt Trời. Chúng có thể đạt tới chiều dài 160 triệu km.

Đầu sao chổi - đám mây khí và bụi

Chuyển động của sao chổi

Hướng Mặt Trời

Đuôi plasma

Đuôi bụi

Nhân sao chổi gồm bụi và băng

**MỘT VẬT THỂ 10 CM DI CHUYỂN VỚI TỐC ĐỘ 36.000 KM/H CÓ THỂ GÂY RA THIẾT HẠI TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI 25 THỜI THUỐC NỔ**



# Lỗ đen

Lỗ đen là một vùng không gian nơi vật chất bị nghiền nát thành một điểm mật độ vô hạn siêu nhỏ. Mật độ của nó đặc đến nỗi lực hấp dẫn của nó không để bất cứ thứ gì thoát ra. Ngay cả ánh sáng cũng bị kéo vào, khiến cho lỗ đen trở nên vô hình - cách duy nhất để phát hiện ra nó là quan sát ảnh hưởng của nó đối với môi trường xung quanh.

NƠI GẦN NHẤT ĐƯỢC  
NGHI LÀ LỖ ĐEN CÁCH  
CHÚNG TA KHOẢNG  
3.000 NĂM ÁNH SÁNG



## Sụp đổ hoàn toàn

Hầu hết các lỗ đen hình thành như kết quả từ cái chết của một ngôi sao lớn (với khối lượng gấp khoảng 10 lần Mặt Trời hoặc hơn). Vật chất bị lực hấp dẫn kéo về phía lỗ đen thường tạo thành một đĩa quay, phát ra tia X và các loại bức xạ khác, giúp các nhà thiên văn học phát hiện ra chúng.



**1 Ngôi sao ổn định**  
Phản ứng hạt nhân trong lõi của một ngôi sao tạo ra năng lượng và áp lực hướng ra bên ngoài. Khi chúng cân bằng với lực hấp dẫn hướng vào trong, ngôi sao duy trì ổn định. Nhưng khi hết nhiên liệu, lực hấp dẫn sẽ chiến thắng.

**2 Phát nổ**  
Khi các phản ứng hạt nhân ngừng lại, ngôi sao sẽ chết. Không thể cưỡng lại tác động nghiền nát bởi lực hấp dẫn của chính nó, sao sẽ co sụp. Điều này cũng sẽ gây ra một vụ nổ siêu tân tinh, làm nổ tung các bộ phận bên ngoài của ngôi sao vào không gian.

**3 Lõi sụp**  
Nếu phần lõi còn lại sau vụ nổ siêu tân tinh vẫn còn khối lượng lớn (khoảng gấp ba lần khối lượng Mặt Trời), nó sẽ tiếp tục co lại và sụp do trọng lượng của chính nó, hình thành một điểm có mật độ vô hạn gọi là điểm kỳ dị.

## PHÂN LOẠI LỖ ĐEN

Có hai loại lỗ đen chính: sao và siêu khổng lồ. Một lỗ đen sao xuất hiện khi một ngôi sao khổng lồ phát ra vụ nổ siêu tân tinh vào cuối vòng đời của nó (xem ở trên). Các lỗ đen siêu khổng lồ lớn hơn và được tìm thấy tại trung tâm của các thiên hà, thường được bao quanh bởi các xoáy vật chất cực kỳ nóng và có khả năng phát sáng. Các lỗ đen thuộc loại thứ ba, được gọi là lỗ đen nguyên thủy, có thể đã hình thành trong Vụ Nổ Lớn. Nếu thực sự chúng từng tồn tại, hầu hết có lẽ đều là lỗ đen nhỏ bé và nhanh chóng biến mất. Để tồn tại đến thời điểm này, một lỗ đen phải khởi đầu với khối lượng ít nhất là tương đương với một ngọn núi lớn.



**LỖ ĐEN SIÊU KHỔNG LỒ**  
Đường kính chân trời sự kiện: lên đến kích thước Hệ Mặt Trời  
Khối lượng: lên tới hàng tỷ lần khối lượng Mặt Trời

### LỖ ĐEN SAO

Đường kính chân trời sự kiện: 30-300 km  
Khối lượng: khoảng 5 tới 50 lần khối lượng Mặt Trời

### LỖ ĐEN NGUYÊN THỦY

Đường kính chân trời sự kiện: chiều rộng của hạt nhân nguyên tử nhỏ hoặc lớn hơn  
Khối lượng: nhiều hơn một ngọn núi





Đĩa bồi tụ  
vật chất

## LỖ ĐEN

Chân trời sự kiện là điểm không thể quay lại đối với bất kỳ vật chất hay ánh sáng nào từ bên ngoài đi qua lỗ đen

### 4 Một lỗ đen được sinh ra

Mật độ của điểm kỳ dị bây giờ lớn đến mức nó làm biến dạng không-thời gian xung quanh nó, khiến ánh sáng cũng không thể thoát ra. Một lỗ đen có thể được hình dung theo dạng hai chiều như một lỗ sâu vô hạn gọi là giếng hấp dẫn.

### MỘT LỖ ĐEN CÓ THỂ PHÁ HỦY TRÁI ĐẤT?

Lỗ đen không di chuyển qua các hành tinh chiếm dụng không gian. Ngay cả khi Mặt Trời trở thành một lỗ đen, Trái Đất sẽ không rơi vào nó, bởi vì, ở khoảng cách vừa đủ, lỗ đó sẽ có cùng lực hấp dẫn với Mặt Trời.

GIẾNG HẤP DẪN

CHÂN TRỜI SỰ KIỆN

VẬT CHẤT RƠI THEO ĐƯỜNG XOĂN ỐC VÀO TRONG

CƯỜNG ĐỘ CỦA TRỌNG LỰC TĂNG


Ẩn sâu trong trung tâm lỗ đen là một điểm kỳ dị vô cùng nhỏ và có mật độ dày đặc, nơi vật chất bị siết chặt lại

Khí, bụi và các ngôi sao đang phân rã xoay quanh một số lỗ đen trong cái được gọi là đĩa bồi tụ

Lỗ đen tạo thành một trường hấp dẫn cực mạnh, kéo vật chất vào trong như một xoáy nước

### SPAGHETTI-HÓA

Càng đến gần một chân trời sự kiện của lỗ đen, lực hấp dẫn càng tăng lên đáng kể, đến nỗi các vật thể rơi về phía nó sẽ bị kéo dãn thành những sợi dài giống như mì spaghetti. Một phi hành gia giả tưởng sẽ bị xé toạc, từ phía chân đi lên, bởi quá trình spaghetti-hóa này.



Trọng lực kéo mạnh nhất vào phần chân

Lỗ đen



# Thiên hà

Các thiên hà là những hệ thống khổng lồ chứa hàng triệu đến hàng tỷ ngôi sao, cùng với các đám mây khí và bụi gọi là tinh vân, đồng thời còn có một lượng vật chất tối (xem trang 206-207) không xác định. Chúng được sắp xếp theo trật tự nhờ lực hấp dẫn. Thiên hà của chúng ta được gọi là Dải Ngân Hà.

## Dải Ngân Hà

Hệ Mặt Trời của chúng ta nằm trên nhánh Lạp Hộ của một thiên hà xoắn ốc có thanh lớn, chứa khoảng 100 đến 400 tỷ ngôi sao xoay quanh một lỗ đen siêu khổng lồ. Nhìn từ cạnh bên, thiên hà của chúng ta dường như là một mặt phẳng, với phần trung tâm phình sáng, và bao quanh là một quầng hào quang chứa các cụm sao.

## MẶT CẮT NGÂN HÀ

Vùng hào quang rộng là nơi chứa các cụm sao hình cầu

Hạt nhân phình ra ở trung tâm

Đĩa mỏng

Nhánh Orion (Lạp Hộ)

Sagittarius A\* - lỗ đen ở trung tâm của Dải Ngân Hà

Nhánh Scutum-Centaurus

Nhánh Carina-Sagittarius

Vị trí của Hệ Mặt Trời

Hướng mà các nhánh xoắn ốc xoay quanh trung tâm của thiên hà

Nhánh Perseus

Nhánh Outer (Ngoài cùng)

Nhánh Norma

## Các loại thiên hà

Có khoảng hai nghìn tỷ thiên hà trong phần Vũ trụ quan sát được, dù vậy, có thể vẫn còn nhiều trong số chúng chưa được khám phá (xem trang 204-205). Ba loại thiên hà chính là thiên hà elip, xoắn ốc và dị thường. Một số thiên hà là sự kết hợp của các loại này, chẳng hạn như các thiên hà thấu kính. Vừa elip lại vừa xoắn ốc, chúng có dạng phẳng nhưng thiếu nhánh xoắn ốc rõ ràng.

### Thiên hà xoắn ốc

Thiên hà xoắn ốc là các đĩa phẳng, xoay với cấu trúc nhánh, có hạt nhân phình to và quầng sáng xung quanh. Trong thiên hà xoắn ốc có thanh, các nhánh xuất phát từ một thanh trung tâm, chứ không phải từ hạt nhân.

### Thiên hà hình elip

Thiên hà hình elip khá đa dạng, từ hình cầu đến hình bầu dục, và được phân loại theo mức tròn hay dẹt của chúng. Không giống như thiên hà xoắn ốc, chúng không có trục quay đơn.

### Thiên hà dị thường

Những thiên hà kiểu này không có cấu trúc đối xứng và ít hoặc không có hạt nhân. Một số chứa các ngôi sao mới, còn rất nóng. Số khác có lượng bụi lớn, khiến ta khó quan sát các ngôi sao riêng lẻ.

## DẢI NGÂN HÀ LỚN ĐẾN MỨC NÀO?

Thiên hà của chúng ta có đường kính khoảng 100.000 năm ánh sáng, với phần đĩa dày khoảng 1.000 năm ánh sáng. Hệ Mặt Trời của chúng ta mất khoảng 230 triệu năm để xoay quanh lỗ đen trung tâm của nó.




## Tương tác thiên hà

Va chạm giữa các thiên hà thực ra khá phổ biến - Dải Ngân Hà hiện đang va chạm với thiên hà lùn Nhân Mã. Tuy nhiên, khoảng cách giữa các ngôi sao là rất lớn, chúng gần như không bao giờ va chạm trực diện với nhau. Dù vậy, các thiên hà gần va chạm vẫn có thể làm biến dạng lẫn nhau và các tương tác có thể nén các đám mây khí trong mỗi thiên hà, khởi động sự hình thành sao mới.

### Va chạm thiên hà

Hai thiên hà xoắn ốc này đang va chạm, hút các nhánh xoắn ốc chính của nhau. Trải qua hàng triệu năm, chúng có thể cuối cùng sẽ kết hợp với nhau để tạo thành một thiên hà hình elip.




Cánh tay xoắn ốc va chạm

Hình dạng bị biến đổi do tương tác với thiên hà khác

## CÁC THIÊN HÀ HOẠT ĐỘNG


Không giống như các thiên hà bình thường, các thiên hà hoạt động phát ra nhiều năng lượng hơn so với mức mà các ngôi sao của chúng có thể tạo ra, do sự tích tụ (tích lũy) của vật chất trong lỗ đen siêu khổng lồ tại vùng trung tâm thiên hà. Một số thiên hà hoạt động còn phát đi các tia hạt năng lượng.



HẠT NHÂN VÀ VÒNG XUYÊN BAO QUANH

Quần tụ Xử Nữ

## SIÊU ĐÁM XỬ NỮ



Khoảng không gian trống rỗng

Các Nhóm Leo II

Dải Ngân Hà trong Nhóm Địa phương

### Siêu đám Xử Nữ

Thiên hà của chúng ta là một phần của đám thiên hà gọi là Nhóm Địa phương, là một phần của Siêu đám Xử Nữ - một siêu đám thiên hà bị chi phối bởi Quần tụ Xử Nữ, nơi chứa tới 2.000 thiên hà.

## Quần tụ và Siêu đám thiên hà

Ba phần tư các thiên hà không được sắp xếp ngẫu nhiên mà quần tụ lại với nhau. Chúng được kết nối bởi một mạng lưới vũ trụ gồm các sợi vật chất thông thường và sợi vật chất tối; các đám thiên hà thường hình thành tại các điểm mà các sợi này giao nhau. Khi các quần tụ thiên hà va chạm với nhau, các siêu đám sẽ hình thành. Có khoảng 10 triệu siêu đám thiên hà như thế này. Trong đó siêu đám lớn nhất, Bức tường Virgo-Sloan, có đường kính 1,4 tỷ năm ánh sáng. Năng lượng tối được cho là sẽ xé tan những siêu đám này.





# Vụ Nổ Lớn

Hầu hết các nhà thiên văn học tin rằng Vũ trụ có một khởi đầu xác định, xảy ra cách đây 13,8 tỷ năm trong một sự kiện mang tên Vụ Nổ Lớn. Bắt đầu từ một điểm vô hạn cực kỳ nhỏ và đặc, tất cả vật chất, năng lượng, không gian và thời gian được hình thành. Kể từ Vụ Nổ Lớn, Vũ trụ ngày càng lớn và nguội hơn.

## ĐIỀU GÌ XẢY ĐẾN TRƯỚC VỤ NỔ LỚN?

Nếu thời gian bắt đầu cùng Vụ Nổ Lớn, thì câu trả lời là không có gì. Hoặc có lẽ vũ trụ của chúng ta xuất phát từ một vũ trụ mẹ nào đó.

## Mở rộng không gian

Các nhà khoa học đã quan sát thấy Vũ trụ vẫn đang giãn nở, hàm ý rằng Vũ trụ trước đây từng nhỏ hơn nhiều. Trong một phần rất nhỏ của giây đầu tiên, một phần của Vũ trụ đã phát triển nhanh hơn tốc độ ánh sáng, trong một sự kiện gọi là giãn nở. Tốc độ mở rộng sớm chậm lại, nhưng Vũ trụ vẫn ngày càng lớn lên. Ở quy mô lớn, tất cả các vật thể đang di chuyển ra xa nhau - và càng ở xa, chúng lại càng di chuyển nhanh hơn. Điều này có thể được quan sát thấy trong một hiệu ứng được gọi là dịch chuyển đỏ.


## Dịch chuyển đỏ

Khi một vật thể chuyển động ra xa một người quan sát ở tốc độ cao, sóng ánh sáng từ nó bị kéo dãn. Điều này làm cho vạch phổ của vật thể (xem trang 211) dịch sang phía đầu đỏ của quang phổ. Khoảng cách của một vật thể từ Trái Đất có thể được tính từ kích thước của dịch chuyển đỏ.

Thiên hà di chuyển ra xa khỏi người quan sát

Thiên hà có màu đỏ hơn hiện lên trong mắt người quan sát

Bước sóng được kéo dài



Một số thiên hà bắt đầu có hình dạng xoắn ốc

Những ngôi sao đầu tiên hình thành

Cho đến khi những ngôi sao đầu tiên hình thành và bắt đầu phát sáng, Vũ trụ vẫn chìm trong tối tăm

NGÀY NAY

2-3 TỶ NĂM SAU VỤ NỔ LỚN

500-600 TRIỆU NĂM SAU VỤ NỔ LỚN

380.000 ĐẾN 200 TRIỆU NĂM SAU VỤ NỔ LỚN

Nguyên tử hydro  
Nguyên tử deuteri  
Nguyên tử heli-3

380.000





## Khởi nguồn

Vũ trụ ban đầu hoàn toàn là năng lượng. Khi nó nguội đi, năng lượng và vật chất ở trạng thái hoán đổi cho nhau gọi là tương đương khối lượng-năng lượng. Sau khi kết thúc dần nở vũ trụ, các hạt hạ nguyên tử đầu tiên bắt đầu xuất hiện. Nhiều trong số các hạt này không còn tồn tại, nhưng các hạt còn lại đã tạo nên tất cả mọi vật chất trong Vũ trụ ngày nay. Vào thời điểm khoảng 400.000 năm trôi qua sau vụ nổ, các nguyên tử đầu tiên đã hình thành.


Các electron kết hợp với hạt nhân nguyên tử để tạo ra các nguyên tử đầu tiên

Va chạm giữa các proton và neutron tạo thành hạt nhân nguyên tử đầu tiên

Các proton và neutron đầu tiên, cũng như phản proton và phản neutron, hình thành

Các lực cơ bản đã tách ra, và các định luật vật lý hoạt động như ngày nay

Dẫn nổ kết thúc, một biển các hạt và phản hạt xuất hiện




## BẰNG CHỨNG CHO VỤ NỔ LỚN

Các nhà khoa học đề xuất lý thuyết Vụ Nổ Lớn dự đoán rằng nó sẽ để lại một bức xạ nhiệt mờ nhạt đến từ mọi hướng trên bầu trời. Năm 1964, bức xạ này, được gọi là bức xạ tàn dư vũ trụ, được hai nhà thiên văn học người Mỹ tìm thấy bằng cách sử dụng một ăng ten radio lớn, có hình chiếc sừng tại New Jersey.



## Các định luật vật lý

Bốn lực cơ bản chi phối sự tương tác giữa các hạt thoát tiên không tồn tại, nhưng chúng đã được thiết lập nên tảng từ khi Vũ trụ ra đời. Ngay sau Vụ Nổ Lớn, ở một thời kỳ được gọi là Kỳ nguyên Planck, khi vật chất và năng lượng chưa tách rời nhau, đã có một lực hoặc siêu lực thống nhất duy nhất. Một phần nghìn giây sau Vụ Nổ Lớn, lực này đã tách ra thành lực điện từ, lực hạt nhân mạnh, lực hạt nhân yếu và lực hấp dẫn.



## Vụ Nổ Lớn

Trong giây đầu tiên của thời gian, các lực cơ bản và các hạt hạ nguyên tử được hình thành. Phải mất vài trăm nghìn năm nữa thì các nguyên tử mới xuất hiện, và thêm hàng triệu năm để các ngôi sao, sau đó là các thiên hà, phát triển.



**TRONG GIẤY ĐẦU TIÊN, VŨ TRỤ SƠ KHAI ĐÃ PHÁT TRIỂN TỪ HƯ KHÔNG LÊN TỚI ĐƯỜNG KÍNH HÀNG TỶ KM**

**VỤ NỔ LỚN**

Lực hấp dẫn là lực cơ bản đầu tiên xuất hiện

Dẫn nổ bắt đầu và Vũ trụ mở rộng với tốc độ chóng mặt



## MỘT NĂM ÁNH SÁNG LÀ GÌ?

Là đơn vị đo khoảng cách (không phải thời gian), một năm ánh sáng là khoảng cách ánh sáng đi được trong một năm. Ánh sáng di chuyển với tốc độ 300.000 km mỗi giây, do đó, một năm ánh sáng là độ dài khoảng 9,5 nghìn tỷ km.

# Vũ trụ rộng lớn đến mức nào?

Liệu không gian có là vô hạn? Và Vũ trụ có hình dạng gì? Mặc dù các nhà thiên văn học chưa thể trả lời những câu hỏi này, họ có thể ước tính kích thước của phần Vũ trụ mà chúng ta có thể nhìn thấy. Bằng cách nghiên cứu mật độ khối lượng và năng lượng, họ cũng có thể rút ra kết luận về hình học của không gian Vũ trụ.

Ngoài Vũ trụ khả kiến là các khu vực mà ánh sáng chưa đến được với chúng ta, nhưng rồi sẽ bắt đầu trở nên nhìn thấy được

Đây là khoảng cách hiện tại từ Trái Đất đến các vật thể nhìn thấy xa nhất trong Vũ trụ

Rìa ngoài của Vũ trụ khả kiến gọi là Chân trời Vũ trụ học

Trái Đất

13,8 TỶ NĂM ÁNH SÁNG

46 TỶ NĂM ÁNH SÁNG

Đây là khoảng cách mà ánh sáng đã di chuyển từ các vật thể nhìn thấy xa nhất


Vì không gian mở rộng đồng đều theo mọi hướng, ta dường như đang là trung tâm của Vũ trụ khi mọi vật đều ở tại rìa khỏi chúng ta, đây là cảm giác chung của mọi người quan sát ở bất kỳ điểm nào trong Vũ trụ

## RÌA CỦA VŨ TRỤ KHẢ KIẾN

### Vũ trụ khả kiến

Phần không gian chúng ta có thể nhìn thấy và nghiên cứu được gọi là Vũ trụ khả kiến. Một khu vực hình cầu có tâm là Trái Đất, đó là khối không gian mà từ đó ánh sáng đã có thời gian để di chuyển tới chúng ta kể từ Vụ Nổ Lớn. Khi một vật thể di chuyển ra xa khỏi chúng ta, ánh sáng mà nó phát ra sẽ dịch chuyển về phía đầu màu đỏ của quang phổ khi nó đi qua không gian tiến về phía chúng ta (xem trang 202). Ánh sáng dịch chuyển đỏ dài nhất có thể phát hiện được đã xuất hiện từ nơi cách ta 13,8 tỷ năm ánh sáng. Điều này cho chúng ta biết Vũ trụ sẽ lớn đến mức nào nếu nó đứng yên. Nó cũng tiết lộ rằng Vũ trụ phải khoảng 13,8 tỷ năm tuổi. Nhưng chúng ta biết rằng, kể từ lúc bắt đầu, Vũ trụ không ngừng mở rộng.

**CÁC THIÊN HÀ XA NHẤT CÒN MỜ HƠN 10 TỶ LẦN SO VỚI CÁC VẬT THỂ MỜ NHẤT CÓ THỂ NHÌN THẤY BẰNG MẮT THƯỜNG**









## Đo khoảng cách trong không gian vẫn tiếp tục mở rộng

Vì không gian vẫn đang mở rộng, khoảng cách thực sự đến một vật thể trong không gian, được gọi là khoảng cách đồng chuyển động của nó, lớn hơn khoảng cách ánh sáng từ vật thể đã truyền tới chúng ta, được gọi là khoảng cách nhìn lại. Nếu tính đến cả việc không gian mở rộng, rìa của Vũ trụ khả kiến cách chúng ta khoảng 46,5 tỷ năm ánh sáng.




## KHÔNG GIAN MỞ RỘNG NHANH ĐẾN MỨC NÀO?

Ở quy mô tương đối nhỏ, chẳng hạn như trong các thiên hà, các vật thể trong không gian Vũ trụ được giữ ở khoảng cách cố định với nhau nhờ lực hấp dẫn. Nhưng ở quy mô lớn hơn, sự giãn nở của không gian có nghĩa là các vật thể đang di chuyển ra xa nhau, giống như các điểm trên bề mặt của một quả bóng đang được thổi phồng. Hai vật thể càng xa nhau, chúng càng di chuyển ra xa nhau nhanh hơn. Các phép đo mới nhất cho thấy hai vật thể cách nhau một megaparsec (khoảng 3 triệu năm ánh sáng) đang di chuyển hướng ra xa nhau ở tốc độ khoảng 74 km/s.




## Hình dạng vũ trụ

Vũ trụ có ba dạng hình học khả dĩ. Mỗi dạng có độ cong không-thời gian khác nhau. Đây không phải là loại độ cong mà chúng ta đã quen thuộc, nhưng nó có thể được biểu thị bằng một hình ảnh 2D. Vũ trụ của chúng ta được cho là phẳng hoặc gần như phẳng. Một số giả thuyết về số phận vũ trụ là dựa trên những giả định hình học này (xem trang 208-209).



### Vũ trụ phẳng

Bản tương tự dạng 2D của một vũ trụ phẳng là một mặt phẳng mà các quy tắc hình học quen thuộc có thể áp dụng. Ví dụ, các đường song song không bao giờ gặp nhau.



### Vũ trụ cong lồi

Một vũ trụ mà trong đó không-thời gian cong lồi là vũ trụ "đóng kín" và hữu hạn về khối lượng và phạm vi. Các đường thẳng song song hội tụ trên một bề mặt hình cầu trong phép so sánh 2D này.



### Vũ trụ cong lõm

Trong kịch bản này, vũ trụ có tính "mở ra" và vô hạn. Bản tương tự dạng 2D là một không gian hình yên ngựa, trong đó các đường phân kỳ dần dần xa nhau hơn.



# Vật chất tối và năng lượng tối

Hầu hết Vũ trụ gồm những gì các nhà thiên văn học gọi là vật chất tối và năng lượng tối. Không thể quan sát trực tiếp các loại vật chất và năng lượng này, nhưng ta biết chúng tồn tại, do bởi cách chúng tương tác với vật chất thông thường và sóng ánh sáng.

## Thiếu hụt khối lượng và năng lượng


Khối lượng và năng lượng là hai dạng của một hiện tượng đơn gọi là tương đương khối lượng-năng lượng (xem trang 141). Khi các nhà thiên văn học cố gắng tổng hợp tất cả khối lượng-năng lượng của Vũ trụ, họ nhận thấy rằng hầu hết trong số đó là không thể nhìn thấy. Nhưng nhất thiết phải có một khối lượng lớn hơn những gì chúng ta có thể thấy, bởi nếu không các quần tụ thiên hà đã bay xa khỏi nhau. Và phải có nhiều năng lượng hơn bởi có thứ gì đó đang chống lại lực hấp dẫn và khiến quá trình giãn nở không gian tăng tốc.



**MÁY PHÁT HIỆN VẬT CHẤT TỐI NHẠY CẢM NHẤT THẾ GIỚI NẸM SÂU 1,5 KM DƯỚI LÒNG ĐẤT**

**Còn thiếu bao nhiêu khối lượng-năng lượng?**

Vật chất hữu hình thông thường, được tạo thành từ các nguyên tử, chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong khối lượng-năng lượng của Vũ trụ. Phần lớn còn lại là năng lượng tối.




## Vật chất tối

Vật chất tối hình thành trong các quầng xung quanh vật chất thường, hay vật chất "baryon", nhưng đa phần không tương tác với khối vật chất thường, không phản xạ hoặc hấp thụ ánh sáng, cũng không thể phát hiện ra bằng bức xạ điện từ. Tuy nhiên, tác động lực hấp dẫn của nó lên các thiên hà và các ngôi sao, cũng như tác động của nó làm biến dạng đường sóng ánh sáng có thể được quan sát thấy. Ta vẫn chưa rõ về bản chất của vật chất tối, nhưng hai trong số các dạng mà các nhà thiên văn học cho rằng nó có thể có là MACHO và WIMP.

### Thấu kính hấp dẫn

Một khối lượng đủ lớn có thể hoạt động như một thấu kính, làm biến dạng các trường hấp dẫn, chuyển hướng đi của sóng ánh sáng, và thay đổi về ngoài của các thiên hà. Hiệu ứng thấu kính yếu kéo dài hình dạng thiên hà, trong khi hiệu ứng mạnh làm thay đổi vị trí của chúng hoặc thậm chí nhân đôi chúng.

Ánh sáng uốn cong về phía Dải Ngân Hà do ảnh hưởng của một quần tụ thiên hà đóng vai trò là thấu kính



Người quan sát ở Dải Ngân Hà nhìn thấy hình ảnh bị bóp méo của thiên hà xa xôi

## DẢI NGÂN HÀ

MACHO	WIMP
Một số vật chất tối có thể bao gồm các vật thể dày đặc như lỗ đen và sao lùn nâu - được gọi chung là MACHO (MASSive Compact Halo Objects). Các vật chất này phát ra rất ít ánh sáng, và chỉ có thể được phát hiện bằng thấu kính hấp dẫn (xem ở trên). Tuy nhiên, MACHO không chiếm toàn bộ khối lượng vật chất tối.	Loại vật chất tối giả định khác là các hạt tương tác yếu (Weakly Interacting Massive Particles), các hạt lạ được tạo ra trong Vũ trụ sơ khai, tương tác thông qua lực hạt nhân yếu (xem trang 27) và lực hấp dẫn.
Nóng	Lạnh
Dạng vật chất tối này bao gồm các hạt di chuyển gần với tốc độ ánh sáng.	Hầu hết các vật chất tối, như WIMP, được cho là lạnh - một dạng vật chất di chuyển chậm.





## THIÊN HÀ XA XÔI

Thấu kính tạo ra nhiều hình ảnh bị bóp méo của thiên hà

Vị trí thực tế và hình dạng của thiên hà

Đường đồng mức nối các điểm có nồng độ vật chất tối bằng nhau

## QUẦN TỤ THIÊN HÀ

Quần tụ thiên hà chứa một lượng lớn vật chất tối hoạt động như một thấu kính hấp dẫn

### Xác định vật chất tối


Bằng cách quan sát hiệu ứng thấu kính của khối vật chất tối, các nhà thiên văn học có thể xác định hình dạng của nó, giống như suy ra hình dạng của một gợn sóng trên mặt nước từ các biến dạng rõ ràng khi thấy một viên sỏi xuống lòng sông.

## CÓ VẬT CHẤT TỐI NÀO TRÊN TRÁI ĐẤT KHÔNG?

Có thể. Theo một số ước tính, hàng tỷ hạt vật chất tối đi qua cơ thể chúng ta mỗi giây.

## Năng lượng tối

Các phép đo khoảng cách đến những siêu tân tinh ở xa đã chỉ ra rằng sự giãn nở của Vũ trụ đang tăng tốc. Phát hiện này đã dẫn đến lý thuyết về năng lượng tối, một lực chống lại lực hấp dẫn, giúp giải thích cả tính bằng phẳng của Vũ trụ của chúng ta và sự giãn nở ngày một tăng của nó. Vật chất tối thống trị Vũ trụ sơ khai, nhưng giờ đây năng lượng tối mới là thứ thống trị, ảnh hưởng của nó ngày càng tăng khi Vũ trụ ngày càng lớn hơn.



### Tăng tốc giãn nở

Sau Vụ Nổ Lớn, Vũ trụ ban đầu giãn nở cực nhanh, rồi dần chậm lại. Nhưng từ khoảng 7,5 tỷ năm trước, như thể hiện bằng hình đường cong mở rộng nhanh chóng, các vật thể di chuyển với tốc độ nhanh hơn do tác động của lực năng lượng tối.





### Vụ Co Lớn

Một số nhà vũ trụ học tin rằng năng lượng tối sẽ suy yếu theo thời gian, cho phép lực hấp dẫn giành chiến thắng và khiến Vũ trụ ngừng mở rộng, rồi bắt đầu co lại. Trải qua hàng nghìn tỷ năm, các thiên hà sẽ va chạm và nhiệt độ Vũ trụ sẽ tăng lên, thậm chí sẽ thiêu rụi các ngôi sao. Các nguyên tử sẽ bị xé toạc và một lỗ đen khổng lồ sẽ nuốt chửng mọi thứ, kể cả chính nó. Một số người đưa ra giả thuyết rằng, khi các hạt va đập vào nhau, một Vụ Nổ Lớn thứ hai sẽ diễn ra - Vụ Nảy Lớn.

# Vũ trụ kết thúc như thế nào?

Số phận cuối cùng của Vũ trụ vẫn là điều không chắc chắn. Liệu nó có sụp đổ và chấm dứt bằng một Vụ Nổ Lớn khác? Hay sẽ là một đoạn kết lạnh giá và thinh lặng? Một kết thúc bạo lực và vĩnh viễn? Hay mở rộng vô hạn? Đây vẫn là một chủ đề của suy đoán khoa học.


### Vụ Đóng băng Lớn

Giả thuyết Vụ Đóng băng Lớn cho rằng Vũ trụ sẽ tiếp tục mở rộng cho đến khi năng lượng và vật chất được trải đều trên toàn Vũ trụ. Kết quả là, sẽ không có đủ năng lượng tập trung vào một nơi để tạo ra những ngôi sao mới. Nhiệt độ sẽ giảm xuống độ không tuyệt đối, các ngôi sao sẽ chết và Vũ trụ sẽ chìm trong bóng tối.

### KHI NÀO VŨ TRỤ KẾT THÚC?

Trong hầu hết các kịch bản khả dĩ, đoạn kết của Vũ trụ sẽ không xảy ra trong hàng tỷ năm nữa. Tuy nhiên, về mặt lý thuyết, Thay Đổi Lớn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.





### Vụ Xé Rách Lớn

Trong một kịch bản được gọi là Vụ Xé Rách Lớn, Vũ trụ cuối cùng sẽ tự xé toạc. Nếu không gian ở giữa các thiên hà chứa đầy năng lượng tối, đối kháng với tác động của lực hấp dẫn, Vũ trụ sẽ tiếp tục giãn nở với tốc độ ngày càng nhanh hơn, cuối cùng đạt đến tốc độ ánh sáng. Chẳng thể bị kiềm lại bởi lực hấp dẫn nữa, tất cả các vật chất trong Vũ trụ, bao gồm các thiên hà và lỗ đen, và thậm chí là không-thời gian sẽ bị xé rách.


### Vũ trụ hiện tại của chúng ta

Vũ trụ đã không ngừng mở rộng kể từ khi nó hình thành gần 14 tỷ năm trước. Các thiên hà tiếp tục di chuyển ra xa nhau và các quan sát về siêu tân tinh xa xôi cho thấy sự giãn nở đang tăng tốc. Điều này ngụ ý về sự hiện diện của một lực có áp suất âm, được gọi là năng lượng tối (xem trang 206-207), đối kháng với lực hấp dẫn. Nếu lực này đóng một vai trò quan trọng, Vũ trụ mở rộng vô hạn là kịch bản khả dĩ cao nhất.

### Vụ Thay Đổi Lớn

Lý thuyết Thay Đổi Lớn có liên quan đến hạt Higgs và trường Higgs - hơi giống trường điện từ ở khắp mọi nơi - vốn được cho là chưa đạt đến trạng thái năng lượng thấp nhất của nó, hay "chân không". Nếu nó đạt đến trạng thái chân không thực sự, trường Higgs về cơ bản có thể biến đổi vật chất, năng lượng và không-thời gian để tạo ra một vũ trụ thay thế lan ra như bong bóng với tốc độ ánh sáng. Mọi thứ trong Vũ trụ, ở dạng hiện tại, sẽ kết thúc.

**HẠT HIGGS CÓ KHỐI LƯỢNG GẤP KHOẢNG 130 LẦN KHỐI LƯỢNG CỦA PROTON, LÀM CHO NÓ RẤT KHÔNG ỔN ĐỊNH**






# Quan sát Vũ trụ

Các nhà thiên văn học đã quan sát không gian ngay từ những ngày đầu, trước tiên là bằng mắt thường, và gần đây hơn, họ sử dụng các thiết bị tinh vi có thể phát hiện sóng ánh sáng từ những nơi xa nhất của không gian.



THIÊN HÀ XOẮN ỐC



## Sóng vô tuyến

Các sóng dài nhất, sóng vô tuyến, được phát ra bởi nhiều vật thể, bao gồm cả Mặt Trời, các hành tinh, nhiều thiên hà và tinh vân. Phần lớn đều vượt qua bầu khí quyển và đến được bề mặt của Trái Đất.

## Đi dọc quang phổ

Một vật thể phức tạp, giống như một thiên hà xoắn ốc, phát ra bức xạ với bước sóng bao phủ toàn bộ phổ. Để thu được càng nhiều thông tin càng tốt, các nhà thiên văn học nghiên cứu nó với một loạt các công cụ.



## Tia hồng ngoại

Tia hồng ngoại là năng lượng nhiệt, giống như hơi ấm mặt trời. Mọi thứ trong Vũ trụ đều tỏa ra một phần năng lượng của nó dưới dạng hồng ngoại. Hầu hết được hấp thụ bởi bầu khí quyển Trái Đất.



## Ánh sáng khả kiến

Các nhà thiên văn học có thể nhìn thấy các vật thể phát ra ánh sáng khả kiến bằng kính viễn vọng ngay trên Trái Đất, nhưng hình ảnh rõ nét hơn nhiều được thu thập khi không có ô nhiễm ánh sáng và nhiễu sóng khí quyển.




## Tia cực tím

Mặt Trời và các ngôi sao phát ra tia cực tím (UV), phần lớn bị chặn bởi tầng ozone của Trái Đất. Nghiên cứu tia cực tím có thể cho chúng ta biết về cấu trúc và sự phát triển của các thiên hà.



Tàu thăm dò WMAP đã đo bức xạ vi sóng, cho thấy thành phần của Vũ trụ sơ khai



Kính viễn vọng không gian Hubble đã chụp rất nhiều bức ảnh nổi tiếng của các ngôi sao tinh vân và thiên hà xa xôi, thu được tia hồng ngoại, tia khả kiến và tia cực tím

600 KM

10 KM

Kính viễn vọng vô tuyến tạo ra hình ảnh bằng cách lập biểu đồ các điểm sóng vô tuyến cường độ cao

Một số bức xạ cực tím từ Mặt Trời đi qua bầu khí quyển. Nó có thể tạo ra các tác động có hại như cháy nắng và ung thư da

Trong phổ khả kiến, ánh sáng màu đỏ có bước sóng dài nhất, trong khi ánh sáng màu tím có bước sóng ngắn nhất

Các đài quan sát và kính viễn vọng trên mặt đất có thể xem các vật thể trong không gian phát ra ánh sáng quang học hoặc khả kiến

Bước sóng được đo từ đỉnh đến đỉnh

SÓNG VÔ TUYẾN

VI SÓNG

TIA HỒNG NGOẠI

TIA KHẢ KIẾN


TIA CỰC TÍM





## Quan sát ánh sáng



Phổ điện từ là một dải liên tục gồm các loại bức xạ có bước sóng khác nhau, tất cả có thể được mô tả như các dạng ánh sáng. Nó bao gồm ánh sáng khả kiến, mà mắt người có thể nhìn thấy như các màu sắc, tùy thuộc vào bước sóng của chúng, nhưng cũng có nhiều dạng khác mà mắt người không nhìn thấy được, chẳng hạn như sóng vô tuyến và tia X. Mỗi loại bức xạ sẽ đi xuyên không gian với tốc độ ánh sáng.



### Tia X

Tia X được phát ra từ các lỗ đen, sao neutron, hệ sao đôi, tàn dư siêu tân tinh, Mặt Trời và các ngôi sao khác, cùng một số sao chổi. Hầu hết bị chặn bởi bầu khí quyển Trái Đất.

Đài quan sát tia X Chandra có tám gương để tập trung tia X tới vào một điểm để các dụng cụ khác chụp được hình ảnh sắc nét



### Tia Gamma

Các sóng nhỏ nhất và mạnh nhất, tia gamma, được tạo ra bởi các sao neutron, sao xung, vụ nổ siêu tân tinh và các khu vực xung quanh các lỗ đen.

Kính thiên văn vũ trụ tia gamma Fermi có các tháp bằng tấm kim loại và silic để phát hiện tia gamma



TIA X

TIA GAMMA

## Phổ học

Các nguyên tử của một nguyên tố phát ra ánh sáng với bước sóng cụ thể khi được nung nóng. Trong một kỹ thuật gọi là phổ học, ánh sáng từ một vật thể được phân tách bằng lăng kính, sau đó mô hình bước sóng, hay quang phổ, thu được sẽ được nghiên cứu để xem loại nguyên tử nào có trong vật thể. Đây là cách các nhà khoa học có thể xác định những vật thể ở xa được cấu tạo từ gì.

### PHỔ PHÁT XẠ CỦA NEON

Các đường tương ứng với sự phát xạ của các nguyên tử neon ở các bước sóng khác nhau



500 600 700


BƯỚC SÓNG (NANOMET)

### ẢNH MÀU GIẢ

Mắt chúng ta chỉ có thể phát hiện ánh sáng trong một phần hẹp của quang phổ. Để tạo ra hình ảnh sử dụng bức xạ ở ngoài phạm vi đó, các nhà thiên văn sử dụng màu sắc mà chúng ta có thể nhìn thấy để thể hiện các mức cường độ bức xạ khác nhau. Kỹ thuật này được gọi là ảnh màu giả.

UV năng lượng thấp

UV năng lượng cao



TINH VÂN TRONG TIA CỰC TÍM



# Phải chăng chúng ta đơn độc?

Con người đã tìm thấy hàng nghìn hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời, hay ngoại hành tinh (exoplanet). Chúng ta cũng có thể tính toán rằng phải có hàng chục tỷ hành tinh có thể sinh sống được trong thiên hà của mình. Vậy liệu có thể tìm thấy sự sống ở một thế giới khác?

## Đi tìm một Trái Đất khác


Một cách giúp các nhà thiên văn học phát hiện các ngoại hành tinh là tìm kiếm tác động nhỏ mà chúng có thể có trên các ngôi sao của mình. Nếu ta tìm thấy một hành tinh có kích thước và khoảng cách đến ngôi sao của nó tương tự Trái Đất, chúng ta có thể phân tích bầu khí quyển của nó để biết liệu các nguyên tố cần thiết cho sự sống có tồn tại hay không. Rất nhiều ngoại hành tinh được phát hiện lại chẳng có gì giống với Trái Đất cả.

## Vùng Goldilocks

Một vùng có thể sinh sống được gọi là vùng Goldilocks – theo câu chuyện cổ tích về cô bé Goldilocks thích bát cháo không quá nóng cũng không quá lạnh, mà phải “vừa đúng”. Một hành tinh Goldilocks sẽ có nhiệt độ phù hợp để duy trì bề mặt nước lỏng, mặc dù để sự sống phát triển, các tiêu chí khác cũng phải được đáp ứng (xem bên dưới). Tuy nhiên, hiện nay người ta cho rằng một lượng lớn bề mặt nước lỏng có thể tồn tại bên ngoài các khu vực này.

### Vùng có thể sinh sống

Khoảng cách từ một vùng có thể sinh sống đến một ngôi sao là không quá gần, cũng không quá xa, nhưng lý tưởng cho sự sống. Bằng cách định vị các ngôi sao thích hợp và khoảng cách phù hợp, các nhà thiên văn học có thể bắt đầu tìm kiếm các hành tinh giống như Trái Đất.



### HÀNH TINH KHÍ KHỔNG LỒ NÓNG

Một số ngoại hành tinh là hành tinh khí khổng lồ, như Sao Mộc, có quỹ đạo rất gần với các ngôi sao của chúng, tạo ra thời tiết khắc nghiệt trong khí quyển của chúng.

### THẾ GIỚI DUNG NHAM

Có những ngoại hành tinh với bề mặt dung nham sôi sục, vì chúng là những hành tinh mới hình thành đang còn rất nóng, ở gần với các ngôi sao của chúng hoặc đã trải qua một vụ va chạm lớn.

### THẾ GIỚI BĂNG GIÁ

Đây là phiên bản lớn hơn của các mặt trăng đóng băng trong Hệ Mặt Trời của chúng ta, những hành tinh kỳ lạ này có bề mặt băng giá gồm nước, amonia và methan.

### Điều gì khiến một hành tinh “có thể ở được”?

Có một vài tiêu chí để một hành tinh phù hợp cho sự phát triển của sự sống. Nhiệt độ và nước chính là chìa khóa.



#### Nhiệt độ phù hợp:

Nhiệt độ bề mặt vừa phải là điều cần thiết. Ở quá gần một ngôi sao, hành tinh sẽ sôi sục; ở quá xa và nó sẽ đóng băng.



#### Nguồn sáng ổn định:

Ngôi sao gần nhất phải duy trì sự ổn định và tỏa sáng đủ lâu để sự sống phát triển trên một hành tinh đá.



**Quay và nghiêng:** Một hành tinh quay, với trục quay nghiêng, có ngày và đêm, cũng như các mùa khác nhau trong năm, để nhiệt độ khu vực không lên tới mức cực đoan.




**Lõi nóng chảy:** Một hành tinh có lõi nóng chảy có khả năng tạo ra từ trường để bảo vệ mầm sống khỏi bức xạ không gian.



#### Bề mặt nước:

Phải có nước lỏng ở bề mặt hoặc có độ ẩm cao (hoặc sự tồn tại của một chất lỏng khác với chức năng tương tự).



#### Các nguyên tố:

Các khối xây dựng sự sống, như carbon, nitơ, oxy, hydro và lưu huỳnh, phải tồn tại trên hành tinh.



#### Khí quyển:

Khí quyển dày đặc sẽ bảo vệ chống lại phóng xạ, ngăn chặn sự thoát khí và giữ ấm.



#### Khối lượng đủ lớn:

Một hành tinh có khối lượng đủ lớn sẽ tạo ra lực hấp dẫn cần thiết để giữ lại bầu khí quyển của nó.





## Tìm kiếm sự sống bậc cao

Một cách để phát hiện sự sống là lắng nghe nó. SETI (Search For Extraterrestrial Intelligence, chương trình Tìm kiếm Sinh vật Thông minh Ngoài Hành tinh) là một tổ chức tìm kiếm các tín hiệu vô tuyến hoặc tín hiệu quang học biểu thị sự sống tiến hóa bậc cao bên ngoài Trái Đất. Kính viễn vọng vô tuyến tìm kiếm các tín hiệu vô tuyến bằng hẹp đến từ những nguồn nhân tạo. Các nhà khoa học cũng cố gắng tìm kiếm những tia sáng rất ngắn, chỉ tồn tại trong vài nano giây. Cho đến nay chưa phát hiện được dấu hiệu có thể xác minh nào.

### Phương trình Drake

Được đề xuất bởi nhà thiên văn học Frank Drake vào năm 1961, phương trình này được sử dụng để ước tính số lượng các nền văn minh đưa ra tín hiệu giao tiếp có thể tồn tại trong thiên hà của chúng ta.

### SETI

Hệ thống Kính viễn vọng Allen đặt tại California của SETI hướng vào các khu vực cụ thể trên bầu trời, dựa trên dữ liệu được thu thập bởi Kính thiên văn vũ trụ Kepler, chuyên săn lùng các ngoại hành tinh.

Ăng ten vô tuyến




### CHÚ THÍCH

- Ước tính của Drake vào năm 1961
- Ước tính gần đây

Số lượng nền văn minh trong ngân hà gửi đi tín hiệu liên lạc	Tốc độ hình thành sao mỗi năm trong thiên hà của chúng ta	Tỷ lệ sao có hệ hành tinh	Số hành tinh có hỗ trợ sự sống trung bình trên một hệ hành tinh	Tỷ lệ hành tinh như vậy có sự sống phát triển	Tỷ lệ hành tinh như vậy có xuất hiện sinh vật thông minh	Tỷ lệ nền văn minh có công nghệ tín hiệu không gian	Khoảng thời gian tồn tại trung bình của một nền văn minh có khả năng phát tín hiệu không gian (tính bằng năm)					
$N$	$=$	$R^*$	$\times$	$f_p$	$\times$	$n_e$	$\times$	$f_i$	$\times$	$f_c$	$\times$	$L$
500 2.100		10 7		0,5 1		1 3		0,1 0,1		0,1 0,1		1,0 1,0
				10.000 10.000								

## Mọi người đều cả rồi?

Có hàng tỷ hành tinh có khả năng tồn tại sự sống, và kể từ khi Dải Ngân Hà hình thành, đã đủ thời gian trôi qua để một nền văn minh bậc cao xuất hiện nơi đây. Vậy tại sao không một ai liên hệ với chúng ta? Trên thực tế, có lẽ sự sống hiếm đến nỗi con người chúng ta quá thật là những kẻ đơn độc trong Vũ trụ.



### Nghịch lý Fermi

Nhà vật lý Enrico Fermi đã nhấn mạnh mâu thuẫn giữa xác suất cao của việc có các nền văn minh ngoài Trái Đất với sự thiếu hụt bằng chứng chứng minh cho sự tồn tại của chúng.



**Chúng ta ở quá xa**  
Khi Vũ trụ dân nỏ, vị trí của chúng ta có thể đã trở nên quá xa trong không gian hoặc thời gian.

**Chúng ta không lắng nghe**  
Chúng ta có thể đã không lắng nghe đúng thứ cần nghe, hoặc nghe không đủ lâu, vì người ngoài hành tinh có thể giao tiếp theo những cách không thể tưởng tượng được.

**Sự sống thông minh tự hủy hoại chính mình**  
Có thể các nền văn minh sẽ tự hủy hoại khi đạt đến một điểm nhất định - hoặc chúng sẽ tiêu diệt các nền văn minh bậc cao khác.

**Chúng ta không thể phát hiện sự sống**  
Các nền văn minh khác đang giấu mình, hoặc họ thiếu loại công nghệ tiên tiến cần thiết để liên lạc với chúng ta.

**Chúng ta đã bị ngó lơ**  
Người ngoài hành tinh có thể chọn không tiếp cận với chúng ta, có lẽ vì họ cảm thấy điều đó sẽ không có lợi cho chúng ta hoặc cho họ.

**Chúng ta không nhận ra sự sống thông minh khi nhìn thấy nó**  
Cuộc sống ngoài hành tinh này khác đến mức chúng ta có thể không xác định được chúng, ngay cả khi chúng sở hữu trước mắt.



**SỰ TỒN TẠI CỦA HƠN 3.500 NGOẠI HÀNH TINH ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN**



# Chuyến bay không gian


Tất cả các tàu vũ trụ đều là những vật chuyển động đạn đạo, bắn ra sau một cú nổ nhiên liệu ban đầu. Chúng rơi tự do, hoàn toàn phụ thuộc vào lực hấp dẫn từ các thiên thể lớn, mặc dù một số tàu có thể điều chỉnh hướng đi của mình đôi chút nhờ các tên lửa lái nhỏ.

## Rơi tự do trong không gian

Sau khi được phóng từ Trái Đất, một con tàu vũ trụ không bay lên mà rơi xuống. Các phi hành gia trong không gian vẫn chịu ảnh hưởng của lực hấp dẫn – từ Trái Đất hoặc Mặt Trời – nhưng họ sẽ trải nghiệm tình trạng không trọng lượng khi tàu vũ trụ rơi xung quanh những hành tinh này. Một tàu vũ trụ bay quanh Trái Đất, nhưng va chạm sẽ không bao giờ xảy ra vì vận tốc về phía trước của con tàu, kết hợp với lực hấp dẫn, tạo ra một quỹ đạo cong, theo đường cong Trái Đất.

### Đến thăm Sao Hỏa

Ngược với trực giác thông thường, việc du hành tới Sao Hỏa sẽ hiệu quả hơn khi hành tinh này ở xa nhất, tức là ở phía "đối diện", khi Mặt Trời nằm giữa Sao Hỏa và Trái Đất. Đó là vì cách dễ nhất là đi dọc một hình elip theo đường cong của quỹ đạo Trái Đất ở một đầu và quỹ đạo Sao Hỏa ở đầu kia.



**VOYAGER 2 ĐÃ SỬ DỤNG LỰC HẤP DẪN CỦA SAO HẢI VƯƠNG ĐỂ GIẢM TỐC VÀ CHỤP ẢNH MẶT TRĂNG TRITON CỦA HÀNH TINH NÀY**



## Vận tốc thoát ly


Một vật thể được bắn với vận tốc đủ lớn có thể thoát khỏi trường lực hấp dẫn của Trái Đất và đi theo một đường cong mở vào không gian, rồi rơi xung quanh một thiên thể khác. Quỹ đạo và vận tốc phóng ban đầu của tàu vũ trụ giữ vai trò rất quan trọng. Thật vậy, nếu một phi thuyền được phóng lên Mặt Trăng với vận tốc quá lớn, nó có thể không kịp giảm tốc khi đến nơi, vì lực hấp dẫn yếu của Mặt Trăng sẽ không đủ để ngăn nó bay qua.



### 1 Không thể rời khỏi Trái Đất

Nếu một tàu vũ trụ không đạt đủ vận tốc sau khi được phóng lên, nó sẽ chẳng thể đạt được quỹ đạo phù hợp, và sẽ không thoát khỏi lực hấp dẫn của hành tinh, cuối cùng rơi trở lại Trái Đất.






## Hỗ trợ hấp dẫn

Một tàu du hành trong không gian có thể tiết kiệm thời gian và nhiên liệu bằng cách sử dụng quỹ đạo quay quanh một hành tinh để thay đổi hướng, tăng tốc hoặc giảm tốc. Lực hấp dẫn của hành tinh sẽ kéo tàu vũ trụ đi theo, và càng đến gần bề mặt hành tinh, thì vận tốc mà tàu thu được càng lớn. Loại chuyển động này được gọi là chuyển động náo cao su hay hỗ trợ hấp dẫn.

### Đa trợ


Tàu thăm dò liên hành tinh Voyager 2 đã sử dụng hỗ trợ hấp dẫn từ Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương, để cuối cùng đến được vùng ngoài của Hệ Mặt Trời.

### VOYAGER 2



## NEO ĐẬU TRONG KHÔNG GIAN

Năm điểm Lagrange (L1-L5) là các điểm trong không gian mà tại đó một vật nhỏ có thể giữ vị trí ổn định so với hai vật thể lớn, nhờ vào lực hấp dẫn chung của hai vật thể lớn. Ví dụ, một vật thể tại L1 được kéo bởi lực bằng nhau về phía cả Mặt Trời và Trái Đất. Những vị trí này là khá tốt để "đậu" vệ tinh không gian.





# Sống trong không gian

Không gian là một môi trường “thù địch” và kỳ lạ. Ngoài việc du hành trong chân không, hoàn toàn không có khí quyển bảo vệ ta khỏi bức xạ, các phi hành gia còn phải đối mặt với tình trạng không trọng lượng do rơi tự do. Ngay cả các hằng số, chẳng hạn như thời gian, cũng chẳng hề như ta tưởng tượng.

## Thế giới không trọng lượng

Các phi hành gia và mọi thứ trong tàu vũ trụ của họ luôn ở trong trạng thái rơi tự do liên tục – hoặc “rơi” tự do quanh Trái Đất, hoặc rơi tự do quanh Mặt Trời trong một quỹ đạo lớn hơn. Trong trạng thái không trọng lượng, cơ thể con người phải chịu vô số căng thẳng (xem trang 218-219) và vật chất cũng hoạt động rất lạ lùng – ví dụ, nước không chảy và khí nóng không bay lên. Do đó, việc giữ cho các phi hành gia trên một con tàu vũ trụ an toàn và khỏe mạnh cần đến sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cũng như đòi hỏi sự thích nghi đáng kể với môi trường và hành vi mới.



## Cuộc sống trong không gian

Các hoạt động hằng ngày trên tàu vũ trụ có thể cực kỳ phức tạp, nhưng các phi hành gia buộc phải duy trì các thói quen hằng ngày tương tự như khi ở Trái Đất để giữ gìn sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần.

### Nhà vệ sinh trong không gian

Nhà vệ sinh trong không gian sử dụng cốc hút chân không và tái chế nước tiểu thành nước uống. Phân được lưu trữ lại, thay vì thải đi, để nó không trở thành một vật phóng trong không gian.



### Lực hấp dẫn vi mô

Các phi hành gia di chuyển quanh tàu vũ trụ bằng cách đẩy nhẹ vào bề mặt các vật. Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) được trang bị chỗ giữ chân và dây bảo hiểm để các phi hành gia dễ dàng ổn định vị trí.

Túi ngủ có dây đai cho đầu và cổ

Chốt nắm tay hoặc chân

NGỦ

MÔI TRƯỜNG KHÔNG TRỌNG LƯỢNG




LỬA


Vì không khí nóng không bốc lên trong không gian, lửa sẽ cháy theo hình cầu. Trong trường hợp hỏa hoạn, các phi hành gia phải nhanh chóng điều chỉnh hệ thống thông gió và sử dụng bình chữa cháy.

## NGHỊCH LÝ CẶP SINH ĐÔI

Trong câu đố này, một người trong cặp sinh đôi rời khỏi Trái Đất, rồi sau khi di chuyển gần với tốc độ ánh sáng hoặc gần trường hấp dẫn mạnh, người ấy trở về nhà và thấy người anh em sinh đôi của mình đã già đi nhanh hơn. Thuyết tương đối hẹp (xem trang 140-141) giải thích cách mà người du hành vũ trụ trải nghiệm thời gian chậm hơn so với người anh em song sinh.



TRƯỚC  
HÀNH TRÌNH  
KHÔNG GIAN



SAU  
HÀNH TRÌNH  
KHÔNG GIAN



### Giấc ngủ trong không gian

Không có lực hấp dẫn thì cũng không có cảm giác nằm xuống. Các phi hành gia buộc mình trong túi ngủ và cố định cánh tay của họ. Đầu của phi hành gia cũng có thể được buộc xuống để giảm lực căng lên cổ.





### Không khí không di chuyển

Không có sự thông gió, không khí không lưu thông, cho phép carbon dioxide tập trung quanh đầu và không khí nóng quanh cơ thể. Mồ hôi không bốc hơi.



### Nước

Nước không chảy mà đông lại thành dạng cầu do sức căng bề mặt. Các phi hành gia phải tắm khô và dùng khăn mặt để rửa. Họ uống nước bằng ống hút hoặc cốc được thiết kế đặc biệt.

## CHÚNG TA CÓ THỂ SỐNG TRONG KHÔNG GIAN TRONG BAO LÂU?

Con người vẫn đang đi tìm giới hạn của mình. Kỷ lục gia hiện tại, nhà du hành vũ trụ người Nga, Valeri Polyakov, đã ở trên Trạm Vũ trụ Mir trong 437 ngày vào năm 1994-1995.



### Thức ăn

Các phi hành gia thêm chất lỏng vào thực phẩm mất nước để biến chúng thành thực phẩm ăn được. Khay đựng thức ăn và muỗng nĩa cũng được buộc vào lồng, còn sức căng bề mặt của thực phẩm giúp nó dính vào khay và không lơ lửng xung quanh.



## MỘT PHI HÀNH GIA CÓ THỂ CAO THÊM ĐẾN 3% KHI SỐNG TRONG KHÔNG GIAN

## Bức xạ trong không gian

Bức xạ bao gồm các hạt tích điện và sóng điện từ truyền trong không gian. Trên Trái Đất, khí quyển đã bảo vệ chúng ta khỏi hầu hết những thứ này, nhưng khi các phi hành gia vượt ra ngoài quỹ đạo Trái Đất tầm thấp, bức xạ bắt đầu trở nên nguy hiểm nghiêm trọng. Bức xạ có thể bị ion hóa hoặc không ion hóa. Bức xạ ion hóa có thể tước electron khỏi nguyên tử, từ đó khiến các tế bào chết hoặc mất khả năng sinh sản, hoặc gây đột biến.



### Bức xạ tại Trái Đất

Dạng bức xạ ion hóa này gây ra bởi các hạt tích điện bị mắc kẹt trong từ trường Trái Đất. Khu vực chứa bức xạ bị mắc kẹt trên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp được gọi là Vành đai Bức xạ Van Allen.




### Tia cực tím

Bức xạ tia cực tím (UV) thuộc loại không ion hóa: mặc dù các hạt truyền năng lượng cho các nguyên tử, chúng không tước đi các electron. Có thể dễ dàng chặn tia UV bằng cách đeo kính phản quang và mặc đồ mờ đục bên ngoài tàu vũ trụ.



### Bức xạ hạt mặt trời

Bức xạ ion hóa này xuất hiện khi Mặt Trời giải phóng các hạt đầy năng lượng từ bề mặt của nó. Có thể chống lại bức xạ này bằng cách phủ vật liệu che chắn lên đồ bảo hộ cho phi hành gia và thiết bị của họ.



### Bức xạ thiên hà

Bức xạ ion hóa này bao gồm các tia vũ trụ - chùm các hạt tích điện năng lượng cao được cho là đến từ siêu tân tinh, và bức xạ điện từ năng lượng cao như tia X từ các thiên thể như sao neutron. Một lớp che chắn dày là cần thiết để bảo vệ chống lại những bức xạ này.



# Du hành không gian

Du hành không gian có tác động đáng kể đến cơ thể và tâm trí con người, các phi hành gia phải chịu đựng nhiều khó chịu về thể chất và nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn. Những người du hành không gian để đến sinh sống trên một hành tinh mới sẽ cần phải chuẩn bị thật tốt, đồng thời có các biện pháp tích cực để giảm thiểu rủi ro.

## LIỆU DU HÀNH KHÔNG GIAN CÓ LÀM GIẢM TUỔI THỌ?

Tiếp xúc với bức xạ là điều nguy hiểm nhất của du hành không gian. Nó có thể rút ngắn sự sống của con người do làm suy yếu hệ thống miễn dịch và gia tăng nguy cơ ung thư.

Hệ thống miễn dịch bị suy yếu, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng hoặc các vấn đề tự miễn dịch

Chứng say trong không gian xảy ra do không trọng lượng và mất phương hướng

Cơ tim yếu đi vì nó hoạt động ít hơn

Đau lưng do giảm áp tủy sống

Chất lỏng tích tụ ở phần trên cơ thể do thiếu lực hấp dẫn

Thị lực bị ảnh hưởng bởi những thay đổi đối với huyết áp trong mắt

Sức khỏe tâm thần bị giảm do sự thay đổi lưu lượng máu đến não

Cơ xương mất đi do không tập thể dục dưới tác động thường xuyên của lực hấp dẫn

Mật độ xương giảm do thiếu sự căng thẳng cơ học cần thiết để giữ cho xương khỏe mạnh


Giấc ngủ bị gián đoạn vì không có đêm và ngày rõ ràng. Trên Trạm Vũ trụ Quốc tế, có 16 lần bình minh và 16 lần hoàng hôn mỗi 24 giờ

## Cơ thể con người trong không gian

Cơ thể con người được thiết kế để hoạt động trong trường lực hấp dẫn của Trái Đất, do đó, tình trạng không trọng lượng sẽ ảnh hưởng đáng kể lên chúng ta. Việc thiếu lực căng thể chất và không tập thể dục dẫn đến suy giảm mật độ xương và mất cơ nhanh chóng, đồng thời giảm hiệu suất tim mạch. Không có lực hấp dẫn, chất lỏng dồn vào phần trên cơ thể, có thể gây ra các vấn đề về mắt và ảnh hưởng đến huyết áp.

## Phi hành gia ốm yếu

Các tác dụng phụ tiêu cực của việc sống trong không gian có thể ảnh hưởng đến hầu hết mọi bộ phận của cơ thể con người. Thể chất và tinh thần khỏe khoắn là điều rất cần thiết cho các du hành gia tương lai.








## GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC

Tập thể dục là rất quan trọng trong việc duy trì mật độ xương và khối lượng cơ bắp, vì vậy các phi hành gia tập luyện tận hai giờ mỗi ngày trong không gian. Họ tuân theo chương trình tập luyện tăng sức mạnh với dây chun và buộc mình vào máy đạp xe và chạy bộ để tập tim mạch. Các phi hành gia chủ yếu tập thể dục cho phần thân dưới, vì phần này xấu đi nhanh nhất trong điều kiện lực hấp dẫn thấp.

Hoạt động  
kích thích  
tim và tập  
luyện cơ  
bắp cho  
phần thân  
dưới



### Chuẩn bị

Một tàu không người lái được gửi đến Sao Hỏa có thể triển khai lò phản ứng hạt nhân để tạo ra phản ứng giữa carbon dioxide trong không khí Sao Hỏa với hydro từ Trái Đất, để tạo ra khí methan làm nhiên liệu. Sản phẩm phụ là nước, có thể được lưu trữ, hoặc phân tách thành hydro và oxy.



### Lên đường

Đường bay ngắn nhất tới Sao Hỏa sẽ đưa tàu vũ trụ tới đó sau 180 ngày. Phi hành đoàn sẽ ở lại trên Sao Hỏa trong một năm rưỡi trước khi có khoảng thời gian thích hợp để tàu khởi động cho chuyến trở về. Tàu vũ trụ sẽ hạ cánh trong một khu vực có khả năng có chứa nước.



### Khai thác nước

Nước trên Sao Hỏa rất dồi dào nhưng chúng bị đóng băng trong các đồng băng và chứa trong lòng đất. Nước ở Sao Hỏa có thể được chiết xuất bằng cách làm nóng đất; ngoài ra, nước muối cô đặc hoặc nước được làm nóng nhờ năng lượng địa nhiệt cũng có thể được tìm thấy dưới lòng đất.



### Làm thế nào để con người có thể sinh sống trên Sao Hỏa?

Sao Hỏa nằm trong tầm tay: chúng ta có thể di chuyển trực tiếp tới đó trong các tàu vũ trụ tương đối nhỏ, bằng cách sử dụng cùng thứ công nghệ từng đưa con người lên Mặt Trăng. Mặc dù việc tự cung tự cấp hoàn toàn trên Sao Hỏa còn khá xa, nhưng những cư dân đầu tiên vẫn có thể sống ở vùng đất này đến một mức độ nào đó, thậm chí sau đó còn có thể sản xuất các mặt hàng để trao đổi thương mại với Trái Đất.



### Địa khai hóa Sao Hỏa

Sao Hỏa lạnh và khô nhưng hành tinh này có các yếu tố cần thiết để hỗ trợ sự sống. Bầu khí quyển ban đầu của nó có thể được xây dựng bằng cách tăng mức độ carbon dioxide, tạo ra hiệu ứng nhà kính làm tăng nhiệt độ.



### Nuôi trồng thực phẩm

Đất Sao Hỏa rất màu mỡ. Cây trồng trong mái vòm có thể được cung cấp nước và carbon dioxide. Thực vật sẽ sản xuất oxy, trong khi nhóm thực vật không ăn được có thể được sử dụng làm phân bón.



### Gạch xây dựng

Những căn nhà đầu tiên có thể được dựng lên từ các kén kim loại và nhựa liên kết, được tàu vũ trụ vận chuyển đến Sao Hỏa. Sau đó, các tòa nhà có thể được xây từ gạch, vì đất Sao Hỏa khá lý tưởng để làm gạch và vữa.

**PHẢI MẤT 900 NĂM ĐỂ LÀM  
CHO BẦU KHÔNG KHÍ SAO  
HỎA TRỞ NÊN HOÀN TOÀN  
CÓ THỂ THỞ ĐƯỢC**







# TRÁI ĐẤT




# Bên trong Trái Đất

Trái Đất là một trong bốn hành tinh đá nhỏ có quỹ đạo gần Mặt Trời. Được hình thành bởi lực hấp dẫn, nó phát triển thành một thế giới đa tầng, năng động, với lõi cực nóng, lớp vỏ đá mát, đại dương nước lỏng và bầu không khí thoáng đãng.

## Trái Đất hình thành như thế nào?

Khi Mặt Trời hình thành khoảng 4,6 tỷ năm trước, nó được bao quanh bởi một đám mây hình đĩa gồm các mảnh vụn đá và băng giá. Bị hút vào nhau bởi lực hấp dẫn, các mảnh trôi dạt vào nhau – một quá trình gọi là bồi tụ – để tạo thành các khối lớn hơn; cuối cùng chúng phát triển thành Trái Đất và các hành tinh khác trong Hệ Mặt Trời. Lượng nhiệt dư dôi tạo ra trong quá trình này đã trở thành nguyên nhân đứng sau cấu trúc lớp của Trái Đất.



### 1 Hình thành


Mỗi vật thể vật lý đều có lực hấp dẫn đối với các vật thể khác. Các vật thể lớn hình thành nên Trái Đất đã bị hút vào nhau với lực mạnh đến mức năng lượng tương tác của chúng chuyển thành nhiệt, một phần trong đó đã làm tan chảy vật chất và kết dính chúng lại với nhau.

### 2 Nóng chảy và tạo lớp

Trong quá trình phát triển Trái Đất nhờ bồi tụ, năng lượng từ va chạm tạo ra đủ nhiệt để làm tan chảy toàn bộ hành tinh. Vật liệu nặng nhất chìm xuống vùng trung tâm để tạo thành lõi kim loại, được bao quanh bởi các lớp đá nhẹ hơn.

## Đại dương và lục địa

Lớp vỏ bên dưới các đại dương (lớp vỏ đại dương) bao gồm chủ yếu là đá bazan và gabbro – những loại đá khá đặc, giàu sắt, tương tự những loại đá thậm chí còn đặc hơn ở trong lớp phủ dưới. Nhưng theo thời gian, núi lửa và các quá trình địa chất khác đã tạo ra các lớp đá silic dày như đá granit, tạo thành các lục địa. Lớp vỏ lục địa dày có khối lượng riêng kém hơn đá manti rất nhiều, vì vậy nó nổi lên trên như những tảng băng trôi trên đại dương ở cực. Đây là lý do tại sao các lục địa nổi cao trên đại dương.





### 3 Trái Đất ngày nay

Sau lần nóng chảy ở giai đoạn đầu, hành tinh nhiều lớp đã nguội dần, sau đó xuất hiện các đại dương nước lỏng. Phần lớn hành tinh đã hóa cứng, nhưng phần lõi ngoài vẫn nóng chảy.

Các khí, như oxy, tạo thành bầu khí quyển

Lớp vỏ đại dương mỏng làm từ những đá đặc, giàu sắt làm nền cho đáy đại dương

Lớp vỏ lục địa dày bao gồm đá tương đối nhẹ, giàu silic

Lớp vỏ mát và lớp phủ trên cùng tạo thành thạch quyển đá

Bên dưới thạch quyển là quyển mềm, dẻo, nóng chảy một phần

Các dòng nhiệt gọi là chùm manti dâng lên từ ranh giới lõi-lớp phủ qua lớp phủ

Lớp phủ dưới sâu là đá nóng, đủ chuyển động nhưng vẫn ở thể rắn

Lõi trong kim loại nặng là hỗn hợp sắt và nickel rắn


Lõi ngoài lỏng được cấu tạo từ sắt, nickel nóng chảy và lưu huỳnh

Đá phun trào từ đáy đại dương hình thành nên các lục địa

Nước có lẽ đã từng bao phủ toàn bộ hành tinh

## CÁC CỰC TRÁI ĐẤT

Phần lõi ngoài bằng kim loại lỏng được giữ cho chuyển động bởi dòng nhiệt và vòng quay của Trái Đất. Điều này tạo ra điện, từ đó hình thành một từ trường trên khắp hành tinh. Trường này gần như thẳng hàng với trục Trái Đất, vì thế, cực từ Bắc gần với cực Bắc địa lý. Nhưng vị trí của nó luôn dịch chuyển, ở mức tối đa 50 km mỗi năm.



**5.500°C LÀ NHIỆT ĐỘ CỦA LỖI TRONG TRÁI ĐẤT - TƯƠNG ĐƯƠNG NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT CỦA MẶT TRỜI**



# Kiến tạo mảng

Thạch quyển Trái Đất (lớp vỏ giòn, nằm trên cùng của lớp phủ) được chia thành các phần gọi là các mảng kiến tạo. Nhiệt phát ra từ lõi Trái Đất khiến cho các mảng này liên tục dịch chuyển, hoặc đẩy chúng ra xa nhau, hoặc kéo chúng lại với nhau, từ đó dịch chuyển các lục địa, dựng lên những ngọn núi và trở thành nguồn nhiệt cho các núi lửa.


## Rãnh, kẽ nứt, và núi

Sâu bên trong hành tinh, các nguyên tố đang phóng xạ tạo ra nhiệt (xem trang 36-37), lượng nhiệt này cùng với nhiệt thoát ra từ lõi khiến lớp phủ dịch chuyển theo những dòng đối lưu rất chậm. Chuyển động này kéo các mảng kiến tạo tách ra ở một số nơi, tạo thành những kẽ nứt dài. Ở những nơi khác, nó đẩy các mảng lại với nhau, tạo ra khu vực hút chìm nơi cạnh của một mảng chìm vào lớp phủ. Hầu hết các kẽ nứt và khu vực hút chìm nằm dưới đáy đại dương. Kiến tạo mảng làm cho một số đại dương mở rộng, còn số khác thì co lại, và thậm chí còn khiến các lục địa va chạm với nhau.

### CÁC MẢNG KIẾN TẠO DỊCH CHUYỂN NHANH ĐẾN MỨC NÀO?


Trung bình, các mảng kiến tạo dịch chuyển với tốc độ dài ra của móng tay bạn. Kể từ khi lan rộng nhanh nhất, Đới nâng Đông Thái Bình Dương, đang lan ra ở mức dưới 16 cm mỗi năm.

### SỐNG NÚI GIỮA ĐẠI TÂY DƯƠNG DÀI 16.000 KM




#### Vực hút chìm đại dương

Khi các mảng kiến tạo mang lớp vỏ đại dương dịch chuyển cùng nhau, mảng nặng hơn trượt xuống dưới mảng còn lại và tan chảy trong lớp phủ. Từ đây, một rãnh sâu hình thành trong đại dương - như Rãnh Mariana ở Thái Bình Dương.



#### Sống núi giữa đại dương

Các sống núi dài ở đáy đại dương xuất hiện khi các mảng kiến tạo được kéo ra xa khỏi nhau. Điều này làm giảm áp lực lên lớp đá nóng bên dưới, cho phép chúng tan chảy, phun trào và hình thành lớp vỏ đại dương mới, chẳng hạn như tại Sống núi giữa Đại Tây Dương.



#### Khu vực hút chìm đại dương-lục địa


Khi các mảng mang vỏ đại dương và lục địa dịch chuyển cùng nhau, lớp vỏ đại dương nặng hơn bị kéo xuống. Còn lớp vỏ lục địa bị nén, tạo thành những ngọn núi như dãy Andes.





## LỤC ĐỊA TRÔI

Vì các lục địa bắt nguồn từ các mảng kiến tạo dịch động, sự chuyển động không ngừng của các mảng này khiến chúng trôi dạt khắp nơi. Điều này có nghĩa là các lục địa liên tục bị chia tách và ghép nối theo những cách khác nhau. Tại một thời điểm, đã từng có một siêu lục địa được gọi là Pangaea. Nó được tạo ra khoảng 300 triệu năm trước và tách ra khoảng 130 triệu năm sau đó. Các lục địa sẽ tiếp tục dịch chuyển và hình thành lại.




Đá trầm tích cổ đại ghép lại dưới áp lực từ các mảng lục địa va chạm bên dưới


Một số đá trầm tích được đẩy lên nhanh hơn những đá khác

Mắc ma thấm lên và hóa cứng dưới lòng đất

Mảnh vỡ của lớp vỏ đại dương bị kẹt giữa các lớp đá trầm tích




Đá trầm tích từ đáy đại dương cũ tạo nên núi đá




### Khu vực va chạm

Ở nơi sự hút chìm của đại dương-lục địa kéo hai phiến vỏ lục địa lại với nhau, các đại dương và núi lửa cổ đại bị ép vào nhau, và các trầm tích dưới đáy đại dương cũng bị nén lại, tạo thành những dãy núi. Dãy Himalaya hiện đang nằm trên loại ranh giới này.



### Kẻ nứt lục địa

Quá trình địa chất đằng sau sự hình thành thành kẻ nứt lục địa cũng tương tự các sống núi đại dương. Các phiến trong lớp vỏ sụt xuống để tạo nên các thung lũng nứt dài đi cùng các vách đá dựng đứng (như Thung lũng Tách dẫn Lớn ở Đông Phi).



Mảng hút chìm bị tan chảy



## Thế nào là động đất?

Khi các mảng kiến tạo xô vào nhau hoặc trượt qua nhau, sức ép sẽ tích tụ tại phân đứt gãy tạo nên ranh giới giữa các mảng. Lực này làm biến dạng rìa mảng, cho đến khi lớp đá không thể chịu được nữa và bắt đầu bật lại. Nếu điều này xảy ra thường xuyên, độ bật lại tương đối nhỏ và chấn động là không đáng kể. Nhưng nếu vết đứt gãy đã đứng yên suốt một thế kỷ hoặc hơn, các tầng đá sẽ có đủ lực để dịch chuyển tận vài mét chỉ trong vòng vài giây - gây ra một trận động đất thảm khốc.


Đứt gãy tạo thành một vết nứt dài trên toàn khu vực

Chuyển động kiến tạo

Thảm thực vật phát triển trên đường đứt gãy


Mảng vẫn dịch chuyển rất chậm

Biến dạng được đánh dấu bởi thảm thực vật



### 1 Tại đường đứt gãy

Đường đứt gãy đánh dấu ranh giới giữa hai mảng kiến tạo trượt qua nhau. Mỗi mảng dịch chuyển chỉ 2,5 cm mỗi năm.



### 2 Sức ép lên các tầng đá

Nhiều thập niên sau, các mảng tiếp tục dịch chuyển trượt qua nhau, nhưng đường đứt gãy vẫn bị khóa cứng. Điều đó gây biến dạng mảng, gia tăng sức ép.

# Động đất

Các mảng kiến tạo không ngừng dịch chuyển. Nhưng đôi khi, các rìa lởm chởm của mảng kiến tạo bị "khóa chặt" vào nhau, và phải đến khi đủ sức ép tích tụ thì chúng mới bị xé toạc, tạo thành sóng địa chấn gây ra động đất.

## TRẬN ĐỘNG ĐẤT MẠNH NHẤT TỪNG ĐƯỢC GHI NHẬN?

Trận động đất mạnh nhất được ghi nhận cho đến nay xảy ra vào ngày 22/05/1960 tại Chile. Cường độ đo được là 9,5 trên thang Richter và đợt sóng thần xảy ra sau đó đã đến tận Hawaii, Nhật Bản và Philippines.

## Sóng thần

Khi một mảng kiến tạo chuyển động bên dưới một mảng khác ở đáy đại dương, nó sẽ làm biến dạng mảng phía trên, kéo cạnh của mảng này xuống dưới. Khi những tầng đá dạt sang hai bên, mảng kiến tạo bị biến dạng đột nhiên vươn thẳng ra, đẩy một làn sóng lớn dâng lên nhanh chóng trên đại dương. Trên biển, sóng dài và thấp, nhưng khi nó cuộn lại trong vùng nước nông, sóng có thể biến thành một cơn sóng thần tàn khốc.

Mảng đại dương dịch chuyển về phía Đông

Mảng lục địa đẩy về phía Tây

Đường đứt gãy bị khóa




### 1 Đường đứt gãy bị khóa

Một rãnh đại dương sâu nằm gần đất liền là điểm đánh dấu một khu vực hút chìm, nơi đáy đại dương đang trượt xuống dưới một lục địa, nhưng đứt gãy giữa các mảng đã bị khóa.

Khu vực đứt gãy vốn bị khóa sụp xuống

Vùng đá ven biển phình lên



### 2 Mảng biến dạng


Bị đường đứt gãy khóa giữ chặt, cạnh chìm của mảng lục địa bị kéo xuống dưới. Điều này gây ra biến dạng mảng, làm khu vực ven biển phình lên.






### 3 Rung lắc và dội lại

Sau một thế kỷ, phần đứt gãy cuối cùng cũng không chịu nổi sức ép. Trong vòng vài phút, cả hai mảng kiến tạo có thể bật lại với khoảng cách lên tới 2,5 m, hình thành sóng địa chấn tỏa ra từ các điểm bên dưới mặt đất (chấn tiêu) và ở bề mặt (chấn tâm).



Mỗi mảng kiến tạo lại tiếp tục dịch chuyển như trước


Thảm thực vật tiếp tục phát triển trên đường gãy nứt



### 4 Sau động đất

Khi bụi đã lắng xuống sau trận động đất chính và các đợt dư chấn, các tảng đá không còn chịu sức ép nữa. Nhưng các mảng kiến tạo vẫn tiếp tục dịch chuyển, vì vậy chu kỳ sẽ lại bắt đầu.

**ƯỚC TÍNH CÓ  
KHOẢNG 500.000  
TRẬN ĐỘNG ĐẤT  
XẢY RA MỖI NĂM,  
TRONG ĐÓ, GẦN  
100 TRẬN GÂY  
RA THIẾT HẠI**




### 3 Đứt gãy và dâng sóng

Khi đứt gãy, rìa của mảng lục địa bật lên, gây ra sóng thần. Sóng tràn lên bờ qua đường bờ biển thấp đi do mảng duỗi thẳng.

### ĐO ĐỘNG ĐẤT

Độ hủy diệt của các trận động đất hiện được đo bằng Thang độ lớn mô men, thay vì sử dụng thang đo cũ - thang đo Richter - bởi vì các phép đo của thang mô men cung cấp cho các nhà khoa học một bức tranh toàn cảnh chính xác hơn về năng lượng được giải phóng trong các trận động đất mạnh nhất. Dữ liệu được thu thập bằng cách sử dụng các dụng cụ gọi là máy đo địa chấn, tạo ra biểu đồ địa chấn cho thấy mức độ chuyển động của mảng kiến tạo.



MÁY GHI ĐỊA CHẤN



# Núi lửa

Đá nóng chảy và khí phun trào từ các vết đứt gãy trên bề mặt Trái Đất gọi là lỗ thông hơi núi lửa, mỗi lỗ thường nằm trong một miệng núi lửa hình chiếc bát. Hầu hết hiện tượng kiểu này xảy ra gần ranh giới mảng kiến tạo, nguyên nhân là bởi các lực đã xé toạc các mảng hoặc kéo chúng lại với nhau.

Một đám mây lớn gồm các hạt thủy tinh và đá nhỏ có thể bay lên không trung

Tro núi lửa rơi xuống từ đám mây; các hạt nặng nhất lắng xuống gần miệng núi lửa

Dung nham thường phun trào từ lỗ thông hơi ở sườn núi lửa

## Tại sao núi lửa hình thành?

Có ba loại núi lửa chính. Một số phun trào từ khe nứt giữa các mảng địa hoặc đại dương. Những núi lửa khác, với nhiều loại dung nham khác nhau, phun trào trên các khu vực hút chìm, nơi một mảng kiến tạo chuyển động bên dưới một mảng khác. Loại núi lửa thứ ba gây ra do các điểm nóng trong lớp phủ manti, những điểm này làm đá tan chảy cục bộ ngay dưới lớp vỏ – phun trào kiểu này thường cách xa ranh giới mảng.

## ĐÂY LÀ LOẠI NÚI LỬA NGUY HIỂM NHẤT?

Không phải là các núi lửa hoạt động thường xuyên, mà là những núi rất hiếm khi phun trào. Áp lực to lớn tích tụ bên trong chúng có thể gây ra những vụ nổ thảm khốc.

Dòng dung nham tạo nên núi lửa hình nón với độ dốc nông, giống như lá khiên có vòm rộng

Dung nham lỏng chảy nhanh và lan ra khoảng cách xa

Đá nóng chảy và khí phun trào từ miệng núi lửa

Chuyển động của mảng kiến tạo

Các lớp vỏ bị gãy chìm xuống lớp phủ

VỎ TRÁI ĐẤT

Magma dâng qua lớp vỏ

Đá manti nóng chảy để tạo thành bazan nóng chảy

LỚP PHỦ MANTI

THẠCH QUYỂN

### Núi lửa ở khe nứt

Các mảng kiến tạo tách ra khỏi nhau sẽ làm giảm áp lực lên lớp phủ bên dưới, cho phép một số đá nóng chảy ra. Chúng sẽ phun trào dưới dạng dung nham bazan lỏng, lan ra tạo thành núi lửa hình khiên rộng.

Những đám mây tro bụi khổng lồ bốc lên từ các loại núi lửa này

Loại dung nham nhớt này tạo nên những núi lửa với sườn dốc lớn

LỚP VỎ ĐẠI DƯƠNG

Mảng kiến tạo bị hút chìm đã hòa tan trong nước biển

LỚP PHỦ MANTI

Magma dâng lên qua các vết nứt trong lớp vỏ

LỚP VỎ LỤC ĐỊA

THẠCH QUYỂN

Nước sôi trào lên lớp đá phía trên và khiến nó chảy

### Núi lửa khu vực hút chìm


Lớp vỏ đại dương bị sụp xuống các khu vực hút chìm mang theo nước làm thay đổi tính chất của đá nóng, khiến nó tan chảy. Tại những ngọn núi lửa này, đá nóng chảy phun trào thành dung nham nhớt đặc.







## Có gì bên trong một ngọn núi lửa?

Một núi lửa ở khu vực hút chìm thường có hình nón dốc đứng gọi là núi lửa dạng tầng, được tạo thành từ các lớp dung nham và tro núi lửa. Cấu trúc đó là do loại dung nham của núi lửa này rất dính nhớt và thường xuyên chặn miệng núi lửa, dẫn đến những đợt phun trào phát nổ – ô ạt đẩy đá và tro bụi lên không trung rồi rơi trên sườn núi lửa.



## Các loại phun trào

Núi lửa phun trào theo những cách khác nhau tùy thuộc vào bản chất loại dung nham của chúng. Dung nham lỏng của núi lửa tại kẽ nứt và điểm nóng sẽ gây ra phun trào nứt nhẹ và phun trào theo “kiểu Hawaii”. Dung nham dính dễ phát nổ hơn, gây ra các vụ phun trào kiểu Stromboli, Vulcano, Pelée và Pliny. Dung nham càng dính, nổ càng lớn.



### Núi lửa ở điểm nóng

Những loại núi lửa này nhận năng lượng từ các dòng nhiệt bị cô lập, được gọi là các chùm manti, dâng lên bên dưới lớp vỏ. Sự dịch chuyển của mảng kiến tạo trên điểm nóng có thể tạo ra các chuỗi núi lửa, chẳng hạn như ở Hawaii và quần đảo Galápagos.

Nhiệt tăng qua lớp phủ tạo thành điểm nóng dưới đáy đại dương




90%  
HOẠT ĐỘNG  
NÚI LỬA  
XẢY RA  
DƯỚI NƯỚC



## TUỔI CỦA ĐÁ

Một số đá lửa có thể được xác định niên đại bằng cách phân tích các tinh thể có chứa các nguyên tố phóng xạ nặng. Vì các nguyên tố này phân rã (thay đổi) thành các nguyên tố nhẹ hơn với tốc độ xác định (xem trang 37), tỷ lệ của chúng trong tinh thể giúp ta đo được khoảng thời gian trôi qua kể từ khi tinh thể hình thành. Nhưng nếu tinh thể là một phần của lớp đá trầm tích, thì kỹ thuật này chỉ giúp xác định niên đại tinh thể chứ không phải toàn bộ lớp đá. May mắn thay, những lớp đá như vậy có thể được xác định theo tuổi của bất kỳ hóa thạch nào mà chúng chứa.



Các nguyên tử urani bên trong một tinh thể phân rã thành chì với tốc độ ổn định

Tỷ lệ nguyên tử chì so với nguyên tử urani giúp xác định tuổi tinh thể

TINH THỂ ZIRCON

# Chu kỳ đá


Đá được tạo thành từ hỗn hợp các khoáng chất, chẳng hạn như thạch anh hoặc calcite. Một số đá rất cứng, số khác mềm hơn nhiều, nhưng theo thời gian chúng đều bị xói mòn và rồi lại tập hợp để hình thành các loại đá mới trong một chu trình gọi là chu kỳ đá, hay chu kỳ thạch học.

## Biến đổi liên tục

Khi đá nóng chảy nguội đi, các khoáng chất mà nó chứa sẽ kết tinh (hóa cứng) tạo thành nhiều loại đá lửa rắn, cứng. Theo thời gian, phong hóa phá vỡ chúng thành các trầm tích mềm hơn, có thể tạo thành các lớp đá trầm tích. Nhiệt và áp suất có thể biến đổi đá trầm tích này thành đá biến chất cứng hơn. Nếu những đá này được chôn sâu, chúng có thể tan chảy, cuối cùng nguội lại để tạo thành nhiều đá lửa.

## LOẠI ĐÁ CÓ TUỔI ĐÒI LÂU NHẤT TRÊN TRÁI ĐẤT LÀ ĐÁ GÌ?

Các tinh thể zircon được tìm thấy ở khu vực Đồi Jack ở miền Tây nước Úc được xác định niên đại là 4,4 tỷ năm – gần với tuổi Trái Đất (4,5 tỷ năm tuổi)!



Dạng tinh thể nhỏ

## ĐÁ LỬA PHUN TRÀO

Mắc ma phun trào từ một ngọn núi lửa được gọi là dung nham. Nó nguội đi nhanh chóng, tạo thành các tinh thể khoáng nhỏ trong một khối rắn. Dung nham phun trào từ các núi lửa khu vực hút chìm thường tạo thành rhyolit, loại đá chủ yếu gồm các tinh thể thạch anh và tràng thạch. Rhyolit rất cứng, tương tự như các loại đá lửa phun trào khác với cấu trúc tinh thể nhỏ, chẳng hạn là andesite và bazan.

## RHYOLIT

Làm lạnh nhanh

Dạng tinh thể lớn

Làm lạnh chậm


Đá nóng nằm sâu dưới mặt đất thường ở trạng thái rắn, nhưng những thay đổi hóa học hoặc áp suất giảm có thể khiến nó tan chảy, tạo thành đá lỏng nóng (mắc ma). Vì nó ít đậm đặc hơn đá rắn, mắc ma sẽ thẩm lên bề mặt. Khi nó nguội đi, các tinh thể bắt đầu hình thành.

## KẾT TINH

Khoáng sản uốn cong

## Nóng chảy








# Đại dương

Trái Đất là một hành tinh có màu chủ đạo là xanh lam, bởi phần lớn bề mặt của nó được bao phủ bởi các đại dương. Có tổng cộng năm đại dương – Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương và Nam Băng Dương – và các dòng hải lưu chảy chậm chậm qua cả năm đại dương này.

**RÃNH MARIANA Ở THÁI BÌNH DƯƠNG CÓ THỂ CHƠI VỪA ĐỈNH EVEREST VÀO TRONG MÀ VẪN THỪA 2.000 M**



## TẠI SAO NƯỚC BIỂN LẠI MẶN?

Qua hàng triệu năm, nước mưa chảy từ đất liền đã mang theo các khoáng chất mặn ra biển. Những thứ này khiến cho nước biển có vị mặn.

## ĐẠI DƯƠNG MỎ

### Đại dương là gì?

Đại dương không đơn thuần là những vùng nước khổng lồ – chúng được tạo ra bởi các lực do kiến tạo mảng (xem trang 224-225). Khi các mảng kiến tạo Trái Đất bị kéo ra xa nhau, lớp vỏ mới hình thành. Lớp vỏ đại dương nằm sâu hơn nhiều so với lớp vỏ lục địa dày và nhẹ hơn (xem trang 222), chúng tạo thành đáy đại dương. Khi các mảng gặp nhau dưới nước, một mảng bị hút chìm xuống dưới mảng còn lại, tạo ra các rãnh đại dương sâu hoắm. Rìa của các lục địa cũng nằm dưới nước, bị cắt xén bởi xói mòn bờ biển. Biển thềm, tức biển ven bờ trên thềm lục địa, nông hơn nhiều so với đại dương thực sự.


### ĐỒNG BẰNG BIỂN THẨM

Phần đáy thực sự của đại dương, đồng bằng biển thẩm, nằm sâu 3.000–6.000 m dưới những con sóng

Các mảnh vụn đá trôi từ lục địa tích tụ ở cuối lớp vỏ lục địa và dọc theo đồng bằng biển thẩm

## DÒNG CHẢY ĐẠI DƯƠNG

Gió đẩy các dòng hải lưu bề mặt xoáy quanh các đại dương, mang theo nước lạnh vào vùng nhiệt đới và chuyển nước ấm về phía các cực. Chúng liên kết với dòng chảy sâu gồm những dòng nước mặn và lạnh chìm xuống đáy đại dương. Cùng nhau, các dòng chảy này mang nước biển đi khắp thế giới trong một mạng lưới thường được gọi là băng vận chuyển toàn cầu.




## DÒNG CHẢY ĐẠI DƯƠNG





## TẠI SAO THỦY TRIỀU LẠI LÊN VÀ XUỐNG?

Lực hấp dẫn của Mặt Trăng kéo khối nước đại dương thành một hình bầu dục với hai đoạn phình lên. Khi Trái Đất quay, bờ biển đi vào và ra khỏi những chỗ phình này, tạo nên hiện tượng thủy triều lên và xuống hằng ngày. Khi Mặt Trăng thẳng hàng với Mặt Trời, thời điểm trăng tròn và trăng non, lực hấp dẫn kết hợp của chúng gây ra thủy triều lớn hơn. Lúc trăng khuyết, lực hấp dẫn của Mặt Trăng vuông góc với Mặt Trời, thủy triều yếu hơn.



## BIỂN THỀM

## ĐƯỜNG BỜ BIỂN

Đáy của biển thềm, vùng thềm lục địa, thường sâu chưa đến 150 m dưới mặt nước

Đáy biển dốc xuống qua vùng thềm và trải xuống đáy đại dương

THỀM LỤC ĐỊA

Rìa lục địa tạo thành sườn lục địa, dốc xuống độ sâu ít nhất 2.500 m

CHÂN LỤC ĐỊA

TRẦM TÍCH

## Tạo sóng

Khi một cơn gió thổi qua đại dương, nó làm dâng sóng trên bề mặt. Gió càng mạnh và thổi càng lâu, sóng càng lớn. Sóng cũng trở nên lớn hơn khi chúng đi xa hơn. Các phân tử nước di chuyển theo một đường tròn, đó là lý do tại sao nếu bị sóng đánh phải, ta sẽ được đưa lên cao và về phía trước, rồi rơi xuống và lùi lại khi sóng đi qua.

Các phân tử nước di chuyển theo đường tròn

Các phân tử nước dội lại từ đáy biển

VÙNG NƯỚC NÔNG

HƯỚNG SÓNG

VÙNG NƯỚC SÂU

Vòng lặp tròn không đi quá độ sâu này

Các phân tử nước chuyển động theo hình elip và sóng đổ

1

### Mặt nước mở

Trên biển, sóng làm cho nước cuộn lên và tiến về phía trước, rồi rơi xuống và lùi lại. Các phân tử nước di chuyển theo một đường tròn.

2

### Sóng dâng cao hơn

Các phân tử nước dội ngược trở lại từ đáy biển, khiến sóng ngắn hơn và dốc hơn khi đến gần bờ.

3

### Sóng vỡ

Khi đáy biển trở nên nông hơn, các đường sóng chuyển sang hình elip, làm cho đỉnh sóng dâng quá cao đến nỗi nó lật và vỡ.



# Khí quyển của Trái Đất

Trái Đất được bao bọc bởi các loại khí giúp che chắn, bảo vệ bề mặt khỏi sự phá hủy của bức xạ mặt trời, đồng thời giữ nhiệt vào ban đêm, biến sự sống thành khả thi. Sự lưu thông của không khí trong các tầng khí quyển thấp hơn gây ra hiện tượng chúng ta gọi là thời tiết.

## Khí quyển là gì?

Khí quyển gồm các loại khí – chủ yếu là nitơ, oxy, argon và carbon dioxide. Người ta phân chia khí quyển thành các tầng dựa trên nhiệt độ của chúng: một số tầng khí lạnh dần khi độ cao tăng dần, trong khi các tầng khác ấm dần do một số khí có khả năng hấp thụ các tia từ Mặt Trời. Hầu hết không khí tập trung ở tầng thấp nhất, tầng đối lưu, nhưng mật độ của không khí vẫn giảm dần theo độ cao. Điều này có nghĩa là ở độ cao 10 km tính từ mực nước biển, không có đủ không khí cho con người sống sót.

## TẠI SAO KHÍ QUYỂN KHÔNG TRÔI VÀO KHÔNG GIAN?

Các hạt khí được giữ gần bề mặt Trái Đất là nhờ vào lực hấp dẫn. Mặt Trăng có khối lượng nhỏ hơn nhiều nên lực hấp dẫn của nó cũng yếu hơn nhiều, và do đó, nó không thể giữ được một bầu khí quyển.

Khí quyển hình thành lớp tương đối mỏng quanh Trái Đất



## CÁC LỚP KHÍ QUYỂN

80-600 KM

600-10.000 KM

### Tầng ngoài

Lớp ngoài cùng của khí quyển mờ dần vào không gian và không có ranh giới bên ngoài rõ ràng. Các hạt khí ở tầng này phân tán đến mức chúng không tương tác với nhau.

Nhiều vệ tinh nhân tạo quay quanh Trái Đất nằm ở tầng ngoài



Nhiệt độ ở tầng ngoài thay đổi rất lớn, lạnh hơn vào ban đêm và ấm hơn vào ban ngày

## NHIỆT ĐỘ

### Tầng nhiệt

Nằm phía trên tầng trung lưu, tầng nhiệt kéo dài một khoảng rộng lớn, nhiệt độ của nó tăng dần theo độ cao tới 2.000°C – do các khí trong tầng này hấp thụ tia X và tia cực tím từ Mặt Trời.

Các phân tử hấp thụ tia X và tia cực tím, rồi bức xạ nhiệt

Các nguyên tử oxy và nitơ được bức xạ mặt trời cung cấp năng lượng phát sáng tạo ra cực quang


TẦNG NHIỆT CÓ THỂ NÓNG TỚI 2.000°C





# Quay và xoáy

Trong tầng đối lưu, không khí ẩm lên, chuyển động theo luồng sang bên, người đi và sau đó chìm xuống - những luồng khí lưu thông này phân phối nhiệt trên toàn cầu (xem trang 240-241). Trục quay của Trái Đất làm cho không khí lưu thông theo hướng khác nhau. Ở phía Bắc của đường xích đạo, luồng không khí chuyển động sang bên phải, trong khi ở phía Nam của đường xích đạo, nó hướng sang bên trái. Đây được gọi là Hiệu ứng Coriolis và kết quả là không khí trong mỗi hoàn lưu di chuyển theo hình xoắn ốc trên toàn cầu.



## Hoàn lưu toàn cầu

Những cơn gió thông thường thay đổi hướng bởi các hoàn lưu di chuyển theo hình xoắn ốc và thổi gần bề mặt Trái Đất. Những cơn gió này thổi đều đặn nhất trên các đại dương.

**Tầng trung lưu**

Trong tầng trung lưu, nhiệt độ không khí ban đầu ổn định, sau đó giảm dần theo độ cao. Ở mức lạnh nhất, nó có thể xuống dưới  $-100^{\circ}\text{C}$ .

Các khí trong lớp này  
đủ dày để làm  
chậm sao băng,  
khiến chúng bị  
đốt cháy.

Những mảnh vỡ  
thiên thạch lao  
qua tầng trung lưu  
bị đốt cháy thành  
sao băng

## Tăng bình lưu

Khu vực này có lớp không khí mỏng, khô với nhiệt độ ổn định lên đến khoảng độ cao 20 km, sau đó khí ấm dần lên theo độ cao, vì nó hấp thụ năng lượng mặt trời. Tầng ozone nằm trong tầng bình lưu.

# TẦNG OZONE

Nhiệt hấp thụ tỏa ra từ tầng ozone, tạo ra một túi khí ấm áp

Một lớp khí ozone hấp thụ bức xạ tia cực tím của Mặt Trời

Bóng bay dự báo thời tiết bay lên tầng bình lưu thấp, cao hơn bất kỳ máy bay hoặc chim nào có thể bay

Nhiệt độ giảm  
theo độ cao

## Tăng đối lưu

Lớp thấp nhất của khí quyển chứa không khí chúng ta hít thở và là nơi mọi hiện tượng thời tiết xảy ra. Cả nhiệt độ và mật độ của nó đều giảm dần theo độ cao.


Các máy bay thường bay trong tầng đối lưu, nhưng đôi khi chúng cũng bay vào tầng bình lưu để tránh nhiễu loạn

Mây hình thành  
trong tầng  
đối lưu



# Thời tiết

Thời tiết là trạng thái của bầu khí quyển tại một địa điểm và thời gian cụ thể. Nó thay đổi liên tục vì Mặt Trời làm bốc hơi ẩm vào khối khí nóng, tạo thành những đám mây. Quá trình này thúc đẩy các khối khí áp suất thấp mạnh, hay còn gọi là xoáy thuận, gây ra gió và mưa. Chúng được cân bằng với xoáy nghịch yên bình hơn.



## 1 Khí lạnh gặp khí nóng

Xoáy thuận thường hình thành trên các đại dương ôn đới, nơi các khối không khí nhiệt đới nóng ẩm bị đẩy vào các khối không khí cực, lạnh. Một front (frông khí) là khu vực mà hai khối không khí gặp nhau.

## 2 Hình thành xoáy


Khi chúng di chuyển, cả hai khối khí đi theo những đường cong do chuyển động quay của Trái Đất – một hiện tượng gọi là Hiệu ứng Coriolis. Các đường cong trở thành một mô hình quay và các khối không khí bắt đầu trở thành xoắn ốc.

## Hình thành xoáy thuận

Khi không khí nóng ẩm bốc lên cao, nó tạo ra một vùng khí áp suất thấp, hút không khí xung quanh vào theo hướng xoắn ốc, gọi là xoáy thuận, hay áp thấp. Không khí nóng ẩm dần bị đẩy lên trên, nơi nó gặp phải luồng khí lạnh hơn, đặc hơn, làm cho hơi ẩm của nó ngưng tụ thành mây và mưa. Luồng khí – mà ta gọi là gió – mạnh nhất khi khí nóng bốc lên với hầu hết năng lượng của nó. Ở vùng nhiệt đới, điều này tạo ra những cơn bão rất mạnh được gọi là bão nhiệt đới, bão xoáy, hoặc cuồng phong.

## TUYẾT


Nếu các giọt mây bay lên đủ cao, chúng tạo thành các tinh thể băng sáu mặt siêu nhỏ. Nước đóng băng lên các tinh thể, làm cho chúng dính vào nhau thành những bông tuyết sáu cánh. Những khối này tiếp tục kết lại với nhau thành những khối bông lớn hơn như tuyết rơi.



## LÀM SAO MƯA ĐÁ LẠI RƠI Ở KENYA?

Những đám mây ở vùng nhiệt đới cao đến mức các hạt ẩm trong chúng bay lên đến bầu khí quyển lạnh lẽo phía trên và đóng băng, cuối cùng rơi xuống như mưa đá (xem trang 238-239).

Những đám mây thấp, đặc gần front nóng gây ra mưa liên tục







# HẦU HẾT LƯỢNG MƯA BÊN NGOÀI VÙNG NHIỆT ĐỚI BẮT NGUỒN LÀ TUYẾT VÀ TAN RA KHI RƠI XUỐNG



Khi các front gặp nhau, chúng kết hợp thành một front hấp lưu duy nhất và các khối khí nóng được nhấc lên khỏi mặt đất

Lốc xoáy quay theo chiều kim đồng hồ ở bán cầu Nam (và ngược chiều kim đồng hồ ở bán cầu Bắc).

Không khí bốc lên theo hình xoắn ốc

Những chùm mây ti bay cao là dấu hiệu đầu tiên của front nóng đang tiến về phía trước

Không khí được hút vào từ các khu vực áp suất cao

Biểu tượng cho thấy hướng mà front đang di chuyển

Gió điều khiển toàn bộ hệ thống thời tiết theo hướng này

## XOÁY THUẬN (HỆ THỐNG ÁP SUẤT THẤP)

### 4 Khí nóng rời khỏi mặt đất

Front lạnh thường di chuyển nhanh hơn front nóng, bắt kịp, sau đó nâng toàn bộ khối khí nóng lên khỏi mặt đất. Được đánh dấu bởi sự xuất hiện của một xoáy mây, hiện tượng này được gọi là hấp lưu. Từ thời điểm này, xoáy bắt đầu mất năng lượng và tự di chuyển.

### 3 Front nóng và front lạnh

Mặt cắt bên mở rộng của một xoáy thuận cho thấy khí nóng bốc lên cao trên khí lạnh để tạo thành một "front nóng" di động với độ dốc nông. Nhiều khối khí lạnh hơn tiến lên từ phía sau, đẩy xuống dưới khí nóng, tạo thành một "front lạnh".

HƯỚNG GIÓ

Luồng khí lạnh chêm vào, đẩy khí nóng ẩm lên trên, tạo thành những đám mây cao

Mây cao gây mưa rào nặng hạt


## Xoáy nghịch

Khi không khí lạnh chìm xuống, tạo ra một vùng áp suất không khí cao, nó sẽ chuyển động theo hình xoắn ốc hướng ra ngoài, hình thành xoáy nghịch. Không khí chìm khiến hơi nước bốc lên và mây hình thành, vì vậy bầu trời thường có màu xanh và nắng ấm. Khác biệt về áp suất là tương đối nhỏ trong một xoáy nghịch, do đó gió nhẹ và thời tiết tương đối đẹp và ổn định.

Xoáy nghịch chuyển động nhẹ nhàng theo hướng ngược lại với xoáy thuận

Không khí lạnh chìm xuống và nóng lên

## XOÁY NGHỊCH (HỆ THỐNG ÁP SUẤT CAO)





Các luồng khí thổi lên mạnh mẽ có thể làm cho lõi đám mây cuộn cao lên đến tầng bình lưu

Hầu hết các đám mây ngừng dâng cao, và tỏa sang các bên, do gió

# Thời tiết cực đoan

Hầu hết các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra do sự tích tụ của độ ẩm không khí trong các đám mây vũ tích cao chót vót. Luồng khí mạnh trong những đám mây này gây ra sét, mưa đá và thậm chí là lốc xoáy.

## Siêu mây

Các đám mây vũ tích lớn hơn rất nhiều so với các đám mây thông thường, cao từ gần mặt đất đến tận đỉnh tầng đối lưu (xem trang 235). Chúng được thúc đẩy bởi sự bốc hơi mạnh của hơi ẩm từ mặt đất, hoặc từ bề mặt đại dương. Khi hơi bốc lên và lạnh đi, chúng ngưng tụ thành giọt nước, tạo thành những đám mây khổng lồ, giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt (xem trang 117). Nhiệt làm nóng không khí, khiến không khí bay lên cao hơn nữa, mang theo nhiều hơi nước hơn, rồi ngưng tụ và giải phóng nhiều năng lượng hơn - và chu kỳ cứ thế tiếp tục. Cuối cùng, đám mây có thể cao đến hơn 10 km.

### 1 Bay lên

Những luồng khí thổi lên trên trong đám mây, bên cạnh là khối khí lạnh đang chìm xuống, khiến những giọt nước và tinh thể băng chuyển động lên xuống, tạo ra tĩnh điện (xem trang 78-79) giúp tích điện cho đám mây, biến nó thành một cực pin khổng lồ.

LUỒNG KHÍ LẠNH CHÌM XUỐNG

Hơi ẩm bổ sung được đóng băng ở độ cao lớn hơn

Luồng khí thổi lên có thể giữ được các tinh thể băng đang rơi xuống và nâng chúng trở lại không trung

Điện phóng ra từ đám mây và chuyển động vòng cung qua không khí tạo thành sét

Nhiệt do sét tạo ra làm cho không khí giãn nở cực mạnh, gây ra sóng xung kích mà chúng ta nghe được như tiếng sấm



## 2 Mưa đá hình thành như thế nào?

Tinh thể băng rơi xuống bị các luồng khí thổi ngược lên. Chúng thu được nhiều hơi ẩm hơn, hơi ẩm này đóng băng cùng chúng ở độ cao lớn hơn. Điều này xảy ra nhiều lần, biến tinh thể thành các lớp băng để tạo mưa đá.

Luồng khí lạnh đang chìm giúp các hạt mưa đá nặng hơn rơi xuống

Các hạt mưa đá bị luồng khí thổi lên cao, hút thêm độ ẩm

## BÃO LÀ GÌ?

Sự bốc hơi dữ dội từ các đại dương nhiệt đới tạo thành các hệ thống đám mây khổng lồ xung quanh những vùng áp suất thấp mạnh (xem trang 236). Không khí xoáy vào những vùng này ở tốc độ cao, tạo thành những đợt gió mạnh trong một cơn bão.

LUỒNG KHÍ NÓNG BAY LÊN

## 3 Trận mưa đá

Cuối cùng, các hạt mưa đá trở nên quá lớn và quá nặng để tiếp tục được thổi lên cao, nên chúng sẽ rơi xuống đất.

## LỐC XOÁY

Ở một số nơi trên thế giới, những khối khí lạnh và nóng xoáy vào nhau tạo ra những đám mây vũ tích khổng lồ, xoáy tròn, gọi là siêu hoàn lưu. Không khí xoáy tròn, bốc lên nhanh có thể tạo thành một cơn xoáy lớn, gọi là lốc xoáy, đủ mạnh để xé toạc một ngôi nhà.

**HẠT MƯA ĐÁ**  
**CÓ THỂ TO BẰNG**  
**NĂM TAY NGƯỜI**



# Khí hậu và các mùa


Ánh sáng mặt trời và nhiệt tập trung ở vùng nhiệt đới, phân tán hơn khí về gần các cực. Nhiệt tác động đến các luồng không khí trong bầu khí quyển tạo ra các đới khí hậu trên thế giới.

## Hoàn lưu

Ở vùng nhiệt đới, nhiệt độ cao làm nước bốc hơi từ các đại dương. Khi không khí nóng ẩm bốc lên – tạo ra một dải áp suất thấp gọi là Đới Hội tụ liên Chí tuyến (ITCZ) – nó lạnh dần đi. Hơi nước ngưng tụ thành những đám mây khổng lồ, gây ra mưa lớn. Không khí lạnh khô lại dịch chuyển về các khu vực cận nhiệt đới và chìm xuống, gây ra áp lực cao làm “ức chế” mưa. Đây là hoàn lưu Hadley (hoàn lưu nhiệt đới). Hai hoàn lưu khác – hoàn lưu Ferrel (hoàn lưu ôn đới), và hoàn lưu Polar (hoàn lưu vùng cực) – cũng có tác dụng tương tự ở các khu vực mát mẻ hơn.




ĐỊNH VỊ



### Vùng nhiệt đới

Không khí ẩm bốc lên gần xích đạo tạo nên những đám mây bão lớn, gây mưa lớn hàng ngày, thúc đẩy sự phát triển của rừng mưa nhiệt đới. Cây thải ra hơi nước, vì vậy ở một mức độ nào đó, chúng tự tạo ra khí hậu cho riêng mình.



### Vùng cận nhiệt đới

Khí khối khí xích đạo bốc lên đến đỉnh của tầng đối lưu, nó di chuyển theo chiều ngang cho đến khi mát hơn và chìm xuống vùng cận nhiệt đới. Không khí chìm xuống làm ngừng quá trình hình thành mây, do đó mưa rất ít, tạo ra những sa mạc như Sahara.



**VỆ TINH ĐO ĐƯỢC NHIỆT ĐỘ 70,7°C TRONG SA MẠC LUT CỦA IRAN - NHIỆT ĐỘ CAO NHẤT ĐƯỢC GHI NHẬN TRÊN TRÁI ĐẤT**





## Chu kỳ theo mùa

Khi Trái Đất quay quanh Mặt Trời, trục quay nghiêng của nó luôn hướng về phía sao Polaris, hay sao Bắc Cực. Điều này có nghĩa là các điểm vĩ độ cực và ôn đới lần lượt di chuyển lại gần và ra xa khỏi Mặt Trời, tạo nên mùa hè và mùa đông. Các mùa cực đoan nhất diễn ra ở vùng cực. ITCZ cũng di chuyển về phía Bắc và phía Nam, gây ra mùa khô và mùa mưa nhiệt đới. Gió mùa là do sự thay đổi trong hướng gió, mang không khí ẩm từ các đại dương, và cùng với đó, là những cơn mưa lớn.

Bắc Cực hướng về phía Mặt Trời vào tháng Sáu, vì vậy nó nhận được ánh sáng liên tục

Vào tháng Mười hai, Bắc Cực quay khỏi Mặt Trời, vì vậy nó gần như không nhận được ánh sáng



Tháng Ba



MẶT TRỜI

Tháng Mười hai



Tháng Chín

## ĐÂU LÀ NƠI KHÔ NHẤT TRÊN TRÁI ĐẤT?

Thung lũng khô McMurdo ở Nam Cực đã không có mưa hoặc tuyết trong gần 2 triệu năm. Cảnh quan ở đây chủ yếu là đá trần và sỏi.

### Vùng cực

Không khí lạnh khô chìm xuống trên các vùng cực, tạo thành các sa mạc lạnh. Nó di chuyển ra xa khỏi các cực ở độ cao thấp, nóng lên và thu nhiều hơi ẩm. Khi đến các vùng ôn đới, nó bị kéo lên bởi luồng khí cận nhiệt đới đang bốc lên và thổi trở về phía cực trên cao hơn.



Các khu vực gần front cực thường nhiều mây

Không khí lạnh khô di chuyển về phía xích đạo

HOÀN LƯU FERREL

Không khí nóng ẩm bốc lên

FRONT CỰC

Áp suất thấp

Không khí nóng ẩm bốc lên

HOÀN LƯU CỰC

Không khí lạnh chìm xuống và di chuyển ra xa cực

Áp suất cao

### Vùng ôn đới

Ở vùng ôn đới, luồng khí nóng từ các vùng cận nhiệt đới khi chìm xuống chấp gặp phải không khí vùng cực lạnh hơn. Điều này khiến nó lại nổi lên, hình thành các đám mây và mưa, đặc biệt là trên và gần các đại dương. Những cơn mưa thúc đẩy sự phát triển rừng và đồng cỏ.



**LƯỢNG MƯA CAO NHẤT TRONG MỘT NGÀY TRÊN ĐẢO RÉUNION - ĐƯỢC GHI NHẬN LÀ 1.870 MM VÀO NĂM 1952**

VÒNG CỰC




# Vòng tuần hoàn nước

Nước là sinh lực của hành tinh. Sự sống không thể tồn tại mà không có nước, bởi vì nó thiết yếu cho tất cả các quá trình sinh hóa giúp sinh vật có thể phát triển và sinh sôi. Nếu không có vòng tuần hoàn đem nước đến cho đất, các lục địa sẽ chỉ là những sa mạc vô hồn. Nước cũng định hình hành tinh bằng cách làm xói mòn bề mặt đất của nó.

## Hệ thống lưu thông nước trên Trái Đất

Mặt Trời của chúng ta thúc đẩy vòng tuần hoàn nước - làm nóng các đại dương để sự bốc hơi xảy ra liên tục trên bề mặt của chúng. Nước được mang vào đất liền bởi những đám mây lướt trên gió. Mưa từ mây rơi xuống, ngấm vào đất. Một phần nước này được thực vật hấp thụ, chúng nhả lại vào không khí để tạo thành nhiều đám mây hơn. Hầu hết phần còn lại chảy khỏi đất, hòa vào các dòng sông, tìm đường quay trở lại biển, và thế là chu kỳ lại tiếp tục.





## MÂY

Không khí nóng bốc lên mang theo hơi nước mát dần theo độ cao - khiến hơi nước ngưng tụ thành các giọt nước siêu nhỏ và các tinh thể băng. Những giọt nước và tinh thể này có thể nhìn thấy dưới dạng những đám mây với khả năng trôi đi rất xa nhờ gió.



Độ cao

Gió

**GIÁNG THỦY**

Khi một đám mây lạnh dần đi, các giọt nước và tinh thể băng của nó lớn dần và kết hợp với nhau, cuối cùng tạo thành những hạt nước lớn hoặc những bông tuyết đủ nặng để rơi xuống. Những bông tuyết thường kết lại với nhau thành những khối lớn hơn, mịn hơn.

Tuyết

Mưa

Dòng chảy bề mặt

**NƯỚC NGỌT**

Dòng chảy bề mặt

Thấm dưới lòng đất


**NƯỚC NGẦM**

TRÁI ĐẤT

Vòng tuần hoàn nước

242 / 243

## MỘT SỐ PHẦN CỦA DẢI BĂNG Ở NAM CỰC ĐÃ HƠN 2,5 TRIỆU NĂM TUỔI



## BĂNG

Tuyết rơi ở vùng khí hậu lạnh sẽ không tan ra. Nó tích tụ và bị nén bởi trọng lượng do thêm nhiều tuyết hơn - biến nó trở thành băng. Trên sườn núi, băng đổ xuống từ từ theo những dòng sông băng và tan chảy dần dần, nhưng những tảng băng ở cực có thể không bao giờ tan chảy. Trải qua hàng nghìn năm, sông băng tạo thành những thung lũng sâu hun hút.

Sông băng

## NƯỚC NGỌT

Lượng mưa đọng lại trên mặt đất, hoặc tuyết tan, được gọi là dòng chảy bề mặt. Chúng gộp lại thành sông và hồ, cuối cùng chảy trở lại đại dương. Mưa phản ứng với khí carbon dioxide trong không khí tạo thành acid carbonic làm ứ đọng, hòa tan các khoáng chất vào dòng nước.

## NƯỚC CÓ Ở ĐÂU?

Hai phần ba hành tinh được bao phủ bởi các đại dương, nơi chứa 97,5% lượng nước trên Trái Đất. Chỉ 2,5% nước là nước ngọt. Hầu hết nước ngọt tồn tại dưới dạng băng ở các vùng cực và trên những ngọn núi cao, hoặc nằm sâu dưới lòng đất. Chỉ một phần rất nhỏ tạo thành các sông hồ.

Chỉ 0,3% lượng nước ngọt trên Trái Đất tồn tại ở thể lỏng và ở bề mặt

Các đại dương chứa 97,5% lượng nước trên Trái Đất.

68,9% nước ngọt tồn tại dưới dạng sông băng, tuyết và băng

30,8% còn lại là nước ngầm

Nước mặn

Nước ngọt

Phần còn lại là nước ngọt

## TẤT CẢ NƯỚC CỦA TRÁI ĐẤT



Hang động



Mưa và tuyết tan chảy dưới mặt đất trở thành nước ngầm. Ở các tầng đất thấp hơn, đá bị hòa tan, tạo thành các hồ chứa dưới lòng đất gọi là tầng ngậm nước. Đá vôi có thể được hòa tan để tạo ra các hang động. Nước ngầm cuối cùng cũng thấm trở lại vào các đại dương.



# Hiệu ứng nhà kính

Sự sống trên Trái Đất phụ thuộc vào hiệu ứng nhà kính, hay cách một số loại khí trong khí quyển của chúng ta – đặc biệt là carbon dioxide và methan – hấp thụ một số bức xạ hồng ngoại phát ra từ bề mặt Trái Đất. Giống như một nhà kính thủy tinh, các khí này giữ nhiệt lại.

## 1 Bức xạ đến

Năng lượng bức xạ từ Mặt Trời đến Trái Đất dưới dạng ánh sáng và tia cực tím, cũng như tia hồng ngoại và các ánh sáng có bước sóng khác.

## Quỹ năng lượng của Trái Đất

Thật ra, trong lịch sử, hiệu ứng nhà kính đã từng là một điều tốt – nếu không có lớp khí này, nhiệt độ trung bình của Trái Đất sẽ vào khoảng  $-18^{\circ}\text{C}$ . Tuy nhiên, dù giữ lại một phần bức xạ nhiệt của Trái Đất là điều cần thiết, nếu chênh lệch giữa bức xạ đến và bức xạ đi là quá lớn, nhiệt độ toàn cầu sẽ tăng lên.

## 2 Phản xạ


Một phần năng lượng mặt trời, ở các bước sóng nhất định, bị phản xạ vào không gian. Phần lớn sự phản xạ là từ những đám mây, nhưng các khí trong khí quyển và bề mặt Trái Đất cũng phản xạ một phần bức xạ.

## 3 Hấp thụ năng lượng mặt trời


Hầu hết phần năng lượng mặt trời chiếu tới bề mặt Trái Đất, cho dù đó là ánh sáng nhìn thấy hay tia cực tím, đều được hấp thụ, làm nóng hành tinh.

## 4 Tỏa nhiệt

Một hành tinh nóng cũng tỏa ra năng lượng, nhưng ở bước sóng dài hơn nhiều, thường là tia hồng ngoại. Bức xạ hồng ngoại về cơ bản là bức xạ nhiệt.







## 5 Phát xạ

Phần lớn các bức xạ được khí quyển Trái Đất, các đám mây và bề mặt hấp thụ và phát xạ lại sẽ ra ngoài không gian.

## TRÁI ĐẤT CÓ TÙNG NÓNG HƠN NGÀY NAY KHÔNG?

Gần cuối Đại Trung sinh (thời của khủng long), Trái Đất nóng đến mức không có băng ở hai cực vào mùa hè, và mực nước biển cao đến hơn 170 m so với ngày nay.

## KHÍ NHÀ KÍNH


## 6 Phát xạ ngược

Một số năng lượng hồng ngoại mà Trái Đất phát xạ bị giữ lại bởi các khí nhà kính trong khí quyển. Các khí này nóng lên và tỏa nhiệt trở lại bề mặt Trái Đất, làm tăng nhiệt độ toàn cầu.



## HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH Ở CÁC HÀNH TINH KHÁC

Sao Kim có hiệu ứng nhà kính mạnh hơn nhiều so với Trái Đất. Bầu khí quyển carbon dioxide dày của nó giữ lại gần như toàn bộ năng lượng mặt trời chạm tới bề mặt của nó, tạo ra nhiệt độ đủ nóng để làm tan chảy chì. Ngược lại, ở Titan, mặt trăng lớn nhất của Sao Thổ, lại xảy ra hiệu ứng chống nhà kính, tạo bởi một đám mây màu cam dày, ngăn chặn tới 90% ánh sáng mặt trời. Một hiệu ứng chống nhà kính tương tự, nhưng yếu hơn nhiều, có thể xảy ra trên Trái Đất nhờ khí và bụi phun trào từ núi lửa.



SAO KIM

## Ai là thủ phạm?

Các khí nhà kính chính trong bầu khí quyển Trái Đất bao gồm hơi nước, carbon dioxide, methan, Dinitơ monoxide và ozone. Cấu trúc phân tử của các loại khí này cho phép chúng hấp thụ năng lượng từ bức xạ hồng ngoại, nóng lên và sau đó phát xạ lại để giữ cho hành tinh ấm áp. Một số khí hấp thụ nhiệt tốt hơn các loại khác, do cách các phân tử của chúng tương tác với bức xạ nhiệt. Điều này có nghĩa là một số loại khí, mặc dù có ít trong khí quyển, lại gây hiệu ứng nhà kính mạnh hơn các loại khí khác.

TỶ TRỌNG KHÍ NHÀ KÍNH TRONG KHÔNG GIAN VŨ TRỤ NĂM 2013 (TÍNH BẰNG ĐƠN VỊ MỘT PHẦN TRIỆU, PPB)

395.000 PPB  
Không mạnh lắm, nhưng tỷ trọng lớn của nó khiến hiệu ứng nóng lên ở mức nghiêm trọng

Carbon dioxide  
(CO<sub>2</sub>)

0,080 PPB  
Một khí nhà kính nhân tạo cực kỳ mạnh

Các khí nhân tạo

1.800 PPB  
Mạnh, nhưng tỷ trọng vẫn còn tương đối thấp

Methan  
(CH<sub>4</sub>)

Nitơ oxide  
(N<sub>2</sub>O)

0,07 PPB  
Một khí nhà kính nhân tạo khá mạnh

Tetrafluoroethane  
(CH<sub>2</sub>FCF<sub>3</sub>)

Carbon tetrafluoride  
(CF<sub>4</sub>)

Trichlorofluoromethane  
(CCl<sub>3</sub>F)

325 PPB  
Rất mạnh, nhưng tỷ trọng vẫn còn tương đối thấp

0,235 PPB  
Một khí nhà kính nhân tạo mạnh



# Biến đổi khí hậu

Khí hậu vẫn luôn thay đổi vì lý do tự nhiên. Những thay đổi này diễn ra từ từ, qua hàng nghìn hoặc hàng triệu năm. Tuy nhiên, chúng ta đang sống trong một thời kỳ biến đổi khí hậu nhanh chóng, gây ra bởi sự ô nhiễm của bầu khí quyển do các loại khí làm tăng hiệu ứng nhà kính (xem trang 244-245).

## Chuyện gì đang xảy ra?

Thế giới ngày càng nóng hơn. Nhiệt độ đã liên tục tăng, chỉ ít là từ năm 1910, và 16 trong số 17 năm nóng nhất lịch sử đều diễn ra sau năm 2000. Trong khi đó, phân tích khí quyển từ năm 1958 cho thấy sự gia tăng đều đặn carbon dioxide ( $\text{CO}_2$ ) - loại quan trọng nhất trong các loại khí nhà kính giữ cho hành tinh ấm áp. Lượng  $\text{CO}_2$  dư thừa này đã được tạo ra bởi lối sống hiện đại, "đói năng lượng" của con người.

## Xu hướng tăng đều

Người ta đã ghi lại nhiệt độ không khí trung bình toàn cầu kể từ cuối thế kỷ 19. Dù có lên xuống, nhưng xu hướng chung là tăng lên. Điều này có liên hệ chặt chẽ với sự gia tăng  $\text{CO}_2$  trong khí quyển.

### CHÚ THÍCH

Nhiệt độ trung bình đã được ghi lại kể từ năm 1880. Mức  $\text{CO}_2$  trong lịch sử được đo bằng cách phân tích các vân gỗ trong cây và lõi băng.

- Nhiệt độ bề mặt trung bình toàn cầu
- Mức  $\text{CO}_2$  trong khí quyển
- Dữ liệu dự kiến

Nhiệt độ giảm tự nhiên vào cuối thế kỷ 19

Đến năm 1880, ngành công nghiệp sử dụng than làm nhiên liệu đã làm tăng mức  $\text{CO}_2$

## MỨC NƯỚC BIỂN CÓ THỂ TĂNG ĐẾN BAO NHIÊU?

Nếu các dải băng ở hai cực tan chảy, mực nước biển có thể tăng lên tới 25 m, gây ngập lụt khắp các thành phố ven biển như London, New York, Tokyo và Thượng Hải.

## Gia tăng khí nhà kính

Nguồn chính của lượng  $\text{CO}_2$  tăng thêm là do đốt nhiên liệu hóa thạch như than và dầu. Chúng ta cũng thải ra nhiều loại khí nhà kính khác, gồm methan và nitơ oxide được giải phóng do phương thức canh tác hiện đại, cũng như các khí fluor hóa (khí F) nhân tạo được sử dụng trong các bình xịt và hệ thống làm lạnh.

CARBON DIOXIDE TRONG KHÍ QUYỂN (PHẦN TRIỆU)

$\text{CO}_2$  từ nạn phá rừng và phân hủy sinh học

71%  
Carbon dioxide ( $\text{CO}_2$ ) từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch

2%

21%  
Methan ( $\text{CH}_4$ )

1%

Khí F (khí nhân tạo chứa fluor)

Nitơ oxide ( $\text{N}_2\text{O}$ )



280

300

320

340

360

380

400

NĂM

1880

1900

1920

1940





## Vòng tròn luẩn quẩn

Nếu nhiệt độ tiếp tục tăng thêm, nó có thể kích hoạt loạt “hiệu ứng phản hồi” vốn làm cho vấn đề càng trở nên tồi tệ hơn. Ví dụ, nạn phá rừng nhiệt đới đồng nghĩa là có ít cây cối hơn để giúp loại bỏ CO<sub>2</sub> khỏi khí quyển. Mức CO<sub>2</sub> trong khí quyển cao hơn làm tăng sự nóng lên toàn cầu và làm thay đổi hệ thống hoàn lưu khí quyển, dẫn đến hạn hán kéo dài và gây chết rừng mưa nhiệt đới. Các hiệu ứng phản hồi khác liên quan đến việc giải phóng khí methan dưới đáy biển và tan chảy băng biển Bắc Cực.



### PHÁT THẢI METHAN DƯỚI ĐÁY BIỂN




### TAN BĂNG BIỂN BẮC CỰC

Trong hầu hết các kịch bản dự đoán, mức CO<sub>2</sub> trong khí quyển dự kiến cũng sẽ tăng

Trong hầu hết các kịch bản dự đoán, nhiệt độ bề mặt trung bình toàn cầu dự kiến sẽ tăng lên

**NĂM 2016 LÀ NĂM NÓNG NHẤT ĐƯỢC GHI LẠI TRONG LỊCH SỬ**

CO<sub>2</sub> tăng nhanh phù hợp với sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu



NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT TRUNG BÌNH TOÀN CẦU

## Tác động toàn cầu

Băng ở các cực đang tan rất nhanh. Vào tháng Ba năm 2017, băng biển mùa đông ở Bắc Cực đã xuống đến diện tích nhỏ nhất từ trước đến nay. Nước từ sông băng tan đang chảy vào đại dương và làm tăng mực nước biển. Trong khi đó, đại dương lại đang nóng dần lên, gây ra những cơn bão dữ dội và đe dọa làm tuyệt chủng các rạn san hô nhiệt đới. Trên đất liền, sa mạc đang mở rộng sang các vùng cây xanh do ảnh hưởng của hạn hán kéo dài.

### Tác động bất lợi của sự nóng lên toàn cầu



**Những cơn bão dữ dội** càng thêm mạnh hơn khi nhiệt độ tăng – sự bốc hơi nhanh chóng của nước biển tạo ra những đám mây bão khổng lồ.



**Lũ quét** trên mặt đất do lượng mưa lớn và dữ dội hơn từ những cơn bão mạnh hơn.



**Hạn hán và sa mạc hóa** ở vùng nhiệt đới đang khiến mùa màng thất bát, gây ra nạn đói, di cư hàng loạt và bất ổn chính trị.

1960

1980

2000

2020

14,8 °C

14,6 °C

14,4 °C

14,2 °C

14,0 °C

13,8 °C

13,6 °C

13,4 °C

58,6 °F

59 °F

57,8 °F

57,4 °F

57 °F

56,6 °F

56,2 °F



# CHỈ MỤC

Các số trang in **đậm** dùng để chỉ những mục chính.

## A

AC (dòng điện xoay chiều) 84  
acid **58-59**  
acid amin 159, 164  
acid carbonic 175  
acid nucleic 51  
acid sulfuric 66  
Actroid 98  
adenine 158  
ADN  
    acid nucleic 51  
    bộ gen 178-179  
    bức xạ và 36  
    gen 158-159  
    hiệu ứng biểu sinh 163  
    kỹ thuật di truyền 180-181  
    là ví dụ về polyme tự nhiên 68  
    liệu pháp gen 182-183  
    nanobot 97  
    nhận diện 79  
    sao chép 176, 177, 186  
    sinh sản 160-161  
    sự sống 150, 151, 165  
    tế bào 156, 157  
    tiến hóa 166  
    virus 154, 155  
ADN rác 178  
AI xem trí tuệ nhân tạo  
amoniac 53, 62, 64, 67, 164  
Andes 224  
anode (cực dương) 48, 49  
áp suất **130-131**  
    bay lượn 132  
    chất khí 18-19, 130  
    chất lỏng 131  
âm lượng 114  
âm thanh **114-115**  
    sóng âm 102, 103, 105  
    trong chân không 136  
    trong không gian 115  
ảnh màu giả 211  
ánh sáng  
    dịch chuyển đỏ 4, 202  
    gương và thấu kính

108-109  
hạt 28-29  
khúc xạ 109  
khuếch đại 111  
laser 110 -111  
phản xạ 108  
phân cực 61  
phổ điện từ 104-105  
quan sát Vũ Trụ 210-211  
quang học 112-113  
quang hợp 168  
sóng 28, 53, 57, 60, 61,  
102-103, 109, 112  
thị giác màu 106-107  
tốc độ của 105, 140, 141  
trong chân không 136, 141  
trong không gian bị cong  
vênh 142, 143  
từ Mặt Trời 193  
ánh sáng đỏ 29, 106-107  
ánh sáng khả kiến 53, 104, 210  
ánh sáng lam 53, 106-107  
ánh sáng lục 29, 106-107  
ánh sáng trắng 106  
ảo tượng 108  
áp suất khí quyển 130  
AR xem thực tế ảo tăng cường  
Archimedes 134  
argon 52, 234  
ARN 154, 155, 158, 159, 165, 180  
auxin 170, 171

## B

bạch cầu 157  
bài tiết 150, 151  
bảng tuần hoàn **34-35**  
bánh răng 125, 126  
bánh xe 124  
bào quan 156  
bào tương 157, 158  
bảo toàn năng lượng 76  
bão 238-239, 247  
bão xoáy 236, 239  
baryon 27  
base **58-59**, 158, 159, 179  
bay hơi/bốc hơi 23  
    vòng tuần hoàn nước 242  
bay lượn **132-133**  
băng 56, 243  
    tan ở cực 247  
bất tử 177  
benzen 50, 53

bê tông 72  
bề mặt ma sát 126-127  
bể Downs 66  
bệnh bạch cầu 184  
bệnh đậu mùa 155  
bệnh Parkinson 184, 187  
bệnh tật  
    liệu pháp gen 182-183  
    liệu pháp tế bào gốc  
    184-185  
    virus 154-155  
bệnh tiểu đường 180, 184  
bệnh viêm phổi 150  
Bhopal (Ấn Độ) 44  
biên độ (sóng) 102, 114  
biến chất 231  
biến dạng 127, 129  
biến đổi khí hậu **246-247**  
biến thể di truyền 166-167  
biểu đồ địa chấn 227  
bình giữ nhiệt chân không 136  
bit 93  
    lượng tử 101  
bom xung điện từ 21  
bong bóng cá 134  
boson 27  
bột kim loại 73  
bộ chuyển đổi xúc tác 65  
bộ gen **178-179**  
bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên  
(RAM) 92  
bộ sao chép 165  
bộ xử lý trung tâm (CPU) 9  
bôi trơn 126  
Bức tường Vĩ đại Sloan 201  
bức xạ 36, 118, 119  
    Mặt Trời 119, 193, 234, 244  
    phản xạ 244-245  
    tàn dư vũ trụ 203  
    trong không gian 217, 218  
bức xạ điện từ 104-105, 211  
bức xạ hạt mặt trời 217  
bức xạ hồng ngoại 104-105, 119,  
244, 245  
bức xạ ion hóa 217  
bức xạ tàn dư vũ trụ 203  
bức xạ thiên hà 217  
bức xạ tia cực tím 210, 217  
buckyball 96  
byte 93

## C

caesi 24, 45  
calorie 77  
cao độ (âm thanh) 115  
carbohydrate 51  
cathode (cực âm) 48, 49  
carbon **50-51**, 191  
    chu trình carbon 174-175  
    cô lập carbon 175  
    và sự sống 51, 150, 151, 164  
carbon dioxide 164  
    chu trình carbon 174-175  
    hiệu ứng nhà kính 244-247  
    hô hấp 172-173  
    khí quyển Trái Đất 234  
    không khí 52  
    thực vật 168-169  
carbon monoxide 53, 54  
catalase 64  
cá 134, 153  
cách điện/chất cách điện 80,  
81, 88, 119  
cân bằng động 42-43  
cân bằng nhiệt 119  
cận nhiệt đới 240  
cầu vồng 106, 109  
cây được 173  
cây sự sống 152-153  
cấy ghép nội tạng 187  
cellulose 150, 169  
Ceres 197  
cháy 43, 54  
cháy rừng 54, 55  
cháy tự nhiên 174  
chấm lượng tử 96, 97  
chân không 136-137, 141, 209  
chân trời sự kiện 199  
chân trời Vũ trụ học 204  
chấn thương tủy sống 184-185  
chất bán dẫn 88, 90  
chất dạng hạt 52, 53  
chất điện phân 80-81  
chất hữu cơ 50  
chất khí 12, 13, **18-19**  
    áp suất 130  
    chuyển đổi trạng thái  
    22-23  
    khí nén 18  
    khí quyển Trái Đất 234-  
235  
    không khí 52-53  
    ở nhiệt độ cực cao 20



phản ứng 45  
chất lỏng 12, **16-17**  
áp suất 131  
bình giữ nhiệt chân không 136  
chuyển đổi trạng thái 22-23  
phản ứng 45  
phi Newton 17  
chất lỏng Newton 17  
chất lỏng phi Newton 17  
chất rắn 12, **14-15**  
chuyển đổi trạng thái 22-23  
phản ứng 45  
tính dẫn nhiệt 118  
chất rắn dễ uốn 15, 46-47  
chất rắn kết tinh 14, 15, 47, 70, 71  
chất rắn vô định hình 14, 15, 70, 71  
chất siêu dẫn 20, 21  
chất siêu lỏng 20, 21  
chất sinh hóa 51, 242  
chất tẩy rửa sinh học 65  
chất thải  
bài tiết 150, 151  
nhựa 69  
chất xúc tác 49, **64-65**, 165  
chất xúc tác sinh học 65  
chế tạo hóa chất **66-67**  
chiều (lý thuyết dây) 147  
chiều cao và di truyền 163  
chiều không gian 147  
chiều không gian nhìn thấy được 147  
chim 153  
chìm 134  
chlor 41, 66  
chloride 40-41  
chocolate 77  
chọn lọc tự nhiên 167  
chồi 170-171  
chồng chất lượng tử 31  
chống oxy hóa 176  
chu kỳ bán rã 37  
chùm manti 229  
chuối (cấu trúc phân tử) 50  
chuối thức ăn 168  
chuyển động  
các định luật 122-123, 140  
lò xo và con lắc 128-129  
lực 120-121  
thuyết tương đối hẹp 140-141  
chuyển động ná cao su/hỗ trợ

hấp dẫn 215  
chuyển động ném xiên 120-121  
chuyển nhân tế bào sinh dưỡng 187  
chữ số nhị phân (bit) 101  
chung cất 39  
chung cất phân đoạn 67  
co ngắn chiều dài 140  
composite (vật liệu tổng hợp) 72  
con lắc **128-129**  
con lai 160  
con mèo của Schrödinger 31  
công nghệ Diode phát quang hữu cơ (OLED) 97  
công nghệ nano **96-97**  
công suất 77  
cổng logic 90-91  
cơ bắp người khi sống trong không gian 218, 219  
cơ thể người  
trong chân không 137  
trong không gian 218-219  
trong nước 57  
cụm sao hình cầu 200  
cửa sổ hai lớp 119  
cực  
di chuyển 223  
Trái Đất 83  
từ 82  
cực quang 20  
Cửu Dolly 187  
cytokinin 170, 171

## D

Dải Ngân Hà 194, 200, 206  
dao động 102-103, 104, 128-129, 145  
dẫn nỏ 56, 57, 116  
Darwin, Charles 167  
dãy Himalaya 225  
dẫn điện/chất dẫn điện  
chất bán dẫn 88  
dòng điện 80-81  
kim loại 46-47  
truyền nhiệt 118  
dầu  
các sản phẩm từ 67, 68  
olive 17  
dấu vân tay 78  
DC (dòng điện một chiều) 84  
deuteri 37

di chuyển 150, 151  
di truyền **162-163**  
và liệu pháp gen 183  
diệp lục 168, 169  
dịch chuyển đồ 202, 204  
dịch chuyển tức thời 30  
dinh dưỡng 150, 151  
diode 90, 91  
công nghệ Diode phát quang hữu cơ (OLED) 97  
dòng  
điện **80-81**, 84-85, 88-89  
hải lưu 232  
hoàn lưu khí 240  
dòng chảy chất lỏng 17  
dòng điện cảm ứng 84  
dòng gen 181  
dung dịch 39, **62-63**  
dung môi **62-63**  
dung môi phân cực 62, 63  
dung nham 228-229, 230  
Drake, Frank 213  
dữ liệu  
máy tính 92-93  
thu thập/phân tích 8-9  
Dự án Bản đồ Gen Người 179  
dự đoán khoa học 8, 9

## Đ

đa tạp Calabi-Yau 147  
đá  
chu kỳ đá **230-231**  
hình thành 174  
kiến tạo mảng 224-227  
tinh thể 60  
tuổi của 230  
đá biến chất 230-231  
đá lửa xâm nhập 230-231  
đá trầm tích 225, 230-231  
Đài quan sát tia X Chandra 211  
đại dương 222, **232-233**  
ấm lên 247  
bị acid hóa 175  
kiến tạo mảng 224-225  
năng lượng 86  
nguồn gốc của sự sống 164, 165  
sóng 102, 103  
trao đổi carbon giữa khí quyển và thủy quyển 175  
vòng tuần hoàn nước 242-243  
Đại Trung sinh 245  
đám mây Oort 197  
đám mây phân tử 190  
đảo Réunion 240  
đất 169  
đèn neon 20  
đĩa bồi tụ 199, 201  
điểm bão hòa 63  
điểm điều tiết 94  
điểm kỳ dị 198-199  
điểm Lagrange 215  
điểm tiếp nhiên liệu 48  
điện  
cấp điện 85  
chất siêu dẫn 21  
plasma 20  
tạo ra **84-85**  
tĩnh điện **78-79**  
điện áp 80, 81  
điện phân 49  
điện tích 40-41, 78  
điện toán lượng tử 100, 101  
điện trở 80, 81  
điện trường 32  
điện từ học 140, 203  
điện từ **88-89**  
linh kiện 91  
đinh ốc 124  
định luật 9  
định luật Avogadro 19  
định luật Moore 89  
định luật Ohm 81  
định luật vật lý 203  
đòn bẩy 125  
đóng băng 22, 56, 57  
độ bám dính 127  
độ cao 130, 133  
độ dài Planck 146  
độ hòa tan 64  
độ nhớt 16-17  
độ phóng đại 113  
độ sâu (áp suất) 130, 131  
đổi lưu 118  
đồng 47, 62  
đồng thau 47  
đồng vị 34  
động cơ  
bước 99  
điện 48-49  
đốt trong 151  
động đất **226-227**  
động năng 76, 77, 118, 120-121  
động vật  
biến đổi gen (GM) 181  
các giới 152-3



hồ hấp 172-3  
sinh sản 160-161  
sự sống 150-151  
tế bào 157

động vật có vú 153  
động vật có xương sống 153  
động vật không xương sống 153  
Đới Hội tụ liên Chí tuyến (ITCZ)  
240, 241  
đường 164, 165, 168, 169  
đường đứt gãy 226-227  
đường hóa 87  
đường Kármán 133  
đường Plimsoll 135  
đường trắc địa 142

## E-Ê-F

Eddington, Arthur 142  
Einstein, Albert 109, 138  
thuyết tương đối hẹp  
140-141  
thuyết tương đối rộng  
142-143, 144  
electron  
bước nhảy lượng tử 30  
chia sẻ và chuyển giao 41  
diện tích 78  
hạt hạ nguyên tử 26, 27  
lớp vỏ 40  
lưỡng tính sóng-hạt 28, 29  
lý thuyết dây 146  
mạch điện 80-81  
máy gia tốc hạt 32, 33  
nguyên tố 34-35  
orbital 24, 25, 40  
plasma 20, 22, 23  
transistor 88-89  
tự do 81, 90  
vật chất 12, 13  
electron tự do 81  
ethan 50  
enzyme 151, 158, 159  
chất xúc tác 64-65  
kỹ thuật di truyền 180-181  
Europa 194  
ếch đẻ trứng 160  
Fermi, Enrico 213  
fermion 26, 27  
florigen 171  
fluor 25  
front thời tiết 236-237  
fullerene 51

## G

Ganymede 194  
gấu nước 137  
gia tốc **122-123**, 128, 139  
gi sắt 47  
giả thuyết 8, 9  
giải phóng vật chất vành nhật  
hoa 193  
giảm phân 161  
giảm tốc 109, 128  
giáng thủy 243  
giao thoa sóng 29, 112  
Giao thức Điều khiển Truyền  
vận (TCP) 93  
gibberellin 170, 171  
gien **158-159**  
di truyền 162-163  
đột biến 167  
lão hóa 176-177  
sinh sản 160-161  
sự sống 150  
tế bào 157  
gien tự sát 183  
gien xen kẽ 178  
gió  
hải lưu 232  
năng lượng 86  
sóng 233  
Trái Đất 235, 236-237,  
239, 243  
gió mùa 241  
giới sinh vật 152  
glucose 150, 169, 172  
gluon 12, 26  
Goldilocks, Hiệu ứng/vùng  
165, 212  
gốc tự do 36  
gốm sứ **70-71**  
GPS (Hệ thống Định vị Toàn  
cầu) 99, 143  
graphene 73, 96  
graviton 26  
guồng nước 80  
gương **108-109**  
  
**H**  
hadron 27  
hạch nhân 156  
Hàm Boolean 90  
hàn hồ quang plasma 20  
hạn hán 247  
hành tinh

chuyển động quanh Mặt  
Trời 142-143  
Hệ Mặt Trời 194-195  
hiệu ứng nhà kính 245  
ngoại hành tinh 212-213  
sao lùn 195  
trọng lượng trên các hành  
tinh khác 139  
hành tinh lùn 194, 195  
hạt  
chất khí 18, 22  
chất lỏng 16, 22  
chất rắn 14, 22  
định luật chi phối sự tương  
tác giữa các hạt 203  
lý thuyết dây 146  
siêu hạt (sparticle) 147  
sơ cấp 12, 146  
tinh thể 60, 61  
và sóng 28-29  
xem thêm hạt hạ nguyên  
tử  
hạt alpha 36  
hạt beta 36  
hạt giống 170  
hạt hạ nguyên tử **26-27**  
lý thuyết dây 146  
máy gia tốc hạt 32-33  
thế giới lượng tử 30-31  
hạt Higgs 32, 33, 209  
hạt nhân  
năng lượng 36-37  
nguyên tử 24  
plasma 20  
tế bào 156  
hấp dẫn lượng tử 146  
heli 24-25, 132, 191  
lồng 21  
hệ keo 39  
Hệ Mặt Trời **194-195**  
sự sống trong 165  
trong Dải Ngân Hà 200  
hệ thống miễn dịch 155, 218  
hiện tượng mao dẫn 57  
hiệu ứng biểu sinh 163  
hiệu ứng Coriolis 235  
hiệu ứng Doppler 115  
hiệu ứng Meissner 21  
hiệu ứng nhà kính **244-245**,  
246  
hiệu ứng quang điện 29  
hình dạng  
chất khí 18  
chất lỏng 16  
chất rắn 14

hoa 170, 171  
hóa dầu 68  
hóa thạch 174  
hoàn lưu Cực 240  
hoàn lưu Ferrel 240-241  
hoàn lưu Hadley 240  
hoàng hôn 53  
hoạt động núi lửa 164, 222,  
224, 225  
bụi phun trào từ núi lửa  
245  
năng lượng địa nhiệt 87  
hồ hấp 150, 151, **172-173**  
chu trình carbon 174-175  
hồ 162-163  
hỗn hợp 13, **38-39**  
phân tách 38-39  
hơi nước 87  
hợp chất 13, **38-39**  
ion 41  
hợp kim 47  
huyền phù 39  
hydro 34, 35, **48-49**, 132, 191  
acid 58  
hydrocarbon 50  
nước 56  
hydrocarbon 48, 50

## I-J

insulin 180-181  
Internet 92-93  
ion 13, **40-41**  
plasma 20  
ion hóa 23  
joule 77

## K

Kẻ thích nghi nhất mới có thể  
tồn tại 167  
kem chống lão hóa 176  
kem chống nắng 97  
kem trái cây sherbet **45**  
kéo dài tuổi thọ 177  
Kevlar 73  
kết tinh 230  
kháng thể 155  
khí chlor 19  
khí động học **132-133**  
khí fluor hóa (khí F) 246  
khí hậu **240-241**  
hiệu ứng nhà kính 244-247  
khí nhà kính 49, 175, 246



khí quyển

Đường Kármán 133  
hiệu ứng nhà kính 244-247  
không khí 52-53  
Sao Hỏa 219  
thời tiết 236-237  
Trái Đất 52-53, 164, 217,  
222, 223, **234-235**  
và sự sống 212

khinh khí cầu 132

khoa học, bản chất của **8-9**

khoảng cách

và trọng lực 138  
và vận tốc 122

khoáng chất 230, 231

tinh thể khoáng 60-61

không bào 157

không gian **188-219**

âm thanh trong 115  
chân không 136, 137  
chuyến bay không gian  
214-215  
du hành không gian  
218-219  
Hệ Mặt Trời 194-195  
kết thúc của Vũ trụ  
208-209  
kích thước Vũ trụ 204-207  
lỗ đen 198-199  
Mặt Trời 192-193  
sao 190-191  
sống trong 216-217  
sự sống ngoài hành tinh  
212-213  
thám hiểm bằng robot 99  
thiên hà 200-201  
thiên văn học 210-211  
thời gian dẫn nổ 140-141  
vật chất tối và năng lượng  
tối 206-207  
vật chất trôi nổi trong  
196-197  
Vụ Nổ Lớn 202-203

không khí **52-53**

áp suất 130, 132, 237  
chu trình carbon 174-175  
chưng cất phân đoạn 67  
hoàn lưu 240  
khí quyển Trái Đất 234-235  
lực cản 136, 138-139  
lưu thông trong không  
gian 217  
mật độ 133  
nén 135  
sưởi ấm 118

thời tiết 236-237

vô hình 19

không trọng lượng 216  
không-thời gian 142, 144, 199,  
209

khối lượng

bảo toàn 13  
và chuyển động 120-121  
và năng lượng 141, 142  
và trọng lực 138  
và trọng lượng 139

khúc xạ ánh sáng 106

khủng long 153

kích thước nano 97

kích thước nguyên tử 24

kiềm 59

kiến tạo mảng **224-225**, 228,  
231, 232

động đất 226-227

kim cương 14, 15, 51, 108, 118

kim loại **46-47**

bảng tuần hoàn 34-35  
tính dẫn nhiệt 118

kính hiển vi 112-113

kính thiên văn 113

Kính thiên văn vũ trụ Kepler 213

Kính thiên văn vũ trụ tia

gamma Fermi 211

Kính viễn vọng không gian

Hubble 210, 211

kính viễn vọng vô tuyến 104,  
210, 213

kính VR 94-95

Kỷ nguyên Planck 203

kỷ sinh trùng 154

kỹ thuật di truyền **180-181**

**L**

laser **110-111**, 112, 145

lá 168-169, 170, 171

làm ướt 16

lão hóa **176-177**

trì hoãn **177**

lăng kính 106

lăng động 23

lập trình máy tính 92

Leonardo da Vinci 124

lepton 26, 27

lên men 87

LiDAR 99

liên kết

cộng hóa trị 41  
ion 41

nguyên tử 12-13, 38, 40,  
42-43, 50-51

liệu pháp gen 155, 177, 181,  
**182-183**

liệu pháp gen dòng mầm 183

liệu pháp gen tế bào sinh  
dưỡng 183

liệu pháp nhân bản 187

LIGO (Đài Quan trắc Sóng hấp  
dẫn bằng Giao thoa kế Laser)  
144, 145

lipid 51

liposome 182, 183

lò phản ứng nhiệt hạch 37

lò xo **128-129**

loài 152, 166-167

hồi sinh các loài tuyệt  
chủng 187

lai giống 160

lọc 38

logic 8

lỗi

Mặt Trời 192

Trái Đất 222, 223

lỗ đen 191, **198-199**, 211

lỗ đen nguyên thủy 198

lỗ đen sao 144, 198

lỗ đen siêu khổng lồ 144,  
198, 201

sóng hấp dẫn 144

va chạm 144-145

và số phận của Vũ trụ 208,  
209

lỗ sâu đục 144

lốc xoáy 239

lốp xe 126-127

lợi thế cơ học 125

lớp phủ của Trái Đất 223, 224,  
225, 228

lớp vỏ đại dương 222, 223, 224,  
225, 228, 232

lớp vỏ electron 40

lớp vỏ lục địa 222, 223, 224-  
225

lũ quét 247

luật bình phương nghịch đảo  
103

lục địa 222

lục địa trôi dạt 225

lục lạp 156, 157, 168

luồng khí sau một vật thể  
chuyển động 123

lửa **54-55**

sử dụng ma sát để đốt  
lửa 127

trong không gian 216

lực **120-121**

áp suất 130-131

cơ bản 27

đàn hồi 128-129

ma sát 126-127

máy móc 124-125

nổi 134-135

trọng lực 138-139

từ 82-83

vận tốc và gia tốc 122-123

việc bay lượn 132-133

Vụ Nổ Lớn 203

lực cản 109, 126, 127, 133

lực đàn hồi 129

lực đẩy cánh quạt 133

lực hấp dẫn/trọng lực 27, **138-  
139**, 203, 234

chuyến bay không gian  
214-215

điểm Lagrange 215

lỗ đen 198, 199

lượng tử 146

thuyết tương đối rộng  
142-143

Trái Đất 214, 215

và chuyển động ném xiên  
120-121

và năng lượng tối/vật chất  
tối 206, 207, 209

lực điện từ 27

lực G 138

lực hấp dẫn vi mô 216

lực hạt nhân mạnh và yếu 203

lực kéo (xe) 126-127

lực kéo dẫn 128, 129

lực kết quả 121

lực nâng 132, 133

lực từ 82, **82-83**

lưới nội chất hạt 154, 155, 157

lưỡng tính sóng-hạt **28-29**

ly tâm 39

lý thuyết 8, 9

lý thuyết dây **146-147**

**M**

ma sát **126-127**

tĩnh điện 78

MACHO 206

magnesi 40

maltase 65

mã di truyền 159

mã kỹ thuật số 92



mã máy tính 92  
mã vạch 111  
mạch **80-81**, 88  
    tích hợp 90-91  
    vi mạch 90-91  
mạch điện nối tiếp 80  
mạch điện song song 80  
mạch máu 172  
màng tế bào 165  
màng đại dương 226  
màng lục địa 226  
mạng máy tính 93  
mạng thần kinh 101  
màu **106-107**  
màu của bầu trời 53, 107  
máy **124-125**  
    học máy 101  
máy bay **132-133**  
máy biến áp 85  
máy chủ 93  
máy gia tốc hạt 21, 32-33  
Máy Gia tốc hạt Lớn 33  
máy khử rung tim 79  
máy phát điện 84-85, 86, 87  
máy phát thanh kỹ thuật số 105  
máy photocopy 79  
máy quét MRI 21, 83  
máy tính 88, **92-93**, 150  
    trí tuệ nhân tạo 100-101  
mắc ma  
    chu kỳ đá 230-231  
    kiến tạo mảng 224-225  
    núi lửa 228-229  
mắt người 94, 95, 105, 109  
    quang học 112, 113  
    thị giác màu 106-107  
mặt phẳng nghiêng 125  
mặt trăng của các hành tinh 194  
Mặt Trăng 234  
    chuyến bay không gian 214-215  
    trọng lực 214, 233  
    và thủy triều 233  
Mặt Trời **192-193**, 194-195  
    bức xạ hồng ngoại 119  
    chuyển động hành tinh 142-143  
    lực hấp dẫn 233  
    nguồn năng lượng 193  
    quang hợp 168  
    quỹ đạo của Trái Đất quanh 241  
    vòng tuần hoàn nước 242

mật độ/khối lượng riêng 134, 135  
áp suất 130, 131  
chất lỏng 16, 131  
chất lưu 118  
kim loại 46, 47  
không khí 133  
lỗ đen 198-199  
mật ong 17  
mây 235, 240, 241, 243  
    thời tiết 236-239  
mây tro 228  
mây vũ tích 238-239  
meson 27  
methan 49, 164, 244, 245, 247  
Miller, Stanley 164  
monome 68  
Moore, Gordon 89  
mô đun Young 129  
mô men xoắn 125  
môi trường  
    và cây trồng biến đổi gen 181  
    và gen 162  
mùa **240-241**  
muối 59  
muối ăn (natri chloride) 42, 66  
mưa 236-237, 240, 241, 243  
mưa acid 58  
mưa đá 236, 239  
mực nước biển 24, 246

## N

nam châm 82-83  
nam châm điện 21, 83  
Nam Cực 243  
nanobot (cỗ máy nano) 97  
nào  
    công nghệ nano 96  
    khí sống trong không gian 218  
    thị giác 109, 113  
    thị giác màu 106-107  
    trí tuệ nhân tạo 101  
natri 40-41, 66  
nảy mầm 170  
năm ánh sáng 204  
năng lượng 76-77  
    bảo toàn 76  
    các dạng sống 172  
    chất xúc tác 64  
    chuyển đổi vật chất 22-23  
    dinh dưỡng 150, 151

đo lường 77  
hydro 48-49  
không-thời gian 142  
mặt trời 193  
sự cháy 54  
thay thế 86-87  
truyền 116, 120  
và khối lượng 141  
và nhiệt độ 117  
và phản ứng 44-45  
năng lượng âm thanh 76  
năng lượng bức xạ 76  
năng lượng địa nhiệt 87  
năng lượng điện 76  
năng lượng hạt nhân 36-37, 76, 105  
năng lượng hóa học 76, 77  
năng lượng hoạt hóa 44-45, 64  
năng lượng thay thế **86-87**  
năng lượng tối 147, 201, **206-207**, 209  
Newton, Isaac 138, 142  
    các định luật chuyển động 122-123  
neutron 26, 27, 34  
nén 128, 129, 130  
nêm 124  
ngoại hành tinh 212-213  
ngủ trong không gian 216, 218  
ngũ quark 32  
nguyên lý bất định 30  
Nguyên lý Bernoulli 132  
nguyên lý tương đương 143  
nguyên phân 157  
nguyên tố **34-35**  
nguyên tố đất hiếm 35  
nguyên tử 12, **24-25**  
    carbon 50-51  
    cấu trúc nguyên tử 24-25  
    chất khí 18-19  
    chất lỏng 16-17  
    chất rắn 14-15  
    đầu tiên 203  
    điện tích 40-41, 78  
    hạt hạ nguyên tử 26-27  
    laser 110  
    liên kết 12-13  
    năng lượng hạt nhân 36-37  
    nguyên tố 34-35  
    nhiệt 116-117, 118  
    phản ứng hóa học 42-45  
    phân tử và ion 40-41  
    tinh thể 60

vật chất hữu hình 206  
nguyên tử khối 25, 34  
ngưng tụ 23, 87  
ngưng tụ Bose-Einstein 13, 222  
người, bộ gen 178  
nhà máy nhiệt điện 84-85  
nhà vệ sinh trong không gian 216  
Nhánh Orion (Lạp Hộ) 200  
nhân bản 186-187  
nhân bản nhân tạo **186-187**  
nhận diện giọng nói 100  
nhật thực 142  
nhiễm sắc thể 162, 178  
    lão hóa 176-177  
nhiên liệu hóa thạch  
    các lựa chọn thay thế 86-87  
    đốt 52, 174, 175, 246  
    hình thành 174  
    nhựa 68  
nhiên liệu sinh học 87  
nhiệt **116-117**  
    nhiệt ẩn 23, 117  
    truyền **118-119**  
nhiệt ẩn 23, 117  
nhiệt độ  
    chất khí 13, 18-19  
    khí hậu 240, 241, 244, 245, 246-247  
    khí quyển Trái Đất 234-235  
    nhiệt 116 -117  
    thang đo 117  
    và năng lượng 117  
    và phản ứng 44, 45  
    và sự sống 212  
nhiệt đới 240  
nhiệt hạch hạt nhân 37, 55  
    Mặt Trời 192, 193  
    sao 190, 191  
nhiệt năng 76, 116-117  
Nhóm Địa phương 201  
nhóm không tự nhiên 153  
nhóm tự nhiên 153  
nhôm trong suốt 71  
nhựa **68-69**  
    nhựa đường 16  
    nhựa nhiệt dẻo 68  
    nhựa nhiệt rắn 69  
    nhựa sinh học 68  
nitơ 52, 67, 164, 169, 234  
nitơ oxide (N<sub>2</sub>O) 245  
nóng chảy 22  
nổ 55  
nồi áp suất 130



nồi xúp nguyên thủy 164  
nổi 134  
nucleotide 68  
núi, hình thành 224-225, 231  
núi lửa **228-229**  
núi lửa dạng tầng 229  
núi lửa ở điểm nóng 228, 229  
núi lửa ở kẽ nứt 228  
núi tạo thành do va chạm  
mảng kiến tạo 225  
nước 13, 16-17, 38, **56-57**  
đại dương 232-233  
hơi 52, 240, 245  
hydro 48, 49  
làm dung môi 62-63  
nhiệt độ sôi và đóng băng  
116 -117, 130  
phân bố trên Trái Đất 243  
thủy điện 86-87  
thực vật 168-169  
trên Sao Hỏa 219  
trong không gian 217  
và sự sống 164, 165, 212  
vòng tuần hoàn nước  
**242-243**  
nước mặn 242  
nước ngầm 243  
nước ngọt 243

## O-Ô

oxide 47  
oxy 19, 41, 164, 191  
hô hấp 172-173  
khí quyển Trái Đất 234  
không khí 52  
nước 56  
thực vật 168-169  
ozone 244, 245  
ô nhiễm  
không khí 52-53  
nhựa 69  
trong nhà 53  
và biến đổi khí hậu 246  
ổ đĩa cứng 92, 93  
ôn đới 241  
ống nano 96

## P

Pangaea 225  
pentan 62  
peptide 165  
pha (sóng) 29, 47, 112

phá rừng 246, 247  
phản hạt 26  
phản ứng  
và năng lượng **44-45**  
phản ứng acid-base 59  
phản ứng dây chuyền 36  
phản ứng hóa học **42-43**, 55  
chất xúc tác 64-65  
phản ứng không thể đảo ngược  
42  
phản ứng nhiệt hạch 37  
phản ứng phân hạch 36  
phản ứng thu nhiệt 44, 45  
phản ứng thuận nghịch 43  
phản ứng tỏa nhiệt 44  
phản ứng tổng hợp 43  
phản vật chất 26  
phản xạ ánh sáng 107  
pháo hoa 43  
phát thanh kỹ thuật số 105  
phát xạ kích thích 110, 111  
phân hạch hạt nhân 55  
phân hủy (phản ứng) 43  
phân loại khoa học 152-153  
phân rã phóng xạ 31, 37  
phân tử 12, 13, **40-41**  
carbon 50  
chất khí 18-19  
chất lỏng 16, 17  
chất rắn 14  
hữu cơ đầu tiên 164  
khí nhà kính 245  
nhiệt 116 -117, 118  
nước 56-57, 102, 233  
phản ứng hóa học 43  
phân tử hữu cơ 164-165  
phép thử Turing 101  
phi hành gia 214, **216-219**  
phong hóa 230, 231  
phòng sinh học 72  
phóng xạ **36-37**  
phospholipid 165  
phosphor 169  
photon 29, 30, 33, 110-111, 192,  
193  
phổ điện từ 104-105, 211  
phổ học 211  
phôi  
liệu pháp nhân bản 187  
phân mảnh 186  
tế bào gốc 184-185  
phôi nang 185  
phối 18, 172, 173  
phối màu cộng 107  
phối màu trừ 107

phun trào núi lửa 229  
phun trào núi lửa dạng nứt nhẹ  
228, 229  
phương pháp Haber 64, 67  
phương pháp khoa học 8  
pin 80  
pin nhiên liệu 48-49  
plasma 13, 20  
chuyển đổi trạng thái  
22-23  
mặt trời 20, 193  
plasmid 181  
Polaris (sao Bắc Cực) 241  
polyme 68-69  
gia cổ 72  
hữu cơ 165  
tự nhiên 68  
positron 26  
protein 51, 165  
hình dạng và chức năng 159  
liệu pháp gen 182, 183  
tạo ra 68, 156, 158, 176, 178  
thực vật 169  
proton 24, 26, 27, 32, 34, 40,  
146  
pyruvate 173

## Q

quan sát khoa học 8  
quán tính 122, 143  
quang học **112-113**  
quang hợp 151, 157, **168-169**, 171,  
172, 173  
chu trình carbon 174-175  
quang phổ khả kiến 106  
quang quyển 192, 193  
quark 12, 26, 27, 32, 146  
quần tụ thiên hà 201, 206-207  
qubit/bit lượng tử 101  
quy trình tiếp xúc 66  
quỹ đạo  
chuyến bay không gian  
214-215  
hành tinh 195  
lỗ đen 144-145  
phân tử nước 233  
quyển mềm 222, 223, 224

## R

rác vũ trụ 197  
radar 99  
rạn san hô 247

rãnh đại dương 224, 226, 232  
Rãnh Mariana 224, 232  
rễ cây 169, 170  
ribosome 154, 155, 156  
robot **98-99**  
robot hình người 98  
ròng rọc 124  
Rosen, Nathan 144  
rối lượng tử/vướng víu lượng  
tử 30  
rùa ở Galápagos 166, 167  
rung động, lý thuyết dây  
146-147  
rừng nhiệt đới 240

## S

sa mạc 240, 241  
sa mạc Lut 241  
sao 20, **190-191**  
cụm sao 200  
hình thành 202  
lỗ đen 198-199  
sự sống và cái chết của  
190-191, 198  
tái chế một ngôi sao 191  
xem thêm thiên hà  
sao băng 196, 235  
sao chổi 142, 194, 196, 197  
sao “dây chính” 190  
Sao Diêm Vương 195  
Sao Hải Vương 195, 197, 214, 215  
Sao Hỏa 194, 197  
chuyến bay không gian 214  
sinh sống trên 219  
Sao Kim 194, 245  
sao lùn nâu 191  
sao lùn trắng 191  
sao lùn vàng 192  
Sao Mộc 194-195, 197, 212, 215  
sao neutron 83, 144, 191, 211  
sao siêu khổng lồ 191  
sao siêu khổng lồ đỏ 191  
Sao Thiên Vương 195, 215  
Sao Thổ 195, 215, 245  
Sao Thủy 194, 195  
sao từ 83  
sắc ký 39  
sắc quyển 192, 193  
sắt 191  
sấm 238  
Schrödinger, Erwin 31  
SETI (chương trình Tìm kiếm  
Sinh vật Thông minh Ngoài



Hành tinh) 213  
 siêu đám thiên hà 201  
 Siêu đám Xử Nữ 201  
 siêu hạt (sparticle) 147  
 siêu hoàn lưu 239  
 siêu lạnh 22  
 siêu lực 203  
 siêu tân tinh 32, 190, 191, 198, 207, 211  
 silic 88-89, 90, 151  
 silic dioxide 70  
 sinh đôi  
     cùng trứng 186  
     và du hành không gian 216  
 sinh khối 169  
 sinh sản 150, **160-161**  
     rào cản 160  
 sinh sản hữu tính 161  
 sinh sản mọc chồi 160  
 sinh sản sinh dưỡng 160  
 sinh sản vô tính 160, 186  
 sóng **102-103**  
     ánh sáng 28, 53, 57, 60, 61, 102-103, 109, 112  
     áp suất 114, 115  
     âm thanh 102, 103, 105, 114-115  
     cường độ 103  
     đại dương 102-103, 233  
     đo bước sóng 102  
     đổ 103  
     giao thoa 112  
     laser 110-111  
     thị giác màu 106-107  
     và hạt 28-29  
 soi lập thể 94  
 sóng áp lực 114, 115  
 sóng điện từ **104-105**, 119  
 sóng dọc 102, 103  
 sóng hấp dẫn **144-145**  
 sóng mặt 102  
 sóng ngang 102, 103  
 sóng thần 226-227  
 sóng vô tuyến 104, 105, 210, 211  
 số hiệu nguyên tử 25, 34  
 sông băng 231, 243, 247  
 sống núi giữa Đại Tây Dương 224  
 sợi quang học 112  
 sợi thủy tinh 72  
 spaghetti-hóa 199  
 Spencer, Herbert 167  
 sư hổ 160  
 sự nổi **134-135**  
 sự sống **148-187**

bộ gen 178-179  
 di truyền 162-163  
 đặc điểm của sinh vật sống 150-151  
 gen 158-159  
 hô hấp 172-173  
 kỹ thuật di truyền 180-181  
 lão hóa 176-177  
 liệu pháp gen 182-183  
 ngoài Trái Đất 212-213  
 nguồn gốc của 164-165  
 nhân bản 186-187  
 phân loại sinh vật sống 152-153  
 phân tử chứa carbon 51, 151  
 sinh sản 160-161  
 tế bào 156-157  
 tế bào gốc 184-185  
 thực vật 168-171  
 tiến hóa 166-167  
 và nước 242  
 virus 154-155  
 sự sống ngoài hành tinh **212-213**  
 sửa 177  
 sức căng bề mặt 57  
 sức khỏe người khi sống trong không gian 216, 217, 218-219  
 sức khỏe tâm thần khi sống trong không gian 218  
 sucrose 169

## T

tai lửa Mặt Trời 193  
 tái chế  
     nhựa 69  
     sao 191  
 tái hợp 23  
 tảo 87  
 Tàu Con Thoi 122  
 tàu đệm từ 21, 126  
 tàu ngầm 135  
 tàu thủy 134-135  
 tàu vũ trụ **214-215**  
 tầng trưởng 150  
     chất điều hòa tầng trưởng 170-171  
 tầm nhìn hai mắt 94  
 tần số 102, 115  
 tầng bình lưu 133, 235, 238  
 tầng đối lưu 133, 235, 240  
 tầng ngoài (khí quyển) 234

tầng nhiệt 133, 234  
 tầng ozone 210, 235  
 tầng trung lưu 133, 235  
 tập thể dục trong không gian 219  
 telomere 176, 177  
 tế bào 156-157  
     gen 158-159, 162-163  
     hô hấp và năng lượng 172-173  
     lão hóa 176-177  
     liệu pháp gen 182-183  
     liệu pháp nhân bản 187  
     phân loại 150, 157, 186  
     sinh dục 163  
     sinh sản 160-161  
     sự đa dạng của 157  
     sự sống 150-151, 164-165  
     tế bào mắt (tế bào hình nón) 106-107  
     tuổi thọ 157  
 tế bào da 157  
 tế bào gốc **184-185**  
     khía cạnh đạo đức của việc thu thập 184  
 tế bào hình nón 106  
 tế bào máu 157, 185  
 tế bào sinh dục 163  
 tế bào thần kinh 185  
 tên khoa học 152  
 tên lửa 122, 214  
 thạch cao 60-61  
 thạch hóa 231  
 thạch quyển 222, 223, 224-225  
 than 54  
 than chì 51  
 Thang độ lớn mô men 227  
 thang đo pH 59  
 Thang đo Richter 227  
 thay đổi hướng 109  
 thay đổi nhận thức 94  
 thay thế 134, 135  
 thăng hoa 22  
 thấu kính **108-109**, 112-113  
 thấu kính hấp dẫn 206-207  
 thấu kính hội tụ (lồi) 109  
 thấu kính phân kỳ (lõm) 109  
 theo dõi chuyển động (kính VR) 95  
 thép 47  
 thép không gỉ 47  
 thế giới lượng tử 25, **30-31**  
 thể tích  
     chất khí 18-19  
 thể Golgi 156

thế năng 76-77, 120-121  
 thế năng đàn hồi 76  
 thế năng hấp dẫn 76, 77  
 thế năng tĩnh điện 76  
 thêm lục địa 232, 233  
 thí nghiệm 8, 9  
 thị giác màu 106-107  
 thiên hà **200-201**, 204, 209  
     hình thành 202, 203, 210  
     hoạt động 201  
     va chạm 201, 208  
 thiên hà dị thường 200  
 thiên hà elip 200, 201  
 thiên hà hoạt động 201  
 thiên hà lùn Nhân Mã 201  
 thiên hà thấu kính 200  
 thiên hà xoắn ốc 200, 201, 210  
 thiên thạch 196  
 thiên văn học **210-211**  
 thoái hóa 176, 177  
 thoát hơi nước 242  
 thông bristlecone 176  
 thời gian  
     dẫn nờ 140-141  
     không-thời gian 142, 144, 199, 209  
     trải nghiệm thời gian 216  
 thời tiết 234, 235, **236-237**  
     cực đoan **238-239**  
 thu nhỏ 97  
 thù hình 51  
 thụ phấn 161  
 thụ tinh 161, 162, 163  
 thuốc  
     công nghệ nano 97  
     kỹ thuật di truyền 180, 181  
     laser 111  
     liệu pháp gen 155, 177, 182-183  
     liệu pháp nhân bản 187  
     liệu pháp tế bào gốc 184-185  
     robot 99  
 Thung lũng khô McMurdo 241  
 thung lũng kỳ lạ 98  
 thung lũng nứt 225  
 thủy điện 86-87  
 thủy lực học 131  
 thủy ngân 47  
 thủy tinh **70-71**  
 thủy triều 233  
 thuyết tương đối hẹp **140-141**, 142, 216  
 thuyết tương đối rộng **142-143**, 144



thuyết tương đối xem thuyết  
tương đối rộng, thuyết tương  
đối hẹp  
thử nghiệm hai khe hẹp 28-29  
thực vật

biến đổi gen 181  
hiệu ứng nhà kính 245  
hô hấp 172, 173, 174, 175,  
242  
nhiên liệu sinh học 87  
quang hợp **168-169**  
sinh sản 160, 161  
sinh sản vô tính 186  
sự sống 150-151  
tăng trưởng **170-171**  
tế bào 156-157  
thoát hơi nước 242  
thức ăn/thực phẩm  
ăn uống trong không gian  
217  
thực vật 168-169  
trên Sao Hỏa 219

thực tế ảo **94-95**  
thực tế ảo tăng cường **95**  
thylakoid 168, 169  
thymine 158  
tia cực tím 29, 105, 107, 210  
tia gamma 36, 104, 211  
tia hồng ngoại 107, 210  
tia lửa 78, 80, 117  
và nguồn gốc của sự sống  
164

tia sét 20, 78, 79, 238  
Tia X 104, 105, 211  
tiêm phòng 155  
tiền sao 190, 191  
tiến hóa 152, 153, **166-167**  
Tiến hóa Lớn 167  
tiếng nổ 115  
tiêu thể 157  
tiểu hành tinh 194, 196, 197  
tim người khi sống trong không  
gian 217, 218  
tinh bột 169, 170  
tinh thể **60-61**, 150  
chu kỳ đá 230-231  
độ hòa tan 63  
laser 110 -111  
tinh thể lỏng 61  
tinh thể zircon 230  
tinh trùng 161  
gien 162-163  
tinh vân 190, 200  
tinh vân hành tinh 191

Titan 245  
tính cứng giòn (chất rắn) 15, 70  
tính dẻo (chất rắn) 15, 46-47  
tính trong suốt 70, 71  
tính nhạy cảm 150  
tính diện **78-79**  
Tổ tiên chung của muôn loài  
152  
tốc độ siêu thanh 115  
Trái Đất **220-247**  
biến đổi khí hậu 246-247  
bức xạ 217  
cấu trúc bên trong 222-223  
chu kỳ đá 230-231  
đại dương 232-233  
động đất 226-227  
Hệ Mặt Trời 194  
hiệu ứng nhà kính 244-245  
hình thành 222-223  
khí hậu và các mùa  
240-241  
khí quyển 234-235  
kiến tạo mảng 224-225  
núi lửa 228-229  
quỹ đạo Trái Đất 214-215  
sự sống trên 164-165  
thời tiết 236-239  
trọng lực 214, 215  
tuổi của 165  
từ tính 83  
và hoạt động Mặt Trời 193  
vật chất tối 207  
vòng tuần hoàn nước  
242-243

Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) 196,  
216  
trạng thái của vật chất xem  
vật chất  
transistor 88-89, 90, 91  
trao đổi chất 51, 65, 151, 165, 173  
trao đổi chất cơ bản 173  
trao đổi khí 173  
tre 171  
trẻ hóa 177  
trí tuệ nhân tạo **100-101**  
trình sản 160  
trình tự lặp lại ngắn của ADN  
(STR) 179  
triti 37  
Triton 214  
trọng lượng  
trên các hành tinh khác 139  
và khối lượng 139  
và mật độ khối lượng 135

trục quay 124  
Trùng roi xanh 151  
trục thẳng 124, 133  
trường Higgs 209  
trường lực tĩnh điện 79  
trứng  
gien 162-163  
sinh sản 160-161  
turbine 84  
năng lượng thay thế 86-87  
túi (tế bào) 156, 157  
túi khí 121Turing, Alan 101  
*Turritopsis* (sứa bất tử) 177  
tuyết 236, 237, 243  
tuyệt chủng 247  
hồi sinh 187  
từ trường 32, 82-83  
chất siêu dẫn 21  
Trái Đất 83, 223  
tự bốc cháy 54  
tự động hóa **98-99**  
tương đương khối lượng-năng  
lượng 203, 206  
ty thể 156, 157, 172

## U

u xơ nang 182-183  
ung thư 155, 182, 218  
uracil 158  
urani 36, 37  
Urey, Harold 164

## V

vàng 47  
Vành đai Bức xạ Van Allen 217  
Vành đai Kuiper 197  
Vành đai sao Thổ 195  
Vành đai tiểu hành tinh 194,  
197  
vành nhật hoa 192  
vấn thạch 196  
vận tốc **122-123**, 140  
chuyển đi không gian 214  
vận tốc cuối 138-139  
vật chất **12-13**, 206  
cấu trúc của 12  
chất khí 18-19  
chất lỏng 16-17  
chất rắn 14-15  
chuyển đổi 22-23  
nguồn gốc của 203

trạng thái của 12-13  
trạng thái lạ 20-21  
trạng thái ở nhiệt độ cao  
và thấp 13  
và nhiệt 117  
vật chất baryon 206  
vật chất tối 32, 147, 200, 201,  
**206-207**  
vật liệu  
kỹ diệu 72-73  
nhựa 68-69  
thủy tinh và gốm sứ 70-71  
vật liệu chống đạn 71, 73  
vật liệu chống thấm 71, 73  
vật liệu Ferri từ (sắt từ) 83  
vật liệu nghịch từ 83  
vật liệu thuận từ 83  
vector 182  
vệ tinh 111, 215, 241  
định vị GPS 143  
vết đen Mặt Trời 192, 193  
vết lóa Mặt Trời 193  
vi khuẩn  
kỹ thuật di truyền 180  
sự sống 150  
tế bào 157  
vi mạch **90-91**  
vi sinh vật  
kỹ thuật di truyền 181  
sinh sản vô tính 186  
vi sóng 104  
virus **154-155**, 182  
với mục đích tốt 155  
vỏ Trái Đất 222, 223, 228, 229  
voi ma mút 187  
vòng/vân gỗ 170  
vòng (cấu trúc phân tử) 50  
võng mạc 106  
*Voyager 2* 214, 215  
VR xem thực tế ảo  
Vũ trụ  
dẫn nỏ 202, 203, 204,  
205, 209  
hình dạng của 205  
kết thúc của 208-209  
kích thước của 204-205  
lý thuyết vạn vật 146  
sóng hấp dẫn 144-145  
sự sống trong 212-213  
tăng tốc dẫn nỏ 206, 207  
thiên văn học 210-211  
vật chất tối và năng lượng  
tối 206-207  
Vụ Nổ Lớn 202-203



vũ trụ cong lõm 205  
vũ trụ cong lồi 205  
Vũ trụ khả kiến 204  
vũ trụ phẳng 205  
Vụ Co Lớn 208  
Vụ Đóng băng Lớn 208  
Vụ Nổ Lớn 32, **202-203**  
bằng chứng cho 203  
khả năng xảy ra một Vụ  
Nổ Lớn mới 208  
sóng hấp dẫn 144  
tạo ra hydro và heli 191  
và dẫn nổ Vũ trụ 204,  
207

Vụ Thay đổi Lớn 208, 209  
Vụ Xé rách Lớn 209  
vùng bức xạ 192  
vùng cấm (chất cách điện) 88  
vùng có thể sinh sống 165, 212  
vùng cực 241  
băng 243  
biến đổi khí hậu 247  
vùng dẫn 88  
vùng đối lưu 192  
vùng hóa trị 88  
vùng hút chìm 224, 228, 229  
vùng kiểm khuyết 89

## W-X-Z

WIMP 206  
WMAP (Tàu thăm dò  
Bất đẳng hướng Vi sóng  
Wilkinson) 210  
xe  
chạy bằng hydro 48-49  
không người lái 98  
xe đạp 124-125  
xe hơi  
bộ chuyển đổi xúc tác 65  
chạy bằng hydro 48-49

không người lái 99  
xoáy (đầu cánh máy bay) 127  
xoáy nghịch 236-237  
xoáy thuận 236-237  
xói mòn 230, 231  
xương 72, 73  
khi sống trong không  
gian 217, 218, 219  
tủy xương 184, 185  
zeolite 64

# Lời cảm ơn

**DK xin chân hành cảm ơn những cá nhân đã tận tình giúp đỡ chúng tôi trong việc chuẩn bị cuốn sách này:** Michael Parkin minh họa; Suhel Ahmed và David Summers giúp phần biên tập; Briony Corbett làm trợ lý thiết kế; Helen Peters biên soạn chỉ mục; cùng Katie John đã đọc sửa bản in.